

IMPRESA

AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SONNE

**FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE**

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Procimidone puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione: chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

SONNE è un fungicida a base di Procimidone, che esplica la propria azione preventivamente ed in modo curativo nelle prime fasi di incubazione, risulta essere dotato di moderata attività sistemica.

Culture protette:

VITE - indicato contro la muffa grigia alla dose di g 100-150/l, effettuando 3-4 trattamenti nei periodi di fine fioritura, poi quando gli acini hanno il diametro di ca. 3 mm (in coincidenza della chiusura del grappolo), poi si tratta all'irrigazione 7-8 settimane prima del raccolto per finire 3-4 settimane prima della raccolta. Si consiglia di bagnare molto affinché vi sia una distribuzione uniforme del prodotto; l'impiego della dose più alta è su varietà più sensibili all'attacco della malattia.

PESCO - NETTARINE - indicato contro il marciume bruno (monilia) sia dei fiori e dei rami (g 150-200 per q.le acqua, con un primo trattamento ai bottoni fiorali ed un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura) e dei frutti (g 100-150 per q.le acqua, trattando 30-35 gg e 15-20 giorni prima della raccolta).

PERO - indicato contro la maculatura bruna g 100-150 per q.le acqua con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti.

ALBERCOCCO - SUSINO - indicato contro la muffa grigia e marciumi da sclerotinia alla dose di g 100-200 per q.le acqua.

MANDORLO - indicato contro la monilia alla dose di g 150-200 per q.le acqua.

ACTINIDIA - indicato contro i marciumi da botrytis e marciumi da sclerotinia, a g 75-100/l alla caduta dei petali ed eventualmente in pre-raccolta; in post-raccolta con doccia (drainage) g 12/l; trattamenti per immersione: g 12/l.

NOCCIOLE - indicato contro la maculatura fogliare del nocciolo a g 75-100/l.

FRAGOLA - indicato contro la muffa grigia a g 80-100 per q.le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche: alla schiusura dei petali, poi con circa il 10-20% dei fiori aperti ed alla completa sfioritura. Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante.

PINKIXERO - indicato contro la muffa grigia g 80-100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco florale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 28 giorni prima della raccolta.

LATTUGA - indicato contro il mal dello sclerozio alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.

INDIVIA - indicato contro il mal dello sclerozio e la muffa grigia alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.

TABACCO - indicato contro i marciumi da botrytis e marciumi da sclerotini alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.

PEPERONE - MELANZANA - indicato contro la muffa grigia e marciumi da sclerotinia alla dose di g 80-100 per q.le acqua.

AGLIO - indicato contro la muffa grigia e mal dello sclerozio alla dose di g 30 per Kg 100 di seme.

CIPOLLA - indicato contro la muffa grigia e marciume bianco dei bulbi alla dose di g 100-150/l.

CETRIKOLA - indicato contro la marcescenza dei semi e morte delle piantule, marciumi da botrytis a g 100-150/l.

GIRASOLE - indicato contro la sclerotinia a g 100/l prima della fioritura e g 100-200 per q.le di seme nella concia.

COLZA - indicato contro la sclerotinia alla dose di Kg 1-1,5 per ettaro all'inizio della fioritura.

ORNAMENTALI - Indicato contro i marciumi da botrytis a g 40-80/l.

FLORICOLTURA (in pieno campo ed in serra) - viene indicato contro la muffa grigia della rosa a g 40-80 per q.le acqua, effettuando almeno 3 trattamenti iniziando dal germogliamento sino ad inizio fioritura, bagnando molto bene tutta la vegetazione. Indicato contro la muffa grigia della Gerbera, Geranio, Crisantemi, Garofano g 40-80 per q.le acqua trattando con presenza della malattia a ripetuti interventi. Indicato contro la rizzictonia del garofano ed altri ornamentali g 4 dispersi in 5-10 litri di acqua per mq di superficie, intervenendo 10 gg circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto e con comparsa dei primi sintomi della malattia ed eventualmente ripetendo l'intervento dopo circa un mese.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Miscibile con antifungicidi a reazione neutra.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Sui trattamenti alle colture orticole e floricole, specie se in serra, fare saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto della vite, girasole, susino; 60 giorni per l'actinidia (derrata post-raccolta); 45 giorni per la colza; 14 giorni prima del raccolto sulle altre colture.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L. - Via Montegrappa n. 7 - BERGAMO (BG) -
Stabilimento di produzione: **TERRANALISI S.R.L.** - Via Nino Rizzo n. 6 - Cesto (FE) / **STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA** Via Evangelista Torricelli n. 2 Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10757 del 19/03/2001

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO: g 100-200-500 Kg 1-5-10-15-20

Riferimento partita:

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SONNE

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
 Procimidone puro g 50
 Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

SONNE è un fungicida a base di Procimidone, che esplica la propria azione preventivamente ed in modo curativo nelle prime fasi di incubazione: risulta essere dotato di moderata attività sistemica.

Colture protette:

VITE - indicato contro la muffa grigia alla dose di g 100-150/lt, effettuando 3-4 trattamenti nei periodi di fase fioritura, poi quando gli acini hanno il diametro di ca. 3 mm (in coincidenza della chiusura del grappolo), poi si tratta all'invettitura 7-8 settimane prima del raccolto per finire 3-4 settimane prima della raccolta. Si consiglia di bagnare molto affinché vi sia una distribuzione uniforme del prodotto; l'impiego della dose più alta è su varietà più sensibili all'attacco della muffa.

PESCO - NETTARINE - indicato contro il marciume bruno (nervello) sia dei fiori e dei rami (g 150-200 per q.le acqua, con un primo trattamento ai bottoni floreali ed un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura) e dei frutti (g 100-150 per q.le acqua, trattando 30-35 gg e 15-20 giorni prima della raccolta).

PERO - indicato contro la muffa grigia e marciumi da sclerotinia alla dose di g 100-200 per q.le acqua.

ALBICOCCO - SUSINO - indicato contro la muffa grigia e marciumi da sclerotinia alla dose di g 100-200 per q.le acqua.

MANDORLO - indicato contro la muffa grigia alla dose di g 150-200 per q.le acqua.

ACTINIDIA - indicato contro i marciumi da botrytis e marciumi da sclerotinia, a g 75-100/lt alla caduta dei petali ed eventualmente in pre-raccolta; in post-raccolta con doccia (drain-chek) g 120/lt, trattamenti per immersione g 120/lt.

NOCCIOLO - indicato contro la maculatura fogliare del nocciuolo a g 75-100/lt.

FRAGOLA - indicato contro la muffa grigia a g 80-100 per q.le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche: alla schiusura dei petali, poi con circa il 10-20% dei fiori aperti ed alla completa sfioritura. Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante.

POMODORO - indicato contro la muffa grigia g 80-100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo pulcio fiorito e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 28 giorni prima della raccolta.

LATTUGA - indicato contro il mal dello scleroz alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.

INDIVA - indicato contro il mal dello scleroz e la muffa grigia alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.

TABACCO - indicato contro i marciumi da botrytis e marciumi da sclerotinia alla dose di Kg 1,5-2 per ettaro.

PEPERONE - MELANZANA - indicato contro la muffa grigia e marciumi da sclerotinia alla dose di g 80-100 per q.le acqua.

AGLIO - indicato contro la muffa grigia e mal dello scleroz alla dose di g 30 per Kg 100 di seme.

CIPOLLA - indicato contro la muffa grigia e marciume bianco dei bulbi alla dose di g 100-150/lt.

CETRILO - indicato contro la macerazione dei semi e morte delle plicole, marciumi da botrytis a g 100-150/lt.

GIRASOLE - indicato contro la sclerotinia a g 100/lt prima della fioritura e g 100-200 per q.le di seme nella coccia.

COLZA - indicato contro la sclerotinia alla dose di Kg 1-1,5 per ettaro all'inizio della fioritura.

ORNAMENTALI - indicato contro i marciumi da botrytis a g 40-80/lt.

FLORICOLTURA (in pieno campo ed in serra) - viene indicato contro la muffa grigia della rosa a g 40-80 per q.le acqua, effettuando almeno 3 trattamenti iniziando dal gonfiamento sino ad inizio fioritura, bagnando molto bene tutta la vegetazione. Indicato contro la muffa grigia della Gerbera, Geranio, Crisantemo, Geraniolo a g 40-80 per q.le acqua trattando con presenza della muffa a ripetuti interventi. Indicato contro la rinosporidio del geranio ed altri ornamentali g 4 dispersi in 5-10 litri di acqua per mq di superficie, intervenendo 10 gg circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto e con comparsa dei primi sintomi della malattia ed eventualmente ripetendo l'intervento dopo circa un mese.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Miscelabile con antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza - In caso di miscela con altri prodotti deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione consigliata.

FITOTOSSICITA' - Sui trattamenti alle colture orricole e floricole, specie se in serra, fare saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospensione i trattamenti 21 giorni prima del raccolto della vite, girasole, susino; 48 giorni per l'actinidia (raccolta post-raccolta); 45 giorni per la colza; 14 giorni prima del raccolto sulle altre colture.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AVVERTENZE D'USO

- Nel caso di miscela con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti.

- Non conservare i sacchetti idrosolubili luoghi umidi.

- Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

AGROWIN BIOSCIENCES srl - Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Stabilimento di produzione: S.T.I. S.M. FOTECNICA ITALIANA S.P.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Colligola (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10.757 del 19/03/2001

DA NON VENDERSI SFUSO

Riferimento parità:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI - NON TOCCARE CON MANI BAGNATE - DA SCIUGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO - DA NON VENDERE, NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

Contenuto del sacchetto : kg 1 (1 sacchetto idrosolubile da kg 1) / (2 sacchetti idrosolubili da g 500) / (4 sacchetti idrosolubili da g 250) / (5 sacchetti idrosolubili da g 200)

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili



1
Riempire l'atomizzatore
col 20-25% di acqua



2
Introdurre il numero di sacchetti
idrosolubili chiesti, previsti (come
da etichetta) nell'atomizzatore



3
Mettere in funzione
l'atomizzatore



4
Attendere lo scioglimento dei
sacchetti (in quanto minuti)
col



5
... aggiungere la restante parte
di acqua, necessaria alla corretta
bagnatura della vegetazione

SONNE

**FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE**

FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Procimidone puro g 50
- Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

**DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI**

AGROWIN BIOSCIENCES srl

Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Contenuto del sacchetto :

kg 1 - g 500 – 250 - g 200

AVVERTENZA : LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10.757 del 19/03/2001

STEEL

Fungicida organico di contatto
POVERE BAGNOLI, S.

Petite n.°

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

iprodione puro g 80

Coloranti n.° a b g 200

ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Natura del Rischio: Sostanza pericolosa per l'ambiente, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme Precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corai d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consigli interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

TRIAL è un fungicida ad azione polivalente, che agisce per contatto sia contro le spore, sia contro il micelio di numerose malattie crittogamiche.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

VITICOLTURA

contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) alla dose di 1,5-2 kg/ha distribuita con 1000-1500 litri d'acqua. Trattare alla fioritura, prima della chiusura dei grappoli, all'inizio dell'invasione e 2-3 settimane dopo l'invasione. Per le varietà sensibili alla Botrytis del peduncolo, effettuare un trattamento anticipato in pre-fioritura. Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti ed esplica inoltre una azione frenante nei confronti del Mal bianco. TRIAL può essere indicato anche per effettuare trattamenti polivalenti in miscela con olio vegetale, alle stesse dosi sopra indicate.

FRUTTICOLTURA

• **POACEE:**
- Pero: contro Alternaria (*Stemphylium vesicarium*), alla dose di 150g/ha innalzando i trattamenti alla caduta dei petali e proseguirli alla caduta di 15 giorni sino al termine di carenza.

DRUPACEE:

• Pesco, Albicocco, Mandorlo, Sualco, Ciliegio
contro Monilia (*Monilia fructigena*) alla dose di 150 g/ha trattando prima, durante e dopo la fioritura.

FRAGOLA

contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) alla dose di 1,5-2 kg/ha. Trattare all'inizio della fioritura e ripetere ogni 8-10 giorni, secondo l'andamento stagionale.

ACTINIDIA

contro Botrite (*Botrytis* sp.) e Sclerotinia (*Monilia* sp.) alla dose di 75-100 g/ha innalzando all'inizio della fioritura, in piena fioritura, alla caduta dei petali, all'ingrossamento dei frutticini e 2-3 settimane prima della raccolta. Negli impianti in piena produzione non impiegare meno di 1,5 kg/ha.

Trattamenti alla frutta raccolta:

• Limoni, contro Alternaria (*Alternaria citri*) alla dose di 100-150 g/ha.
• Mele, Pere: contro Alternaria (*Stemphylium vesicarium*), Botrite (*Botrytis cinerea*) e Penicillium (*Penicillium* spp.) alla dose di 100-150 g/ha. Effettuare i trattamenti di post-raccolta per aspersione a per immersione in una sospensione di prodotto alla dose indicata.

I trattamenti dovranno essere effettuati in ambienti appositamente strazzati per le operazioni meccaniche che escludano l'intervento diretto dall'operatore e che consentano l'immagazzinamento con frigorificazione. La soluzione eccedente al trattamento dovrà essere prelevata da ditta specializzata per la sua depurazione (fecce e microbiologia).

OTTOLOGIA

- Cerchio cappuccio: contro Alternaria alla dose di 150 g/ha.
- Lattuga: contro Marconium del colletto (*Botrytis* sp.), Sclerotinia spp. alla dose di 1,5 kg/ha innalzando con trattamenti fogliari ripetuti.
- Indivia: contro Botritide (*Sclerotinia minor*, *S. sclerotiorum*) alla dose di 0,5-1 g/m².
- Pomodoro, Peperone e Melanzana: contro Botrite (*Botrytis* spp.) e Alternaria alla dose di 100-150 g/ha innalzando con trattamenti fogliari ripetuti.
- Aglio: contro il Mal dello Scorbuto (*Sclerotium cepivorum*), impolverazione dei bulbi e 200 g per 100 kg di bulbi. Dato il gran numero di varietà e le differenti condizioni ambientali, è consigliabile effettuare saggi d'impiego preliminari.

PATATA: contro Riztoniosi (*Rhizoctonia solani*), immergere i tuberi per 5 minuti in una soluzione di 800 g/ha prima della semina.

BALSAMIFERA DA SUCCEDANEO contro Mal del piede (*Phoma betulae*):

- disinfezione del seme mediante impolverazione con 300 g per 100 kg di seme;
- disinfezione delle piante portassano:

- prima del trapianto: immersione in una sospensione a 400 g/ha
- trattamento in vegetazione delle stesse: 150-200 g/ha

CEREALI

• Riso: contro Sclerotio (*Sclerotia* sp.), Emmitosporio (*Helminthosporium oryzae*), Riztoniosi (*Rhizoctonia* sp.), trattato alla prima comparsa dei sintomi con 0,5-1 kg/ha.

• Frumento, Orzo, cereali minori e Riso: con la semina contro la Carie (*Tilletia* sp.) del germinale e dei cereali minori (*Helminthosporium* spp.) dell'orzo, dei cereali minori e del riso utilizzando 150-200 g di formulato per 100 kg di sementi.

• COLZA: contro Alternaria (*Alternaria* spp.) e Sclerotinia (*Sclerotinia* spp.), effettuare 1-2 trattamenti durante la fioritura, con un intervallo di 15 giorni tra un trattamento e l'altro, alla dose di 1 kg/ha.

COLTURA FLORICOLA ED ORNAMENTALI:

- contro Botrite (*Botrytis cinerea*) alla dose di 150 g/ha.
- contro Alternaria del germinale (*Alternaria alternata*) alla dose di 200 g/ha.
- contro Mal del colletto (*Rhizoctonia solani*) del giardino alla dose di 2-4 g/m².

Considerato il gran numero di specie e varietà, nonché le differenti condizioni ambientali, è consigliabile effettuare saggi d'impiego preliminari.

TAPPETI VERDI DI GRANIMAZIONE PER CAMPI DA GOLF E CAMPI DI CALCIO

- contro Fusarium spp., Corticium *Isotoma* (Fl. rouge) e Typhula alla dose di 10-12 kg/ha.

Per la preparazione della miscela, mettere la dose in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea. Versarla nell'irrigatore e portarla a volume agitando.

Impedire l'accesso nell'area trattata prima di 12 ore dall'irrigazione e comunque fino a che la vegetazione è completamente asciutta. Cautela dalle erbe infestanti: i semi, trattati e residui della semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi concluse non riutilizzabili, devono essere conservate le norme vigenti sui rifiuti tossici e nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare su piante "Dolce del Corallo".

COMPATIBILITÀ: Non è miscelabile con formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospensione i trattamenti:

18 giorni prima della raccolta su actinidia; 31 giorni prima della raccolta su lattuga, indivia, pomodoro, peperone, melanzana, pero, fragola, cavolo cappuccio; 28 giorni prima della raccolta su vite a riso; 40 giorni prima della raccolta su pesco, albicocco, ciliegio, mandorlo; 48 giorni prima della raccolta su colza.

Dopo il trattamento di post-raccolta far trascorrere almeno 30 giorni per i limoni e 10 giorni per mele e pere prima di immetterli al consumo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Contenuto netto: g 80 - 100 - 250 - 500

kg 1 - 5 - 10 - 25

DA NON VENDERSI SFUSO

AGROWIN BIOSCIENCES srl

Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Officina di produzione: STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Colognola (RA) / ADICA srl - Nera Montoro (TR)

Registrazione n. Del Ministero della Sanità del

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

STEEL

FUNGICIDA UNIVERSALE A CONTATTO
POLVERE BASIFUGO IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

Partita n.°

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Iprodione puro g 50
Coformulanti q.b. a 100

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

Natura del Rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme Precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone, informando i medici. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consigli; interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

STEEL è un fungicida ad azione polivalente, che agisce per contatto sia contro le spore, sia contro il micelio di numerose malattie crittogamiche.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

VITICOLTURA

contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) alla dose di 1,5-2 kg/ha distribuiti con 1000-1500 litri d'acqua. Trattare alla sifonatura, prima della chiusura dei grappoli, all'inizio dell'invaiatura e 2-3 settimane dopo l'invaiatura. Per le varietà sensibili alla Botrite del peduncolo, effettuare un trattamento anche in pre-floritura. Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti ed esplica inoltre una azione frenante nei confronti del Mal bianco. STEEL può essere indicato anche per effettuare trattamenti polivalenti in miscela con zolfo ventilato, alle stesse dosi sopra indicate.

FRUTTICOLTURA

• **POMACEE:**
- Pero: contro *Alternaria* (*Stemphylium vesicarium*) alla dose di 150g/ha iniziando i trattamenti alla caduta dei petali e proseguendo alla cadenza di 15 giorni sino al termine di carenza.

• DRUPACEE:

- Pesco, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio
contro *Monilia* (*Monilia fructigena*) alla dose di 150 g/ha trattando prima, durante e dopo la fioritura

• FRAGOLA

contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) alla dose di 1,5-2 kg/ha. Trattare all'inizio della fioritura e ripetere ogni 8-10 giorni, secondo l'andamento stagionale.

• ACTINIDIA

contro Botrite (*Botrytis* sp.) e Sclerotinia (*Monilia* sp.) alla dose di 75-100 g/ha intervenendo all'inizio della fioritura, in piena fioritura, alla caduta dei petali, all'ingrossamento dei frutticini e 2-3 settimane prima della raccolta. Negli impianti in piena produzione non impiegare meno di 1,5 kg/ha

• Trattamenti alla frutta raccolta:

- Limoni, contro *Alternaria* (*Alternaria citri*) alla dose di 100-150 g/ha
- Mela, Pero: contro *Alternaria* (*Stemphylium vesicarium*), Botrite (*Botrytis cinerea*) e *Penicillium* (*Penicillium* spp.) alla dose di 100-150 g/ha. Effettuare i trattamenti di post-raccolta per aspersione o per immersione in una sospensione di prodotto alle dosi indicate

I trattamenti dovranno essere effettuati in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccaniche che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento con frigo-conservazione. La soluzione eccedente al trattamento dovrà essere prelevata da ditta specializzata per la sua depurazione (fisica o microbiologica).

ORTICOLTURA

- Cavolo cappuccio: contro *Alternaria* alla dose di 150 g/ha
- Lattuga: contro *Maricium* del colletto (*Botrytis* sp., *Sclerotinia* spp.) alla dose di 1,5 kg/ha intervenendo con trattamenti fogliari ripetuti.

- Indivia: contro Sclerotinia (*Sclerotinia minor*, *S. sclerotiorum*) alla dose di 6-8 g/m²
- Pomodoro, Peperone e Melanzana: contro Botrite (*Botrytis* spp.) e *Alternaria* alla dose di 100-150 g/ha intervenendo con trattamenti fogliari ripetuti.
- Aglio: contro il Mal dello Sclerotium (*Sclerotium cepivorum*), impolverazione dei bulbi a 300 g per 100 kg di bulbi. Data il gran numero di varietà e le differenti condizioni ambientali, è consigliabile effettuare saggi d'impiego preliminari.

PATATA: contro Rizottoniosi (*Rhizoctonia solani*), immergere i tuberi per 5 minuti in una soluzione di 800 g/ha prima della semina.

BARBASTOLA DA ZUCCHERO: contro Mal del piede (*Phoma betulae*):

- disinfezione del seme mediante impolverazione con 300 g per 100 kg di granuli;
- disinfezione delle piantine portatense:
- prima del trapianto: immersione in una sospensione a 400 g/ha
- trattamento in vegetazione delle stesse: 150-200 g/ha

CEREALI

• Riso: contro Septoriosi (*Septoria* sp.), Elminiosporiosi (*Helminthosporium oryzae*), Rizottoniosi (*Rhizoctonia* sp., trattando alla prima comparsa dei sintomi con 0,8-1 kg/ha).

• Frumento, Orzo, cereali minori e Riso: concia delle sementi contro la Carie (*Tilletia* sp.) del frumento e dei cereali minori; l'Elminiosporiosi (*Helminthosporium* spp.) dell'orzo, dei cereali minori e del riso utilizzando 150-200 g di formulato per 100 kg di sementi.

COLZA: contro *Alternaria* (*Alternaria* spp.) e Sclerotinia (*Sclerotinia* spp.), effettuare 4-2 trattamenti durante la fioritura, con un intervallo di 15 giorni tra un trattamento e l'altro, alla dose di 1 kg/ha.

CULTURE FLOREAUJE D'ORNAMENTALI:

- contro Botrite (*Botrytis cinerea*) alla dose di 150 g/ha
- contro *Alternariosi* dell'agrofano (*Alternaria dianthi*) alla dose di 200 g/ha
- contro Mal del colletto (*Rhizoctonia solani*) del garofano alla dose di 2-4 g/m²

Considerare il gran numero di specie e varietà, nonché le differenti condizioni ambientali, è consigliabile effettuare saggi d'impiego preliminari.

TAPPETI EROSI DI GRAMINACEE PER CAMPI DA GOLF E CAMPI DI CALCIO

- contro *Fusarium* spp., *Corticium fusicornis* (Fuligine) e *Typhula* alla dose di 10-12 kg/ha.

Impedire l'accesso nell'area trattata prima di 12 ore dall'irrigazione e comunque fino a che la vegetazione è completamente asciutta

Concia delle sementi: I semi trattati e residui della semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

Per la preparazione della miscela, mettere la dose in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea. Versare nell'irroratrice e portare a volume sgoltando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare su pera "Decana del Comizio".

COMPATIBILITÀ: Non è miscibile con formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere indotte osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti:

15 giorni prima della raccolta su actinidia; 21 giorni prima della raccolta su lattuga, indivia, pomodoro, peperone, melanzana, pero, fragola, cavolo cappuccio; 28 giorni prima della raccolta su vite e riso; 40 giorni prima della

raccolta su pesco, albicocco, ciliegio, mandorlo; 45 giorni prima della raccolta su colza.

Dopo il trattamento di post-raccolta far trascorrere almeno 30 giorni per i limoni e 10 giorni per mele e pere prima di immetterli al consumo

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

AVVERTENZE D'USO

- Nel caso di miscela con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti
- Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi.
- Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola

AGROWIN BIOSCIENCES srl

Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Officina di produzione: STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA)

Registrazione n. 10.733 del 18/02/2001 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - SMALTIRE SECONDE LE NORME VIGENTI - NON TOCCARE CON MANI BAGNATE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO - DA NON VENDERE, NE CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

Contenuto del sacchetto:

- kg 1 (1 sacchetto idrosolubile da kg 1)
- (2 sacchetti idrosolubili da g 500)
- (4 sacchetti idrosolubili da g 250)
- (5 sacchetti idrosolubili da g 250)

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili



1
Risciacquare l'irroratrice
con acqua e acqua

2
Introdurre il miscelato di sacchetti
idrosolubili diluiti, previsti come
da etichetta nell'irroratrice



3
Mettere in funzione
l'irroratrice



4
Aggiungere la quantità dei
sacchetti idrosolubili previsti
da etichetta alla miscela



5
Aggiungere la quantità dei
sacchetti idrosolubili previsti
da etichetta alla miscela

STEEL

Fungicida organico di contatto

TIPO DI FORMULAZIONE : POLVERE BAGNABILE (IN SACCHETTI
IDROSOLUBILI)

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

-Iprodione puro g 50

-Coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

**DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI**

AGROWIN BIOSCIENCES srl

Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Contenuto del sacchetto :

kg 1 - g 500 – 250 - g 200

**AVVERTENZA : LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA
CONFEZIONE**

Registrazione n. 10.733 del 16/02/2001 del
Ministero della Sanità

TEAM

tipo di formulazione : polvere bagnabile

Fungicida

Composizione:

-Fosetil Alluminio puro

g. 80

-Coformulanti

q.b. a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI : Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE : in caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Fungicida che possiede azione sistemica che si manifesta in modo ascendente e discendente che è evidente con vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita, e gli permette di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento, quindi dotato di una notevole mobilità sulle colture trattate.

Vite : viene impiegato contro la Peronospora alla dose di g. 250 per q.le acqua trattando sempre in miscela con prodotti di copertura.

Melo, Pero, Pesco, Actinidia : viene impiegato contro la Phytophthora cactorum trattando sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl. Nel caso di colture già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida, effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da Kg. 5 di prodotto per 100 litri d'acqua.

Melo - Pero : viene impiegato contro la Tichialatura con trattamenti preventivi a g. 150 - 250, nelle fasi pre - fiorali e subito dopo l'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura o con Dodina. Pero : viene impiegato contro la Maculatura bruna (Stemphylium sp.), trattamenti preventivi a 250 g. per q.le acqua. Fragola : viene impiegato contro la Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 innaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g. 0,5 di formulato per pianta. Lattuga : viene impiegato contro la Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg. di prodotto per ettaro). Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto; se si verificano forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. Melone : viene impiegato contro la Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro. Cocomero, Cetriolo, Spinacio : viene impiegato contro la Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro). Carciofo : viene impiegato contro la Bremia lactucae a 200-300 g/hl. Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo : viene impiegato contro Phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl, utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche); pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida. Viveri di fruttiferi : effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl con cadenza mensile. Viveri di agrumi : impiegare la dose di 400 g/hl ogni 60 giorni. Colture Ornamentali in pieno campo ed in serra : Viene impiegato contro la Phytophthora cinnamomi di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee. Poinsettia, St.Paulia e Grisantema, effettuare un'innaffiatura alla base delle piante con g. 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame, di Dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto. Nella miscelazione del prodotto con altri formulati si consigliano comunque saggi preliminari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 15 giorni prima del raccolto su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni prima del raccolto su fragola; 40 giorni prima del raccolto su melo, pero, pesco, actinidia e vite; 80 giorni prima della raccolta di arancio, limone, mandarino, pompelmo.

Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni)

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGROWIN BIOSCIENCES srl

Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Officina di produzione : STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Catignola (RA) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE)

Registrazione n° 10.768 del 23/03/2001 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Partito n.

- kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20

TEAM

tipo di formulazione : polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Composizione:

-Fosetil Alluminio puro
-Coformulanti

g. 80
qb a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI : Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE : in caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' D'IMPIEGO

Fungicida che possiede azione sistemica che si manifesta in modo ascendente e discendente che è evidente con vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita, e gli permette di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento; quindi dotato di una notevole mobilità sulle colture trattate.

Vite : viene impiegato contro la Peronospora alla dose di g. 250 per q.le acqua trattando sempre in miscela con prodotti di copertura.

Melo, Pero, Pesco, Actinidia : viene impiegato contro la Phytophthora cactorum trattando sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl. Nel caso di colture già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da Kg. 5 di prodotto per 100 litri d'acqua.

Melo - Pero : viene impiegato contro la Ticchiolatura con trattamenti preventivi a g. 150 - 250, nelle fasi pre - fiorali e subito dopo l'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura o con Dodina. **Pero** : viene impiegato contro la Maculatura bruna (Stemphylium sp.), trattamenti preventivi a 250 g. per q.le acqua. **Fragola** : viene impiegato contro la Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g. 0,5 di formulato per pianta. **Lattuga** : viene impiegato contro la Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg. di prodotto per ettaro). Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto; se si verificano forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.

Melone : viene impiegato contro la Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro. **Cocomero, Cetriolo, Spinacio** : viene impiegato contro la Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg. di prodotto per ettaro). **Carciofo** : viene impiegato contro la Bremia lactucae a 200-300 g/hl. **Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo** : viene impiegato contro Phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl, utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche); pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida. **Vivai di fruttiferi** : effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl con cadenza mensile. **Vivai di agrumi** : impiegare la dose di 400 g/hl ogni 60 giorni. **Colture Ornamentali in pieno campo ed in serra** : Viene impiegato contro la Phytophthora cinnamoni di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee. Poinsettia, St.Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g. 5-10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA' : il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame, di Dicofo e con concimi fogliari contenenti azoto. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto. Nella miscelazione del prodotto con altri formulati si consigliano comunque saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti : 15 giorni prima del raccolto su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni prima del raccolto su fragola; 40 giorni prima del raccolto su melo, pero, pesco, actinidia e vite; 80 giorni prima della raccolta di arancio, limone, mandarino, pompelmo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AVVERTENZE D'USO

- Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti.

- Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi.

- Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

AGROWIN BIOSCIENCES

srl - Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Officina di produzione : STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA)

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - SMALTIRE SECONDO LE

NORME VIGENTI - NON TOCCARE CON MANI BAGNATE - DA SCIOLGERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

L'INVOLUCRO - DA NON VENDERE, NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

Registrazione n. 10.768 del 23/03/2001 del Ministero della Sanità

- Partita n. ...

Contenuto del sacchetto :

kg 1 (1 sacchetto idrosolubile da kg 1)

(2 sacchetti idrosolubili da g 500)

(4 sacchetti idrosolubili da g 250)


(5 sacchetti idrosolubili da g 200)

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili



1
Riempire l'atomizzatore
col 20-25% di acqua



2
Introdurre il numero di sacchetti
idrosolubili chiusi, previsti (come
da etichetta) nell'atomizzatore



3
Mettere in funzione
l'agiatore



4
Attendere lo scioglimento dei
sacchetti (tre-quattro minuti),
ed.....



5
.....aggiungere la restante parte
di acqua, necessaria alla corretta
bagnatura della vegetazione

TEAM

tipo di formulazione : polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Composizione:

-Fosetil Alluminio puro g. 80
-Coformulanti qb a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

**DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI**

AGROWIN BIOSCIENCES srl

Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Contenuto del sacchetto :

kg 1 - g 500 – 250 - g 200

**AVVERTENZA : LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA
CONFEZIONE**

Registrazione n. 10.768 del 23/03/2001 del Ministero della Sanità

TURM

Fungicida preventivo con azione per contatto fogliare
tipo di formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

TURM

Composizione:

- Diclofluamide puro g. 50
- Coformulanti q.b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO: irritante per gli occhi - può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Usare l'indumento protettivo e guanti adatti - Proteggersi gli occhi - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

AGROWIN BIOSCIENCES srl - Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Registrazione Ministero della Sanità n. 10498 del 31/05/2000

Il contenitore non può essere riutilizzato

stabilimento di produzione: STI-SOLFOTECNICA ITALIANA spa - Cotignola (RA)

Contenuto del sacchetto: kg 1 (1 sacchetto idrosolubile da kg 1) / (2 sacchetti idrosolubili da g 500) / (4 sacchetti idrosolubili da g 250) / (10 sacchetti idrosolubili da g 100)

Partita Nr.



NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveneni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Fungicida che esplica un'azione preventiva, per contatto fogliare; ha azione eradicante nei confronti dell'oidio della rosa ed è selettivo nei confronti di *Phytoseilus persimilis* (acaro predatore).

(dosaggi per q.le acqua, salvo diversa indicazione)

MELO - PERO: contro ticchiolatura, marciume dei frutti (gliosporium e lieviti) e macchiatura bruna del pero ed anche azione collaterale contro l'oidio del melo, alla dose di g. 100 - 200.

VITE: contro botrytis, peronospora, black rot, escoriosi e con azione collaterale contro l'oidio alla dose di g. 150 - 200.

FRAGOLA - LAMPONE - ROVO - RIBES: contro viosolatura, botrytis, oidio, antracnosi lieviti e gliosporium alla dose di g. 100 - 200.

POMODORO - PATATA - PEPPERONE - MELONE - CETRIOLO - FAGGIOLO - LATTUGA - CIPOLLA: contro alternariosi, peronospora, antracnosi, cladosporiosi, botrytis, septoriosi e stemphylium ed azione secondaria contro l'oidio alla dose di g. 100 - 200. Nei trattamenti sotto tunnel la dose massima è di 100 g.

CONCIA SEME: g. 200 - 300 per q.le seme di soia, arachide, cotone e sorgo e g. 200 - 500 per q.le seme di cucurbitacee, legumi, bietola da costa e da orto, solanacee, finocchio, cavoli, carote, spinacio, sedano ed insalate, lupini e bafili.

Il seme deve essere impiegato esclusivamente per la semina; non deve essere quindi riutilizzato per l'alimentazione dell'uomo, degli animali domestici del bestiame e della selvaggina.

ROSA: g. 300 - 500 contro la ticchiolatura ed il mel bianco

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': evitare miscela con prodotti liquidi - **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': trattare le rose in sera solo dopo aver raccolto i fiori

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di melo e pero, 10 giorni per pomodoro - peperone - melone - cetriolo - fagiolo - lattuga - cipolla, 14 giorni fragola - lampone - rovo - ribes e 20 giorni per patata e vite

attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

AVVERTENZE D'USO

- Nel caso di miscela con altri prodotti incompatibili si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti

- Non conservare i sacchetti idrosolubili luoghi umidi

- Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE -

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI - DA NON VENDERSI SFUSO - NON TOCCARE CON MANI BAGNATE - DA SCIOLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO - DA NON VENDERE, NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene prodotti idrosolubili



1
Esempio l'ammiscelazione col 20-25% di acqua



2
Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiesti, previsti (come da etichetta) nell'ammiscelazione



3
Mettere in funzione l'apparecchio



4
Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.....



5
aggiungere la restante parte di acqua, secondo la capacità massima della vegetazione

TURM

FUNGICIDA PREVENTIVO CON AZIONE PER CONTATTO FOGLIARE
FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

Composizione:

- Diclofluanide puro g. 50
- Coformulanti qb. a g. 100



DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI

AGROWIN BIOSCIENCES srl

Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Contenuto del sacchetto :

kg 1 - g 500 – 250 - g 100

AVVERTENZA : LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

Registrazione del Ministero della Salute n.10498 del 31-5-2000

WOGÉ

WOGÉ - FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
Dodina pura g 35 (6/1 355)
Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AGROWIN BIOSCIENCES srl

Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA spa - S. Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità del

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO: ml 100-250-500 € 1-5-10-20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: a carico dell'apparato gastroenterico: dolori addominali, bruciori gastrici, solleggi, diarrea; a carico dell'apparato circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia. Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinfaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveneti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fungicida ad attività preventiva e curativa.

Grazie alla speciale formulazione flowable, WOGÉ si distingue dai tradizionali prodotti in polvere bagnabile per la migliore adesività, uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento.

MODALITA' D'IMPIEGO

Le seguenti dosi sono riferite a 100 litri di acqua

Melo e Pero - In primavera-estate, contro ticchiolatura in funzione preventiva si usa a ml 100-140, intervenendo ogni 6-7 giorni;

alla dose di ml 150-180, usando entro 48 ore dall'inizio della pioggia

infettiva esplica una buona azione curativa.

Pesce, Albicocco, Ciliegio - Contro monilia e sclerotinia ml 100-130.

Trattamenti preventivi: effettuare almeno 3 trattamenti all'apertura dei petali, alla fine della fioritura ed alla caduta dei petali.

Pesce - Contro bolia (in autunno dopo caduta foglie e in pre-fioritura) ml 180-230.

Ciliegio - Contro cilindrosporiosi ml 125-150.

Trattamenti preventivi: effettuare almeno 3 trattamenti iniziando subito dopo la fioritura ad intervalli di circa 10-15 giorni.

Vite - In primavera-estate, contro peronospora ml 130-200.

Fragola - In primavera, contro la muffa grigia e viarolatura ml 80-140 per trattamenti preventivi; ml 200 per trattamenti curativi.

Insalata, spinacio, sedano, finocchio, basilico, carota - ortaggi a frutto - ortaggi a bulbo - In primavera-estate, contro peronospora, alternaria, riosi, fusariosi, antracnosi ml 130 per trattamenti preventivi; ml 200 per trattamenti curativi.

Patata - In primavera-estate, contro peronospora ml 125-150.

Olio - contro occhio di pavone ml 150. Effettuare due interventi:

- primavera alla ripresa vegetativa delle gemme

- autunnale fra fine Settembre e i primi di Ottobre.

Nespolo - contro la ticchiolatura alla dose di ml 100-130 intervenendo alla fase di bottoni fiorali all'ingrossamento del frutto a seconda delle condizioni climatiche.

Pioppo - Per una difesa contro la marssonina intervenire a fine Aprile e nella seconda metà di Maggio, alla dose di ml 150-200 eventualmente ripetendo il trattamento a distanza di 3-4 settimane.

Floral, ornamentali - contro alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi, peronospora, rugine, septoriosi e ticchiolatura che attaccano garofano, rosa, bulbose ed altre ornamentali, intervenire con la dose preventiva di ml 130 aumentando a ml 200 in caso di interventi curativi e ripetendo ad intervalli di 7-10 giorni.

Preparazione della polliglia: diluire direttamente il prodotto in acqua agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaryl, Dimetato, Metilazinfos, DDVP. Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dare luogo a scarsa sospensibilità. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde con temperature esterne prossime a 0°C.

AVVERTENZE - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

TOSSICITA' - Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci, le api e gli insetti utili.

AVVERTENZE - Da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

ZAM

Erbicida selettivo
TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE
IN SACCHETTI INDESTRUCIBILI

Partita n.°

Composizioni:

g 100 di prodotto contengono:

Propilamide pura g 76

Coformulanti g 5 e 100

Frasi di rischio:

Nocivo per l'acquedotto

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori dalla portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non respirare le polveri

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Usare indumenti protettivi adatti

In caso di malassorbimento consultare il medico (se possibile, mostrarli l'etichetta)

l'etichetta)

AGROWIN BIOSCIENCES srl

Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Officina di Produzione:

S.T.I. - Solitecnica Italiana S.p.A. - Codignola (RA)

Registrazione n. 10.711 del 16/02/2001 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corai d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: gastroenterici (bruciore gastroenterici, dolori addominali, diarrea) e cardiaco (coliche, ipotensione, aritmia, clonici), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante.

Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antivenali

CARATTERISTICHE

ZAM è un erbicida che agisce sulle infestanti per assorbimento radicale, distruggendole quando sono ancora nella prima fase di sviluppo. È quindi molto importante che al momento dell'applicazione il terreno sia umido: in caso contrario è indispensabile effettuare una abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dal trattamento. Nel caso in cui si preferisca una irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il prodotto prima della semina o del trapianto, incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi ZAM è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono più abbondanti), risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti ed in particolare delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 200-400 litri d'acqua per ettaro.

Infestanti sensibili:

GRAMINACEE - *Alipocurus myosuroides*, *Avena feta* (in pre-emergenza), *Oxalis articulata*, *Lolium* spp., *Poa* spp., *Setaria* spp. ed in genere tutte le graminacee annuali monochili, nel periodo invernale anche alcune graminacee perenni.
 DICOTILEDONEI - *Chenopodium album*, *Cuscuta* spp., *Detula stramonium*, *Paver nigras*, *Pimpinella* spp., *Portulaca oleracea* e *Portulaca*, *Pentstemon*, *Rumex* (da serie), *Solanum nigrum*, *Stellaria media*, *Urtica* spp., *Valeriana*.

Infestanti mediamente sensibili:

Amaranthus spp., *Cassia bursa-pastoris*, *Galium aparine*, *Polygonum lapathifolium*.

Infestanti resistenti: *Amaranthus graziatus*, *Cyperus* spp., *Galinsoga parviflora*, *Malvastrum ciliatum*, *Ranunculus acris*.**DOSE D'IMPIEGO**

a) Latughe e simili:

in pre-emergenza delle infestanti

pre-emergenza / post-trapianto

applicando il prodotto alla dose di

post-emergenza / post-trapianto,

applicando il trattamento nei 15-20 giorni successivi, intervenire alla

dose di:

in post-emergenza delle infestanti

intervento durante il periodo autunno-invernale con terreno umido,

alla dose di:

pre-emergenza delle infestanti

intervento subito dopo la semina:

Cardeto

pre-emergenza delle infestanti

in post-trapianto o dopo l'ultima lavorazione

Erbia medica

su coltura in uso in autunno-inverno e lotta contro le cuscute (entro

febbraio) oppure dopo il primo sfalcio

(entro 3-4 giorni)

Trifoglio violetto e ladro, Bulla, Lupinella

su coltura in uso in autunno-inverno

Barbabietola da zucchero

contro le cuscute:

trattamenti a dosi basse: con biotile allo sfalcio di 2-4 foglie, utilizza-

re dosaggi di 0,7 - 1 kg/ha con 1 o 2 trattamenti

trattamenti a dosi più elevate: non trattare fino a che la pianta meno

svilupposta abbia raggiunto lo stadio di 8-9 foglie vere, curando di

non intervenire oltre lo stadio di 10-12 foglie vere (per lo più sviluppa-

to).

la dose più alta va impiegata quando la cuscute ha già paralizzato

la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti meno tardivi for-

tescono un controllo parziale della cuscute.

Vite, Melo, Pero

interventi a fine autunno inizio inverno

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il pe-

riodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precau-

zionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossica-

zione, informare il medico della miscelazione completa.

Non trattare nelle zone trattate prima di 24 ore

Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia

trascorso l'ampio di carenza

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su bar-

babietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provoca-

re fitotossicità (malformazioni).

Ripetere i successivi interventi tra l'applicazione del ZAM e la successiva

semina di colture sensibili.

a) Colture moderatamente tolleranti: mais, fagioli, sorgo, patata, crucifera -

due mesi

b) Colture moderatamente sensibili: melanzana, lino, aglio, menta, cipolla, peper-

zone, spinacio, barbabietola da zucchero, pomodoro - quattro mesi

c) Colture molto sensibili: cereali da granella in genere (orzo, avena, frumento,

segale) e graminacee foraggere - sei mesi

Effettuate prima dell'impiego di tali colture una profonda lavorazione interrando

sempre i residui.

NOTICIA: il prodotto è tossico per i pesci. Non far pascolare il bestiame pri-

ma che siano trascorsi 20 giorni dal trattamento. Attenzione: da impiegare es-

clusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto

è responsabile degli eventuali danni derivanti da un improprio del preparato.

AVVERTENZE D'USO

a) Nel caso di miscela con altri prodotti antiparassitari al consiglio di procedere

prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti (procedibili, quindi di ag-

giungere gli altri prodotti).

Non conservare i sacchetti indestruttibili negli urti

- Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola

DA NON VENDERSI INIZIO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI -

NON TOCCARE CON MANI BAGNATE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA RINVA

ROMPERE L'INVOLUCRO - DA NON VENDERSI NEI CONSERVARI FUORI

DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

MODO DI UTILIZZO

Questo contenuto consente di trattare:

Contenuto del sacchetto:

kg 1 (1 sacchetto indestruttibile da kg 1)

(2 sacchetti indestruttibili da kg 500)


(4 sacchetti indestruttibili da kg 250)

(8 sacchetti indestruttibili da kg 200)



2

Trattare i terreni di valore
 da colture (patata, pomodoro, etc.)
 da colture (mais, etc.)



3

Trattare le colture di valore
 da colture (patata, pomodoro, etc.)
 da colture (mais, etc.)

4

Trattare le colture di valore
 da colture (patata, pomodoro, etc.)
 da colture (mais, etc.)

5

Trattare le colture di valore
 da colture (patata, pomodoro, etc.)
 da colture (mais, etc.)

ZAM

Erbicida selettivo

TIPO DI FORMULAZIONE : POLVERE BAGNABILE

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

-Propizamide pura g 75

-Coformulanti qb a 100



**DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI**

AGROWIN BIOSCIENCES srl

Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Contenuto del sacchetto :

kg 1 - g 500 – 250 - g 200

**AVVERTENZA : LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA
SULLA CONFEZIONE**

Registrazione n. 10.711 del 15/02/2001 del Ministero della Sanità

ZAM**Erbicida selettivo**
POLVERE BAGNABILE

Partita n.°

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Propamida pura g 75

Coformulanti q.b. e 100

Fraz. di Rischio :

Nocivo per ingestione

Consigli di Prudenza :

Conservare fuori dalla portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non respirare la polvere

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Usare indumenti protettivi adatti

In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrarli gli

febricitari)

AGROWIN BIOSCIENCES srl

Via Monte Grappa, 7 - Bergamo

Officina di Produzione :

S.T.I. - Solfo-tecnica Italiana S.p.A. - Codignola (RA)

Registrazione n. 10711 Ministero della Sanità del 18/02/2001

Contenuto netto 1 g 50 - 100 - 250 kg 1 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali : Non operare contro vento; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi : gastroenteriti (bruciori gastroesofagi, dolori addominali, diarrea) e cardiocirculatori (ipertensione, aritmia, clonosi), irritante per cute e mucose, fotosenesibilizzante.

Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

ZAM è un erbicida che agisce sulle infestanti per assorbimento radicale, distruggendole quando sono ancora nelle prime fasi di sviluppo. È quindi molto importante che al momento dell'applicazione il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile effettuare una abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dal trattamento. Nel caso in cui si

prattori una brigazione per infestazione, è preferibile distribuire il prodotto prima della semina o del trapianto, incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi ZAM è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono più abbondanti), risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti ed in particolare delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 200-400 litri d'acqua per ettaro.

Infestanti sensibili :

GRAMINACEE - *Allopecurus myosuroides*, *Avena fatua* (in emergenza), *Digitaria sanguinalis*, *Lolium spp.*, *Poa spp.*, *Setaria spp.* ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee perenni.
DICOTILEDONI - *Chenopodium album*, *Cucurbita spp.*, *Datura stramonium*, *Papaver rhoeas*, *Pisatello spp.*, *Polygonum aviculare* e *perennans*, *Portulaca oleracea*, *Rumex* (da seme), *Solanum nigrum*, *Stellaria media*, *Urtica spp.*, *Veronica*.

Infestanti mediamente sensibili :

Amaranthus spp., *Capsella bursa-pastoris*, *Echinochloa crus-galli*, *Polygonum lapathifolium*.

Infestanti resistenti : *Amaranthus prevenzana*, *Cyperus spp.*, *Galinsoga parviflora*, *Melilotus chamaecrista*, *Sonchus oleraceus*.

DOSE D'IMPIEGO

• Lettughe e simili :

- In pre emergenza delle infestanti

⇒ pre-semina / pre-trapianto

⇒ interrando il prodotto alla dose di 2 - 2,5 kg/ha

⇒ post-semina / post-trapianto,

effettuando il trattamento nel 15-20 giorni successivi, inter-

venire alla dose di 2 - 2,5 kg/ha

- In post emergenza delle infestanti

⇒ intervenire durante il periodo autunno-invernale con terreno

umido, alla dose di 2 - 2,5 kg/ha

• Foraggiere leguminose

- Erba medica

⇒ su colture in atto in autunno-inverno e tolte contro la cusc-

ta (entro febbraio) oppure dopo il primo sfalcio

(entro 3-4 giorni) 1,5 - 1,6

kg/ha

- Trifoglio violetto e fadno, Suda, Lupinelle

⇒ su coltura in atto in autunno-inverno 1 - 1,5 kg/ha

• Barbabietola da zucchero

- contro la cuscuta :

- trattamenti a dosi basse : con bietole allo stadio di 2-4 foglie,

utilizzare dosaggi di 0,7 - 1 kg/ha con 1 o 2 trattamenti

- trattamenti a dosi più elevate : non trattare fino a che le

piante meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6

foglie vere, curando di non intervenire oltre lo stadio di 10-12

foglie vere (per lo più sviluppate) 2 - 2,5 kg/ha

la dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già

perossidizzato la coltura; va tuttavia considerato che i tratta-

menti meno tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

• Vite, Melo, Pero

- interventi a fine autunno inizio inverno 2 kg/ha

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

- Non rientrare nella zona trattata prima di 24 ore
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indotte in etichetta. Si barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni).

Ripetere i sottoelencati intervalli tra l'applicazione del ZAM e la successiva semina di colture sensibili

a) Colture moderatamente tolleranti : mais, fragole, sorgo, patata, crucifere - due mesi

b) Colture mediamente sensibili : melanzana, lino, aglio, menta, cipolla, peperone, spinacio, barbabietola da zucchero, pomodoro - quattro mesi

c) Colture molto sensibili : cereali da granella in genere (orzo, avena, frumento, segale) e graminacee foraggere - sei mesi

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

NOCIUITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci. Non far pascolare il bestiame prima che siano trascorsi 20 giorni dal trattamento. Attenzione: nel impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI BFUSO**SEGNALARE SECONDO LE NORME VIGENTI**

IMPRESA
AGTROL INTERNATIONAL S.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RAIDER DRY PRILL

Fungicida a base di idrossido di Rame in granuli idrodispersibili.

RAIDER DRY PRILL Registrazione Ministero della Salute n. del

Composizione	Contenuto:
- RAME metallo puro g. 37,5	100-150-200-250-500 g
(sotto forma di idrossido)	1-2-5-10-20-25 Kg.
- Coformulanti q.b. a g.100	Partita n.

Titolare dell'autorizzazione
AGTROL INTERNATIONAL
 85, Quai de Brazza, BP 55
 33016 Bordeaux Cedex (France)

Stabilimenti di produzione:
PHIBRO TECH. Inc.
 South Caroline (USA)
AGTROL INTERNATIONAL
 85 Quai de Brazza, BP 55
 33016 Bordeaux Cedex (Francia)

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

FRASI DI RISCHIO. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corpi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
 Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC. emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolosi con soluzione latte-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo: per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

IL RAIDER DRY PRILL è un fungicida a base di rame idrossido in granuli idrodispersibili dotato di elevata adesività e persistenza.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite: g. 140-200/hl contro Peronospora e Marciume nero degli acini. Intervenire dalla formazione degli acini.

Melo e Pero: g. 250-350/hl contro Cancro del legno (Nectria galligena, Phomopsis mali, Sphaeropsis malorum, Pseudomonas syringae) intervenire alla caduta totale delle foglie e al rigonfiamento delle gemme. g. 250-300/hl contro il colpo di fuoco: intervenire con due trattamenti nelle fasi del rigonfiamento delle gemme e le punte verdi. Sul pero applicare g. 40/hl o Kg. 0,5-0,7/ha, durante la fioritura, ogni 5 giorni, g. 300/hl contro Phytophthora cactorum applicando 15 litri di soluzione alla base di ogni pianta malata. Intervenire ogni anno in primavera ed alla fine della raccolta. Contro la Ticchiolatura g. 200-225/hl prima della fioritura; dopo la fioritura e successivamente g. 150-175/hl.

Albicocco e Susino: g. 250-300/hl contro Corineo, Monilia e Seccume dei rami. Intervenire durante il riposo vegetativo. Non trattare mai dopo la fioritura.

Ciliegio: g. 300-350/hl + ml. 150/hl di olio minerale bianco contro Corineo, Monilia, Scopazzi. Intervenire alla caduta totale delle foglie ed all'ingrossamento delle gemme. In frutteti fortemente ammalati ripetere l'applicazione anche in agosto; g. 150-175/hl contro la Monilia dei fiori, intervenendo subito prima ed immediatamente dopo la fioritura.

Pesce e Nettarine: g. 250-350/hl contro Botta e Corineo con interventi subito dopo la caduta delle foglie ed a fine inverno; g. 150/hl contro la Monilia nella fase dei bottoni rosa, g. 250-350/hl contro le Batteriosi con trattamenti durante il riposo vegetativo. Per applicazioni in post-fioritura usare g. 30-40/hl per due trattamenti.

Mandorlo: g. 200-250/hl contro Corineo, Bolla e Monilia. Intervenire dopo la caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura. Per interventi post-fioritura mantenere inalterata la dose, g. 200-250/hl contro Batteriosi (Pseudomonas) intervenendo prima della fase dei bottoni rosa.

Aurumi: g. 175-200/hl contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia.

Olivio: g. 200-250/hl contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra. Intervenire alla fine di settembre-inizio ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura.

Nocciuolo: g. 200-250/hl contro Batteriosi (Xanthomonas campestris corylina) con due trattamenti in ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro.

Noce: g. 200/hl contro l'Antracnosi. Intervenire in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiungere ml 150/hl di olio minerale bianco.

Nespolo: g. 140-180/hl contro la Ticchiolatura.

Cipresso: g. 225-300/hl contro il Cancro (Coryneum carinale). Intervenire in pieno inverno.

Patata: g. 200-250/hl contro Peronospora e Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto un'altezza di circa 15 cm, proseguendoli in funzione dell'andamento climatico.

Pomodoro: g. 200-250/hl contro Peronospora, Alternaria e Septoria. Intervenire ogni 10 giorni circa ed in funzione dell'andamento climatico; g. 200-250/hl contro le Batteriosi (Cancro o Avvizzimento, Maculatura e Picchiatura) intervenire ad intervalli regolari (10-15 giorni). Si consigliano combinazioni con Mancozeb solo fino alla prima fioritura.

Barbabietola da zucchero: Kg. 1,75-2,25/ettaro contro la Cercospora. Iniziare i trattamenti alla fine di giugno-inizio di luglio continuandoli ogni 20-25 giorni fino a 20 giorni dalla raccolta.

Fragola: Kg. 1,25-1,5/ettaro contro Volutura. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità.

Fagiolo e Pisello: g. 140-175/hl contro Peronospora, Antracnosi e Ruggine. Intervenire quando si creano le condizioni per lo sviluppo delle malattie e proseguire secondo il caso. Questi interventi controllano pure le Batteriosi.

Cavoli, Cavolfiori, Cavoli di Bruxelles, Broccoli: g. 140-180/hl contro Peronospora e Alternaria. g. 140/hl contro le Batteriosi (Xanthomonas). Iniziare le applicazioni dopo il trapianto e dopo l'emergenza nelle coltivazioni seminate ad intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Alle dosi più alte potrebbero verificarsi, in alcune varietà, dei leggeri arrossamenti delle foglie vecchie dei broccoli e delle macchie sulle foglie esterne dei cavoli.

Carota: g. 140-180/hl contro l'Alternaria. Iniziare le applicazioni al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Sedano, Finocchio: g. 150/hl contro Septoria, Cercospora e Peronospora. Trattare secondo l'andamento stagionale.

Melanzana: g. 150/hl contro Alternaria, Peronospora. Intervenire ogni 15 giorni circa; in tal modo si controlla pure la Phomopsis vexans.

Cetriolo: g. 150/hl contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi e Batteriosi (Pseudomonas). Intervenire a cadenze fisse in funzione delle condizioni climatiche.

Melone, Anguria: g. 150/hl contro Peronospora, Antracnosi; si consigliano interventi cadenzati in funzione delle condizioni climatiche.

Cipolla, Aglio: g. 140-180/hl contro Peronospora ed Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa cm. 15.

Insalate, Cardo, Carciofo: g. 140/hl contro Peronospora ed Alternaria con interventi preventivi in funzione delle condizioni climatiche.

Riso: Kg. 2,5-3,75/ettaro contro le Alghie verdi. Intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente per coprire l'intera superficie.

Rosa: g. 150/hl contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine.

Ciliegino: g. 150/hl contro Antracnosi e Maculatura fogliare.

Filodendro: g. 150/hl contro le Batteriosi (Erwinia spp.) con applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura ad eccezione dei casi menzionati nel capitolo "Dosi e modalità d'impiego". Su Pesco, Nettarine, Susino e varietà di Melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butira Clairgeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butira Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "Dosi e modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO: smaltire secondo le norme vigenti.



Etichetta formato ridotto

RAIDER DRY PRILL

Fungicida a base di idrossido di Rame in granuli idrodispersibili.

RAIDER DRY PRILL Registrazione Ministero della Salute n. _____ del _____		Contenuto: 100 g	Partita n. _____
Composizione - RAME metallo puro g. 37,5 (sotto forma di idrossido) - Coformulanti q.b. a g.100		® Marchio Registrato Agtrol International - Houston, Texas (USA) IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO	
 IRRITANTE	Titolare dell'autorizzazione AGTROL INTERNATIONAL 85, Quai de Brazza, BP 55 33016 Bordeaux Cedex (France)		
	Stabilimenti di produzione: PHIBRO TECH, Inc. South Caroline (USA)		
	AGTROL INTERNATIONAL 85 Quai de Brazza, BP 55 33016 Bordeaux Cedex (Francia)		
FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).			

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del S.C., emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gasfrolusi con soluzione latte-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Foglio illustrativo

RAIDER DRY PRILL**Fungicida a base di idrossido di Rame in granuli idrodispersibili.****CARATTERISTICHE**

Il RAIDER DRY PRILL è un fungicida a base di rame idrossido in granuli idrodispersibili dotato di elevata adesività e persistenza.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**Vite:** g. 140-200/hl contro Peronospora e Marciume nero degli acini. Intervenire dalla formazione degli acini.**Melo e Pero:** g. 250-350/hl contro Cancro del legno (*Nectria galligena*, *Phomopsis mali*, *Sphaeropsis malorum*, *Pseudomonas syringae*) intervenire alla caduta totale delle foglie e al rigonfiamento delle gemme; g. 250-300/hl contro il colpo di fuoco: intervenire con due trattamenti nelle fasi del rigonfiamento delle gemme e le punte verdi. Sul pero applicare g. 40/hl o Kg. 0,5-0,7/Ha, durante la fioritura, ogni 5 giorni; g. 300/hl contro *Phytophthora cactorum* applicando 15 litri di soluzione alla base di ogni pianta malata. Intervenire ogni anno in primavera ed alla fine della raccolta. Contro la Ticchiolatura: g. 200-225/hl prima della fioritura; dopo la fioritura e successivamente g. 150-175/hl.**Albicocco e Susino:** g. 250-300/hl contro Corineo, Monilia e Seccume dei rami. Intervenire durante il riposo vegetativo. Non trattare mai dopo la fioritura.**Ciliegio:** g. 300-350/hl + ml. 150/hl di olio minerale bianco contro Corineo, Monilia, Scopazzi. Intervenire alla caduta totale delle foglie ed all'ingrossamento delle gemme. In frutteti fortemente ammalati ripetere l'applicazione anche in agosto; g. 150-175/hl contro la Monilia dei fiori, intervenendo subito prima ed immediatamente dopo la fioritura.**Pesco e Nettare:** g. 250-350/hl contro Bolla e Corineo con interventi subito dopo la caduta delle foglie ed a fine inverno; g. 150/hl contro la Monilia nella fase dei bottoni rosa; g. 250-350/hl contro le Batteriosi con trattamenti durante il riposo vegetativo. Per applicazioni in post-fioritura usare g. 30-40/hl per due trattamenti.**Mandorlo:** g. 200-250/hl contro Corineo, Bolla e Monilia. Intervenire dopo la caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura. Per interventi post-fiorali mantenere inalterata la dose; g. 200-250/hl contro Batteriosi (*Pseudomonas*) intervenendo prima della fase dei bottoni rosa.**Agurumi:** g. 175-200/hl contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia.**Olivo:** g. 200-250/hl contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra. Intervenire alla fine di settembre-inizio ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura.**Nocciuolo:** g. 200-250/hl contro Batteriosi (*Xanthomonas campestris corylina*) con due trattamenti in ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro.**Noce:** g. 200/hl contro l'Antracnosi. Intervenire in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiungere ml 150/hl di olio minerale bianco.**Nespolo:** g. 140-180/hl contro la Ticchiolatura.**Cipresso:** g. 225-300/hl contro il Cancro (*Coryneum cardinale*). Intervenire in pieno inverno.**Patata:** g. 200-250/hl contro Peronospora e Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto un'altezza di circa 15 cm, proseguendoli in funzione dell'andamento climatico.**Pomodoro:** g. 200-250/hl contro Peronospora, Alternaria e Septoria. Intervenire ogni 10 giorni circa ed in funzione dell'andamento climatico; g. 200-250/hl contro le Batteriosi (Cancro o Avvizzimento, Maculatura e Picchiatura) intervenire ad intervalli regolari (10-15 giorni). Si consigliano combinazioni con Mancozeb solo fino alla prima fioritura.**Barbabietola da zucchero:** Kg. 1,75-2,25/ettaro contro la Cercospora. Iniziare i trattamenti alla fine di giugno-inizio di luglio continuandoli ogni 20-25 giorni fino a 20 giorni dalla raccolta.**Fragola:** Kg. 1,25-1,5/ettaro contro Vaioletta. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità.**Fagiolo e Pisello:** g. 140-175/hl contro Peronospora, Antracnosi e Ruggine. Intervenire quando si creano le condizioni per lo sviluppo delle malattie e proseguire secondo il caso. Questi interventi controllano pure le Batteriosi.**Cavoli, Cavolfiori, Cavoli di Bruxelles, Broccoli:** g. 140-180/hl contro Peronospora e Alternaria. g. 140/hl contro le Batteriosi (*Xanthomonas*). Iniziare le applicazioni dopo il trapianto e dopo l'emergenza nelle coltivazioni seminate ad intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Alle dosi più alte potrebbero verificarsi, in alcune varietà, dei leggeri arrossamenti delle foglie vecchie dei broccoli e delle macchie sulle foglie esterne dei cavoli.**Carota:** g. 140-180/hl contro l'Alternaria. Iniziare le applicazioni al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.**Sedano, Finocchio:** g. 150/hl contro Septoria, Cercospora e Peronospora. Trattare secondo l'andamento stagionale.**Melanzana:** g. 150/hl contro Alternaria, Peronospora. Intervenire ogni 15 giorni circa; in tal modo si controlla pure la *Phomopsis vexans*.**Cetriolo:** g. 150/hl contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi e Batteriosi (*Pseudomonas*). Intervenire a cadenze fisse in funzione delle condizioni climatiche.**Melone, Anguria:** g. 150/hl contro Peronospora, Antracnosi; si consigliano interventi cadenzati in funzione delle condizioni climatiche.**Cipolla, Aglio:** g. 140-180/hl contro Peronospora ed Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa cm. 15.**Insalate, Cardo, Carciofo:** g. 140/hl contro Peronospora ed Alternaria con interventi preventivi in funzione delle condizioni climatiche.**Riso:** Kg. 2,5-3,75/ettaro contro le Alghe verdi. Intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente per coprire l'intera superficie.**Rosa:** g. 150/hl contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine.**Ciclamino:** g. 150/hl contro Antracnosi e Maculatura fogliare.**Filodendro:** g. 150/hl contro le Batteriosi (*Erwinia spp.*) con applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI****COMPATIBILITÀ**

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**FITOTOSSICITÀ**

Non si deve trattare durante la fioritura ad eccezione dei casi menzionati nel capitolo "Dosi e modalità d'impiego". Su Pesco, Nettare, Susino e varietà di Melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacressana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "Dosi e modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.**Attenzione:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- DA NON VENDERSI SFUSO

- ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO: smaltire secondo le norme vigenti.

AGTROL INTERNATIONAL85, Quai de Braza, BP 55
33016 Bordeaux Cedex (France)

IMPRESA

AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA S.P.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE


BETANAL® TANDEM

Erbicida di post-emergenza per la
barbabietola da zucchero
Formulazione liquido emulsionabile

BETANAL® TANDEM

Composizione:

Fenmedifam puro 9,16% (88,8 g/l)
Etofumesate puro 8,07% (78,2 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene Isoforone



PARTITA N°

Inflammabile - Irritante per gli occhi, la vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Titolare dell'Autorizzazione:



Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Türr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 7074 del 26/5/1987 del Ministero della Sanità

CONTENUTO: 1 - 3 - 5 L

Officina di produzione

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA

Conservare il recipiente ben chiuso.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Indossare occhiali, mascherina e guanti durante la diluizione del prodotto in acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Il prodotto contiene isoforone che ha azione narcotica, irritante per le mucose, con la possibilità di danno cumulativo epatorenale.
Controindicazioni: oppiacei, sedativi e comunque farmaci depressivi del Sistema Nervoso Centrale.

Consultare un Centro Antiveletici

CARATTERISTICHE

BETANAL® TANDEM è un formulato efficace contro la maggior parte delle infestanti a foglia larga presenti nei nostri bietolai. Il prodotto ha mostrato notevole validità tecnica anche nel controllo di erbe difficili quali: Mercurialis, Amaranthus, Solanum, Stellaria e Polygonaceae (peris., avic., conv.). E' inoltre attivo nei confronti delle graminacee, della fase di emergenza sino allo stadio di 1-3 foglie.

Il prodotto agisce sulle infestanti prevalentemente per contatto; esplica inoltre, grazie alla componente Etofumesate, un'azione per via radicale con un prolungato effetto residuale che impedisce la nascita di nuove erbe.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere i migliori risultati è necessario intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo e comunque piccole (cot. 2-4 foglie).

Interventi con applicazione unica

Dosi: 4-5 l/ha di formulato in 300-350 l di acqua, intervenendo su bietole con almeno 2-4 foglie vere. Su bietola autunnale la dose può essere aumentata a 5-6 l/ha.

Interventi frazionati

Dosi: 2-3 l/ha di prodotto seguiti da una seconda applicazione dopo 7-10 giorni, usando una quantità di acqua di 150-250 litri. Poiché soprattutto nel primo intervento, il prodotto viene utilizzato a dose ridotta, questo programma può essere iniziato a partire dal massimo sviluppo dei collodoni della bietola.

Gli interventi frazionati risultano particolarmente validi qualora si debba intervenire su bietola non diserbati in pre-semina o pre-emergenza e nei seguenti altri casi:

- quando si deve intervenire su infestazioni precoci;
- in presenza di infestanti difficili da controllare (Mercurialis, Polygonum p. e a., Amaranthus, Solanum, Stellaria);
- quando si prevedono nascite scateni delle infestanti;
- in tutti i casi di forte densità dell'infestazione.

Interventi speciali

In presenza di graminacee piccole o in accrescimento, associare alla normale dose di BETANAL® TANDEM il prodotto graminicida Fervinal alla dose di 1-1,5 l/ha.

Per il controllo di Cirsium, Sonchus, Matricaria ed altre composte: associare 1 l/ha di Cirtoxin alla dose normale di questo prodotto. Per migliorare il controllo dell'Abutilon t., aggiungere 300-400 g/ha di Venzar.

Avvertenze alle quali è opportuno attenersi per ottenere i migliori risultati:

- Evitare di intervenire con temperature superiori ai 23°-25°C; con temperature elevate trattare nel tardo pomeriggio.
- Versare la dose di prodotto richiesta con la botte riempita a metà; portare successivamente a volume tenendo la soluzione in costante agitazione.
- Distribuire il prodotto in assenza di vento, avendo cura di bagnare le infestanti in modo uniforme.
- Usare volumi d'acqua non superiori ai 350 l/ha nei trattamenti normali; 150-250 l/ha negli interventi frazionati.
- Evitare di trattare su vegetazione bagnata o nell'imminenza di una pioggia.
- Non usare il prodotto su barbabietole da zucchero sofferenti o danneggiate da insetti o da altre cause.
- Assicurarsi che le attrezzature di distribuzione siano ben pulite e non contengano residui di altri erbicidi, specie ormonici.

Per precauzione lavare le pompe più volte con acqua e soda.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate nell'etichetta. L'aggiunta di olio bianco può determinare ustioni o fenomeni di fitotossicità sulla barbabietola da zucchero e pertanto viene decisamente sconsigliata.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con Fervinal, Cirtoxin, Venzar impiegati in bieticoltura. E' sconsigliabile l'associazione con olio minerale bianco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di infossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Officine di produzione:

- Hoechst Schering AgroEvolution GmbH - Wolfenbüttel (Germania)
- AgroEvolution Tech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- AgroEvolution UK Limited, Houghton, Cambridge (Regno Unito)
- FlotFormula s.r.l. - Aprilia (L.T.)

24-402


BETANAL® TANDEM VIP

Erbicida di post-emergenza per la
barbabietola da zucchero
Formulazione liquido emulsionabile

BETANAL® TANDEM VIP

Composizione:

Fenmedifam puro 8,2% (80 g/l)
Etoflumesate puro 10,3% (100 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene Isoforone e xilene.



PARTITA N°

Inflammabile - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare guanti adatti in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Titolare dell'Autorizzazione:



Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Türr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 7768 del 22/5/1989 del Ministero della Sanità

CONTENUTO: 1 - 3 - 5 L

Officina di produzione

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA

Conservare il recipiente ben chiuso.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Indossare occhiali, mascherina e guanti durante la diluizione del prodotto in acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Il prodotto contiene Isoforone che ha azione narcotica, irritante per le mucose, con la possibilità di danno cumulativo epatorenale.

Controindicazioni: oppiaci, sedativi e comunque farmaci depressivi del Sistema Nervoso Centrale.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

BETANAL® TANDEM VIP è un formulato efficace contro la maggior parte delle infestanti a foglia larga presenti nei nostri bietolai. Il prodotto ha mostrato notevole validità tecnica anche nel controllo di erbe difficili quali: Mercurialis, Amaranthus, Solanum, Stellaria e Polygonaceae (pers., avic., conv.). È inoltre attivo nei confronti delle graminacee, dalla fase di emergenza sino allo stadio di 1-3 foglie.

Il prodotto agisce sulle infestanti prevalentemente per contatto; esplica inoltre, grazie alla componente Etoflumesate, un'azione per via radicale con un prolungato effetto residuale che impedisce la nascita di nuove erbe.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere i migliori risultati è necessario intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo e comunque piccole (cot. 2-4 foglie).

Interventi con applicazione unica

Dosi: 4-6 l/ha di formulato in 300-350 litri di acqua, intervenendo su bietole con almeno 4 foglie vere. Su bietola autunnale la dose può essere aumentata a 6-7 l/ha.

Interventi frazionati

Dosi: 2-3 l/ha di prodotto seguiti da una seconda applicazione dopo 7-10 giorni, alla dose di 3-4 l/ha, usando una quantità di acqua di 150-250 litri. Poiché nel primo intervento il prodotto viene utilizzato a dose ridotta, questo programma può essere iniziato a partire dal massimo sviluppo dei colliedoni della bietola. Gli interventi frazionati risultano particolarmente validi qualora si debba intervenire su bietolai non diserbati in pre-semina o in pre-emergenza e nei seguenti altri casi:

- quando si deve intervenire su infestazioni precoci;
- in presenza di infestanti definite difficili da controllare;
- quando si prevedono nascite scalari delle infestanti;
- in tutti i casi di forte densità delle infestanti presenti.

Interventi speciali

In presenza di graminacee piccole o in accrescimento, associare alla normale dose di BETANAL® TANDEM VIP il prodotto graminicida FERVINAL alla dose di 1-1,5 l/ha.

Per il controllo di Cirsium, Sonchus, Matricaria ed altre compositae associare 1 l/ha di CIRTOXIN alla dose normale di questo prodotto. Per migliorare il controllo dell'Abutilon t., aggiungere 300-400 g/ha di VENZA.

Avvertenze alle quali è opportuno attenersi per ottenere i migliori risultati:

Evitare di intervenire con temperature superiori ai 23-25°C; con temperature elevate trattare nel tardo pomeriggio.

Versare la dose di prodotto richiesta con la bottiglia riempita a metà; portare successivamente a volume tenendo la soluzione in costante agitazione.

Distribuire il prodotto in assenza di vento, avendo cura di bagnare le infestanti in modo uniforme.

Usare volumi d'acqua non superiori ai 350 l/ha nei trattamenti normali; 150-250 l/ha negli interventi frazionati.

Evitare di trattare su vegetazione bagnata o nell'imminenza di una pioggia.

Non usare il prodotto su bietole sofferenti o danneggiate da insetti o da altre cause.

Assicurarsi che le attrezzature di distribuzione siano ben pulite e non contengano residui di altri erbicidi, specie ormonici.

Per precauzione lavare le pompe più volte con acqua e soda.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. L'aggiunta di olio bianco può determinare ustioni o fenomeni di fitotossicità sulla bietola e pertanto viene decisamente sconsigliata.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con FERVINAL, CIRTOXIN impiegati in bieticoltura. È sconsigliabile l'associazione con olio minerale bianco.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Officine di produzione:

- Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Wollenbuttel (Germania)
- AgrEvo Prode Tech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- AgrEvo UK Limited, Hauxton, Cambridge (Regno Unito)
- FitoFormula s.r.l. - Aprilia (LT).

BETANAL® TRIO

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA PER LA
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO


FORMULAZIONE: SOSPENSIONE CONCENTRATA SU BASE OLEOSA

BETANAL® TRIO

Composizione:

Fenmedifam puro 5% (51 g/l)
Etoflumesate puro 5% (51 g/l)
Metamifon puro 15% (153 g/l)
Coformulanti

q.b. a 100 g



PARTITA N°

irritante per gli occhi - può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori dalla portata dei bambini - conservare il recipiente ben chiuso - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Titolare dell'Autorizzazione:

Aventis

Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Türr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 8634 del 14/11/1995 del Ministero della Sanità

CONTENUTO: 1 - 3 - 5 L

Officina di produzione

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

© Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

Grazie alla complementarietà dei suoi costituenti, il prodotto si è dimostrato attivo contro un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo, ad esempio: Polygonacee (Polygonum spp.), Amarantacee (Amaranthus spp.), Erba morella (Solanum n.), Farinello (Chenopodium spp.), Camomilla comune (Matricaria c.), Mercurella (Mercurialis a.), Erba calenzuola (Euphorbia h.), Attaccamano (Galium a.), Erba sirega (Stachys a.), Asparaggine (Pteris e.), Centocchio comune (Stellaria m.), Veronica (Veronica sp.), Viola dei campi (Viola sp.), Borsapastore (Capsella b.p.), Crucifere (Sinapis a., Raphanus r.), Linaria, Fumaria ed altre dicotiledoni.

Le infestanti vengono devitalizzate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare, se le condizioni di umidità del terreno sono favorevoli, il prodotto caduto sul terreno agisce per assorbimento radicale e come antigerminello, esplicando quindi un'azione residuale sulle infestanti a nascita più tardiva.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie vere) e, in modo particolare, ricorrendo agli interventi frazionati, con singole dosi di prodotto molto ridotte.

INTERVENTI CON UNICA APPLICAZIONE

Dose: 6 l/ha in 300-350 litri d'acqua quando la bietola ha già differenziato le 2-4 foglie vere. Il prodotto può essere utilizzato anche a completamento di un intervento di pre-semina o di pre-emergenza.

INTERVENTI FRAZIONATI

Qualora fosse necessario intervenire prima, o in caso di nascita scalare delle infestanti, si consiglia di eseguire il diserbo facendo ricorso alla tecnica degli interventi frazionati, secondo una delle seguenti tecniche.

Tecnica 1. Dosi: 2,5 l/ha di prodotto formulato in 150-200 litri d'acqua, allo stadio di massimo sviluppo dei cotiledoni della bietola, ripetendo l'applicazione dopo circa 10 giorni, con 3-3,5 l/ha.

Tecnica 2. Nel caso esistano i necessari presupposti (attrezzature idonee, adeguata organizzazione aziendale, ecc.) e sia possibile intervenire con la massima tempestività seguendo lo sviluppo dell'infestazione, si consiglia di intervenire con BETANAL® TRIO alla dose di 2 l/ha in 100-150 litri di soluzione, alla primissima comparsa delle infestanti e indipendentemente dallo sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto con 2 l/ha di formulato altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.

In generale, l'aggiunta di olio bianco, alla dose di 0,5 l/ha, consente di migliorare i risultati del diserbo e si rende necessaria in modo particolare nel controllo di infestanti sviluppate o in presenza di quelle di più difficile soppressione.

Avvertenze generali per la buona riuscita del trattamento:

- Evitare di intervenire nelle ore più calde del giorno.
- Effettuare il trattamento su bietola in buone condizioni vegetative (senza danni da insetti o altre cause) e in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando i volumi d'acqua indicati nelle diverse tecniche.
- Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, specialmente ormonici, per precauzione lavare le pompe più volte, prima dell'uso, con acqua e soda o con carbone attivato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

BETANAL® TRIO è compatibile con olio bianco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

TEMPI DI RIENTRO

Non entrare nell'appezzamento finché la coltura è bagnata dal liquido di irrorazione.

AVVERTENZE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Officine di produzione:

- Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Wolfenbüttel (Germania)
- AgrEvo Prode Tech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marseglia (Francia)
- AgrEvo UK Limited, Hauxton, Cambridge (Regno Unito)
- Bayer AG - Leverkusen (Germania)
- Fitoformula s.r.l. - Aprilia (I.T.).

BETANAL® TRIO WG

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA PER LA
BARBABUETOLA DA ZUCCHERO

FORMULAZIONE: MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

BETANAL® TRIO WG

Composizione:

Etolmesate puro 6,5%
Fenmedifam puro 6,6%
Metamitron puro 28,0%
Coformulanti q.b. a 100 g



PARTITA N°

Irritante per gli occhi - può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori dalla portata dei bambini - conservare il recipiente ben chiuso - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Titolare dell'Autorizzazione:

Aventis

Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Turr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 8633 del 14/1/1995 del Ministero della Sanità

CONTENUTO: 1 - 3 - 5 Kg

Officina di produzione

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

© Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA

Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Grazie alla complementarietà dei suoi costituenti, il prodotto si è dimostrato attivo contro un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo, ad esempio: Polygonacee (Polygonum spp.), Amaranthacee (Amaranthus spp.), Erba morella (Solanum n.), Farinello (Chenopodium spp.), Camomilla comune (Matricaria c.), Mercurella (Mercurialis a.), Erba calenzuola (Euphorbia h.), Attaccianano (Galium a.), Erba strega (Stachys a.), Asparagone (Pteris a.), Centocchio comune (Stellaria m.), Veronica (Veronica sp.), Viola dei campi (Viola sp.), Borraggiore (Capsella b.p.), Crucifere (Sinapis a., Raphanus l.), Linaria, Fumaria ed altre dicotiledoni.

Le infestanti vengono devitalizzate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare. Se le condizioni di umidità del terreno sono favorevoli, il prodotto-caduto sul terreno agisce per assorbimento radicale o come antigerminello, esplicando quindi un'azione residuale sulle infestanti a nascita più tardiva.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie vere) e, in molto particolare, ricorrendo agli interventi frazionati, con singole dosi di prodotto molto ridotte.

INTERVENTI CON UNICA APPLICAZIONE

Dose: 4 kg/ha in 300-350 litri d'acqua, quando la bietola ha già differenziato le 2-4 foglie vere. Il prodotto può essere utilizzato anche a completamento di un intervento di pre-semina o di pre-emergenza.

INTERVENTI FRAZIONATI

Qualora fosse necessario intervenire prima, o in caso di nascita scalare delle infestanti, si consiglia di eseguire il diserbo facendo ricorso alla tecnica degli interventi frazionati, secondo una delle seguenti tecniche.

Tecnica 1. Dosi: 1,5-2 kg/ha di prodotto formulato in 100-150 litri d'acqua, allo stadio di massimo sviluppo dei cotiledoni della bietola, ripetendo l'applicazione dopo circa 10 giorni, con 2-2,5 kg/ha in 150-200 litri d'acqua.

Tecnica 2. Nel caso esistano i necessari presupposti (attrezzature idonee, adeguata organizzazione aziendale, ecc.) e sia possibile intervenire con la massima tempestività seguendo lo sviluppo dell'infestazione, si consiglia di intervenire con BETANAL® TRIO WG alla dose di 1,3 kg/ha in 100-150 litri di soluzione, alla primissima comparsa delle infestanti e indipendentemente dallo sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto con 1,3 kg/ha di formulato altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.

In generale, l'aggiunta di olio bianco, alla dose di 0,5 l/ha, consente di migliorare i risultati del diserbo e si rende necessaria in modo particolare nel controllo di infestanti sviluppate o in presenza di quelle di più difficile soppressione.

Avvertenze generali per la buona riuscita del trattamento:

- Evitare di intervenire nelle ore più calde del giorno.
- Effettuare il trattamento su bietola in buone condizioni vegetative (senza danni da insetti o altre cause) e in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando i volumi d'acqua indicati nelle diverse epoche.
- Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, specialmente armonici, per precauzione lavare le pompe più volte, prima dell'uso, con acqua e soda o con carbone attivato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

BETANAL® TRIO WG è compatibile con olio bianco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

TEMPI DI RIENTRO

Non entrare nell'apprezzamento finché la coltura è bagnata dal liquido di irrorazione.

AVVERTENZE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Officine di produzione:

- AgrEvo Prode Tech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marignola (Francia)
- AgrEvo UK Limited, Hauxton, Cambridge (Regno Unito)
- Bayer AG - Leverkusen (Germania)

24.402

BUMETRAN®

INSETTICIDA - ACARICIDA IN FORMULAZIONE EC

BUMETRAN®

Composizione:

Amilraz puro 21,6% (200 g/l)

Contiene Xilene.



PARTITA N°

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile - nocivo per inalazione ed ingestione - irritante per la pelle
- può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Titolare dell'Autorizzazione

Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Turr, 5 - MILANO

Officina di produzione



Registrazione n° 2505 del 4/4/1977 del Ministero della Sanità

CONTENUTO: 0,5 - 1 - 5 - 10 L

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

© Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI

- conservare il recipiente ben chiuso
- non operare contro vento
- in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in appositi recipienti, possibilmente all'aperto, o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, mangimi.

Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua o su altre colture.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, ipereccitabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile iperglicemia.

Terapia: sintomatica, monitoraggio cardiorespiratorio per il rischio della bradicardia.

Consultare un centro antiveneni.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Bumetran è un insetticida-acaricida dotato di persistenza, che agisce per contatto e asfissia.

Bumetran è particolarmente efficace contro la psilla del pero (trattamento a uova gialle/prima comparsa neanidi). Bumetran controlla inoltre tutti gli stadi del Ragno rosso (Acarì Tetranychidi); i migliori risultati si ottengono intervenendo nelle fasi iniziali dell'infestazione, ossia in presenza di poche forme mobili per foglia. (Se necessario, e qualora la cultura consenta più di un intervento per stagione, ripetere l'applicazione dopo 3 settimane o alla prima reinfezione).

Bumetran può essere impiegato sia con attrezzature operanti a volume normale, sia con atomizzatori eroganti volumi ridotti di soluzione per unità di superficie, purché si rispetti sempre la quantità di formulato per ettaro.

COLTURA	ACARIED INSETTI CONTROLLATI	DOSI DI FORMULATO INDICATE per unità di superficie (litri/ha)	N. MASSIMO DI INTERVENTI PER STAGIONE
Pero	Psille, Acari (P. ulmi)	3-4	2
Melo	Ragno rosso (P. ulmi) e Neanidi di Cocciniglie (Quadraspidiotus p.)	2,5-3,5	2
Fioreali ed ornamentali	Acari (T. urticae)	2-2,5	-

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti fitosanitari in commercio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU MELO E PERO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Officine di produzione:

- AgrEvo UK Limited, Hauxton, Cambridge (Regno Unito)
- AgrEvo UK Limited, Beeston (Regno Unito)
- AgrEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- FitoFormula S.r.l. - Aprilia (L.T.)

29.0302

BUMETRAN® HF

Acaricida-insetticida

in formulazione concentrato emulsionabile (EC)

BUMETRAN® HF**COMPOSIZIONE:**Amfraz puro 19,8% (= 200g/l)
Coformulanti q. b. a 100

Partita n. 4

Frase di rischio:Nocivo per ingestione e per contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.**Consigli di prudenza:**Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**Titolare dell'autorizzazione:**

Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Türr, 5 - MILANO

Officina di produzione:

Registrazione n. 8297 del 04-06-1993 del Ministero della Sanità

Contenuto: 500 ml/ 1 - 5 - 10 l**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

© Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto ben chiuso nel contenitore originale.

Non operare contro vento.

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.

Preparare la miscela in appositi recipienti, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, mangimi.

Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua o su altre colture.

Proteggere il prodotto dal gelo.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO**Sintomi:** Irritante per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del SNC, ipereccitabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile iperglicemia.**Terapia:** sintomatica, monitoraggio cardiorespiratorio per il rischio della bradicardia.**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI****CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO****Bumetran HF** è un acaricida-insetticida dotato di attività specifica contro acari tetranychidi, eriofidi ed omotteri (Psille); assicura inoltre un buon contenimento di altri insetti dannosi tra cui lepidotteri, cocciniglie, afidi. Il prodotto è caratterizzato da una buona azione iniziale, con una persistenza d'azione che di norma non supera le 3-4 settimane. Agisce prevalentemente per contatto, oltre che per azione di vapore e translinare, ma non è sistemico.**DOSI PER ETTARO E MODALITÀ D'IMPIEGO**
(concentraz. normale della soluzione: 250-300 ml/ha)

COLTURA	INSETTI-ACARI COMBATTUTI	DOSI l/ha	N° interventi per stagione
PERO	Alla prima comparsa di psille, acari (P. ulmi, T. urticae), eriofidi.	4	2
MELO	Acari tetranychidi (ragnetti rossi) filorination (ceratostoma, litocolle), afidi (Aphis p., Eriosoma l.), Aculus sp., Epitimerus.	3,5	2
COLTURE FLORICOLE E ORNAMENTALI	T. urticae	2,5	secondo necessità

Il prodotto combatte tutti gli stadi di sviluppo del ragnetto rosso: i migliori risultati si ottengono intervenendo in presenza di poche forme mobili per foglia. Se necessario, ripetere l'applicazione dopo 3 settimane o alla prima reinfestazione. Contro le psille del pero, il prodotto è attivo nei confronti delle larve, neandi e ninfe, purché non abbiano ancora formato lo strato di melata. In generale, è consigliabile aggiungere sempre un bagnante alla dose raccomandata nell'etichetta, per migliorare la distribuzione del prodotto sulle foglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**Condizioni del trattamento**

Riempi la botte sino a metà con acqua pulita (evitare le acque dure) ed iniziare l'agitazione. Aggiungere la dose necessaria di prodotto e portare a volume. Eseguire il trattamento mantenendo la soluzione in costante agitazione. Riprendere l'agitazione dopo ogni interruzione e comunque evitare di lasciare la soluzione nella botte irroratrice per lunghi periodi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscelabile con i più comuni prodotti fitosanitari in commercio a reazione neutra. Da non miscelare con Pottiglia Bordolese. In caso di associazione con formulazioni PB o WDG, aggiungere sempre Bumetran HF per ultimo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**Rischi di nocività:** Il prodotto è tossico per i pesci e per gli insetti utili. Non contaminare i corsi d'acqua con i residui di lavaggio delle attrezzature usate.**INTERVALLO DI SICUREZZA: SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU MELO E PERO.**

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE****Officine di produzione:**AgrEvo UK Limited - Hauxton, Cambridge (Regno Unito);
AgrEvo Prode/ech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia);
FiloFormula S.p.A. - Aprilia (LT).

29.0302

BUMETRAN® TOP


Insetticida - Acaricida
in formulazione concentrato emulsionabile (EC)

Bumetran® Top

Composizione:

Amritraz puro 19,8% p/p (200 g/l)

coformulanti q. b. a 100



Partita N.

FRASI DI RISCHIO

Noctivo a contatto con la pelle e per ingestione - Irritante per la pelle -
Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle - Può causare danni polmonari se ingerito.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da
alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare
durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli
occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un
medico - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed
abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e
guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile,
mostrargli l'etichetta) - Non provocare il vomito: consultare
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'Autorizzazione

Aventis

Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Turr. 5 - 20149 MILANO

Officina di produzione:

Registrazione n° 9499 del 10/02/1998 del Ministero della Sanità

CONTENUTO 1 - 5 - 10 - 20 L

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® marchio registrato

NORME DI SICUREZZA

- Non operare contro vento.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.

- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in
locali areati diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali
depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.

- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di
depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale.
Ipertocciabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile
iperglicemia.

Terapia: sintomatica, monitoraggio cardiorespiratorio per il rischio della
bradicardia.

Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

Bumetran Top è un insetticida-acaricida attivo contro numerosi
parassiti.

Bumetran Top è particolarmente efficace contro la psilla del pero
(neanidi e ninfie). Bumetran Top, impiegato tempestivamente ad inizio
infestazione, ha elevata attività contro gli acari leiraniidici (Panonychus
ulmi, Tetranychus urticae, Eutetranychus carpini) ed eriofidi (Aculus
schlechtendali, Epitrimerus pyri). Il prodotto manifesta anche
un'interessante azione collaterale nei confronti della filocolliele del melo
(Phylloxera vitifoliae).

Contro psilla (Cacopsylla pyri) Bumetran Top si applica preferibilmente
alla prima comparsa delle ninfidi, ma, grazie agli speciali
coformulanti, assicura buoni risultati anche quando è iniziata la
formazione della melata.

Bumetran Top è particolarmente consigliato per la protezione del pero
per l'elevata azione psillicida e la contemporanea attività acaricida che
contribuisce alla prevenzione del "brusone", la cui manifestazione è
favorevole ed aggravata dalla presenza, anche limitata, di acari.

DOSI D'IMPIEGO

Bumetran Top si impiega alla concentrazione di 250-300 ml/ha
effettuando una bagnatura accurata ed omogenea di tutta la
vegetazione.

La tabella riporta le dosi per le diverse colture.

COLTURA	PARASSITA	DOSE l/ha	N° Tratt. per stagione
PERO	Psilla ed acari (Panonychus ulmi, eriofidi) con trattamenti tempestivi all'inizio dell'infestazione	3,0-4	2
MELO	Acari (P. ulmi, Aculus s., Epitrimerus p.), filocolliele (azione collaterale)	2,5-3,5	2
COLTURA FLORICOLE ED ORNAMENTALI	Acari (Tetranychus urticae)	2,5	secondo necessità

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari in commercio a
reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di infossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci e per gli insetti utili.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DEL
RACCOLTO SU MELO E PERO.**

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti
protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo
di carenza.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è
pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da
uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per
assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle
persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**

OFFICINE DI PRODUZIONE:

AgriEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)

AgriEvo UK Limited, Beeston (Regno Unito)

AgriEvo UK Limited, Hauxton, Cambridge (Regno Unito)

FloFormula S.r.l. - Apulia (LT)

AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)

DIADEM®


Fungicida sistemico in formulazione liquida per la difesa dei cereali a paglia, mais e sorgo mediante la concia delle sementi

Sospensione concentrata per trattamento delle sementi (FS)

DIADEM®

Composizione

Triticonazolo 27,8 g (300 g/l)
Cofomulanti q.b. a 100 g



Partita n.

Frasi di Rischio

Possibile rischio di ridotta fertilità

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Usare indumenti protettivi e guanti adatti

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione



Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Turr. 5 - MILANO

Officina di produzione:

Registrazione N. 10124 del 02/09/99 del Ministero della Sanità

CONTENUTO: 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 900 - 1000 L

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato

Norme precauzionali

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

DIADÉM® è un fungicida ad azione sistemica e di contatto ad ampio spettro di azione per l'impiego nella concia delle sementi dei cereali a paglia, mais e sorgo. Il prodotto controlla le malattie trasmesse da seme o presenti nel terreno ed ha azione di contenimento sulle crittogame fogliari e dei culmi.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Cereali

(Frumento tenero e duro, Orzo):

per la protezione dalle malattie trasmesse da seme o presenti nel terreno che colpiscono le piantine nelle prime fasi di sviluppo: Fusarium roseum, Tilletia caries, Septoria nodorum, Ustilago spp., 20 - 30 ml / 100 kg di semente.

Utilizzare la dose più elevata su seme da moltiplicazione e su partite infette

Per il contenimento anche delle malattie fogliari e dei culmi:

Fusariosi dei culmi (mal del piede), Puccinia striiformis, P. recondita, Septoria spp., Erysiphe graminis, 200 ml / 100 kg di semente

Mais

contro Fusarium graminearum, 10-20 ml / 100 kg di seme, utilizzando la dose più elevata su seme da moltiplicazione.

contro Sphaerolotheca reiliana (crazy top) 330 ml / 100 kg di seme, oppure 37 ml per unità da 50.000 semi, su varietà altamente suscettibili alla crittogama; 170 ml / 100 kg di seme, oppure 18 ml per unità da 50.000 semi su varietà mediamente suscettibili alla malattia.

Sorgo

contro Fusarium spp. 40 ml / 100 kg di seme

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il trattamento va effettuato a macchina (concia slurry o tecnologie similari) irrorando direttamente sul seme la dose di prodotto tal quale, oppure diluita in acqua in funzione del tipo di impianto disponibile e del seme da trattare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Non è miscibile con PANOPTINE L.

AVVERTENZE

Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte.

I semi trattati non devono essere destinati all'alimentazione dell'uomo e del bestiame.

Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi

Attenzione, il formulato contiene sostanza attiva nociva per gli organismi acquatici.

Durante la fase di caricamento adoperare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

PER LE TAGLIE DA LITRI 100 - 200 - 900 - 1000

AD ESCLUSIVO USO DELLE INDUSTRIE SEMENTIERE

ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL

PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO

LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI
DA LITRI 100-200-900-1000 DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA
DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO
A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL


PRODOTTO

Officine di produzione
AgriFormula s.r.l. - Paganica (AQ)
CMPA - Baziers (Francia)

06.202

EPYLOG FLASH®

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta
contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Granuli idrodispersibili (WG)



COMPOSIZIONE:

Fosetil Alluminio puro 40 g
Folpet puro 40 g
Coformulanti q.b. a 100 g

Partita N.

Frasi di Rischio:

Irritante per gli occhi
Possibilità di effetti irreversibili

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'Autorizzazione:



Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Turr, 5 - 20149 - MILANO

Ufficio di Produzione

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Contenuto: 500 g; 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 Kg
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

© Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

FOSETIL ALLUMINIO 40%
FOLPET 40%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Fosetil Alluminio:

Folpet:

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinfaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastrici, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

EPYLOG FLASH® è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.

La sistemica si manifesta soprattutto in modo ascendente permettendo al prodotto di difendere anche la vegetazione che si forma dopo il trattamento.

L'attività nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che antispurante. Particolarmente efficace nella protezione dei grappolini appena allegati.

Queste caratteristiche, unite alla buona persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperosporica con interventi distanziati a cadenza fissa.

Il prodotto possiede anche azione sull' Escoriosi ed attività frenante su sviluppo di Botrite e Mal bianco.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite

Contro Peronospora: il primo trattamento con il prodotto va effettuato a partire dalla fase di germogli della vite lunghi 10 cm. I trattamenti successivi vanno distanziati di 10 giorni fino alla fase di allegagione avvenuta.

Dose: 250 g per 100 litri d'acqua, distribuendo non meno di 2,5 kg di formulato per ettaro.

Nelle fasi di maggiore sviluppo della collura e con forte pressione di malattia, aumentare la dose a 350 g/l (non meno di 3,5 kg/ha), con la possibilità di distanziare gli interventi di 12-14 giorni.

Contro Escoriosi:

Intervenire nelle fasi di "gemma moscia - gemma colonosa" e di "foglio formale" a 300 g per ettolo d'acqua (non meno di 3 kg/ha).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto può avere problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame, con concimi fogliari a base azotata, con oli o prodotti oleosi.

Avvertenze:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci, alghe e crustacei.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Ufficio di Produzione:

Rhône-Poulenc Agro France - Villetfranche (Francia)
AgriFormulas s.r.l. - Pagani (AQ) (sola confezione)

01.801

KEMIFAM® TRIO FL

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA PER LA
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

FORMULAZIONE: SUSPO-EMULSIONE

Composizione: Fenmedifam puro 7,21% (75 g/l),
Desmedifam puro 1,44% (15 g/l), Etofumesate puro 11,06%
(115 g/l), coformulanti q.b. a 100.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Partita N°

NATURA DEL RISCHIO:

sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per
contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

-conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo
inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
-conservare la confezione ben chiusa;
-non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
-non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi
d'acqua;
-evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
-dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi
accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso.

Titolare dell'Autorizzazione



Aventis CropScience Italia S.p.A.
Piazzale S. Turi, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° del del Ministero della Salute
® marchio registrato

CARATTERISTICHE

KEMIFAM® TRIO FL è un formulato che, grazie alla
complementarità delle sostanze attive contenute, risulta
particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a
basse dosi nel post-emergenza della barbabietola da zucchero.
Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto
con l'apparato fogliare; la componente Etofumesate inoltre
esplica anche un'azione residuale.

Il prodotto si è dimostrato attivo verso un'ampia gamma di
infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo
come ad es. *Polygonum spp.* (Polygonaceae), *Amaranthus*
spp. (Amaranthaceae), *Solanum n.* (Solanaceae), *Mercularia*
spp. (Ranunculaceae), *Euphorbia h.* (Euphorbiaceae), *Sisymbrium*
officinale (Fabaceae), *Stachys a.* (Lamiaceae), *Picris n.* (Asteraceae),
Galium a. (Asteraceae). Il prodotto è inoltre attivo nei confronti
delle graminacee ai primissimi stadi di sviluppo (1-3 foglie).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto
piccole (colleoni - 2 foglie) e in modo particolare ricorrendo
agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.

Interventi ripetuti a bassi dosaggi (microdosaggi)

Intervenire con KEMIFAM® TRIO FL alla dose di 0,8 litri per
ettaro in 100-150 litri di soluzione alla prima comparsa delle
infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della
bietola.

Il trattamento va ripetuto a 0,8 litri per ettaro di formulato per
altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e
comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.

Intervento frazionato

Eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di
massimo sviluppo delle foglie collettive (prime foglie vere
della bietola).

Intervenire nella prima frazione con KEMIFAM® TRIO FL alla
dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua.
La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con
KEMIFAM® TRIO FL alla dose di 1,5 litri per ettaro in 200 litri
d'acqua.

Intervento unico

Utilizzare KEMIFAM® TRIO FL alla dose di 2,5-3,0 litri per ettaro
in 250-300 litri d'acqua su bietole che abbiano già differenziato
le 4 foglie vere.

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma
attenersi alle seguenti avvertenze generali:

- Evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C;
con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo
pomeriggio.
- Effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di
bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi
d'acqua necessari per le diverse tecniche d'impiego.
- Non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla
rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti,
danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.
- Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano
residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare
sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con
carbone attivo.

NON OPERARE CONTRO VENTO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

KEMIFAM® TRIO FL è miscibile con gli altri erbicidi di post-
emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione, quali quelli
a base di cloridazon, metamifon, fenacil, clopiralid,
propizamide, triflusaluron-metil e graminicidi a base di
haloxyfop-etossietile, cletodim, cicloxidim, fenoxaprop-p-etile,
flazifop-p-butile, propaquizolof, quazalofop-etile, setossidim e
metolachlor, e con olio bianco.

Si sconsiglia l'impiego di KEMIFAM® TRIO FL in associazione
ad insetticidi liquidi o in polvere bagnabile a base di Azinfos.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più
tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare
il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in
etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 120 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni
altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni
derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per
assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle
piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON

DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Officine di produzione

- Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Wolfenbüttel (Germania).
- Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Francoforte sul Meno
(Germania).
- AgrEvo ProdeTech S.A. - Saint Macler - 13367 Marsiglia
(Francia).
- AgrEvo UK Limited, Hauxton, Cambridge (Regno Unito).

Officina di confezionamento

- FitorFormula s.r.l. - Aprilia (LT).
- Agrif-Formula s.r.l. - Paganica (AQ).

CONTENUTO: 1 - 5 L

19.0202

KEMIRON® 500 SC

Erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero
e per il tabacco.

Formulazione: pasta fluida

Composizione:

Etofurumesate puro 44,64 g/500 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Partita N°

NATURA DEL RISCHIO

sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA

- conservare il prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
 - conservare la confezione ben chiusa;
 - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
 - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
 - non operare contro vento;
 - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
 - dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
- Consultare un Centro Antiveleni

Titolare dell'Autorizzazione:

 **Aventis**

Aventis CropScience Italia S.p.A. P.le S. Türr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 6088 del 12/9/1994 del Ministero della Sanità

® marchio registrato

CARATTERISTICHE

KEMIRON® 500 SC agisce per assorbimento fogliare e radicale. Efficacia erbicida: il prodotto usato da solo è attivo contro le più comuni infestanti annuali graminacee ad eccezione della Lolium spp. (Loliosa) e contro diverse infestanti a foglia larga quali Stellaria spp. (Stellaria), Galium spp. (Attaccamano), Amaranthus spp. (Amaranto), Solanum nigrum (Eroa morella), Polygonum persicaria (Persicaria).

DOSIE MODALITA' D'IMPIEGO

Epoca d'impiego:

Pre-semina: Con leggera incorporazione a 2-3 cm di profondità, in miscela con Cloridazon o Lenacil o Metamitron.

Pre-emergenza: Subito dopo la semina e comunque prima dell'emergenza delle infestanti, miscelate ancor più polivalenti e complete di KEMIRON® 500 SC impiegato da solo.

Post-emergenza: in miscela con Fenmedifam su infestanti ai primi stadi di sviluppo e con bietole che abbiano già differenziato almeno 2 foglie vere.

Nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza il prodotto può essere usato su tutti i tipi di terreno ad eccezione di quelli sabbiosi e di quelli con tenore di sostanza organica superiore al 5%.

Il pre-semina è preferibile al pre-emergenza soprattutto in coincidenza di semine tardive.

Con le miscele sopra suggerite (KEMIRON® 500 SC + Lenacil o Cloridazon o Metamitron in pre-semina o pre-emergenza e con Fenmedifam in post-emergenza) lo spettro d'azione è più ampio e completo.

DOSI D'IMPIEGO

Bietola di semina autunnale

Pre-semina o pre-emergenza: KEMIRON® 500 SC a 2 l/ha in miscela con Lenacil a 0,7-0,8 kg di p.a./ha.

Post-emergenza: Usare KEMIRON® 500 SC alla dose di 1,2-1,5 l/ha in combinazione con 0,8-1 l/ha di Fenmedifam.

Bietola di semina primaverile:

Pre-semina o pre-emergenza: Usare KEMIRON® 500 SC a 2 l/ha miscelato con Lenacil a 0,4-0,5 kg di p.a./ha o Cloridazon a 2,2-2,5 kg di p.a./ha o Metamitron a 2,5-3 kg/ha di p.a.

Post-emergenza: KEMIRON® 500 SC in questa epoca può essere miscelato alla dose di 1,1-1,2 l/ha con Fenmedifam 0,6-0,8 l/ha di p.a., usando la dose più bassa in presenza di temperature relativamente elevate (20-24°C) e la dose più alta con temperature non superiori a 20°C. Usare un volume di acqua di 300-500 l/ha nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza, mentre si raccomanda di non superare i 300 l/ha in post-emergenza.

Il prodotto può essere distribuito anche localizzato.

Preparazione della miscela: Agitare il contenitore diverse volte prima di procedere alla misurazione della quantità di liquido richiesta. Quando si miscela il prodotto con Fenmedifam o insetticidi, mettere il KEMIRON® 500 SC per ultimo tenendo la polliglia in costante agitazione.

Condizioni di trattamento: Un sufficiente grado udometrico del terreno nel periodo successivo al trattamento di pre-emergenza è condizione essenziale per ottenere un buon risultato. In caso di siccità effettuare un intervento irriguo. Nelle applicazioni di post-emergenza con Fenmedifam, è consigliabile non trattare quando la temperatura è superiore ai 25°C. In tal caso è buona norma rimandare il trattamento al tardo pomeriggio.

Se dopo il trattamento di pre-emergenza si dovesse abbandonare la coltivazione della barbabietola, prima di seminare un'altra specie, effettuare una profonda aratura.

Tabacco

Epoca d'intervento: Intervenire qualche giorno prima del trapianto, possibilmente in assenza delle infestanti.

Dose in pre-trapianto: 1,5-2 l/ha di KEMIRON® 500 SC associato a Pendimetalin 700-950 g p.a./ha o Diflometilam a 2,5-3 kg/ha di p.a. o a Metobromuron alla dose di 750-1000 g/ha di p.a. per completamento dello spettro d'azione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con altri formulati che ne completino l'efficacia contenenti i principi attivi Fenmedifam, Lenacil, Cloridazon, Metamitron, Pendimetalin, Diflometilam, Metobromuron.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SUL TABACCO L'INTERVALLO DI SICUREZZA È DI 90 GIORNI

AVVERTENZE

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Precauzioni: Conservare il prodotto in luogo fresco nel periodo estivo ed evitare il gelo nel periodo invernale.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Officine di produzione:

- Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Wolfenbuttel (Germania)
- AgrEvo Prode Tech S.A. - Saint Marcel (Francia)
- AgrEvo UK Limited - Hauxton - Cambridge (Regno Unito)
- FlotFormula s.r.l. - Aprilia (I.T.).

Contenuto: 0,5 - 1 - 3 - 5 L

24.402

MITAC® 20 CE


INSETTICIDA-ACARICIDA IN FORMULAZIONE CONCENTRATO
EMULSIONABILE, A LUNGA PERSISTENZA

MITAC® 20 CE

Composizione:

Amitraz puro 20,5% (190 g/l)

Contiene Xilene.



PARTITA N°

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile - nocivo per inalazione ed ingestione - irritante per la pelle
- può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrarli la etichetta).

Titolare dell'Autorizzazione



Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Turr. 5 - 20149 MILANO

Officina di produzione:

Registrazione n°5473 del 3/10/1983 del Ministero della Sanità

CONTENUTO: 0,5 - 1 - 5 - 10 L

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI

-conservare il recipiente ben chiuso
-non operare contro vento
-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in appositi recipienti, possibilmente all'aperto, o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, mangimi.
Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua o su altre colture.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, ipereccitabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile parglicemia.

Terapia: sintomatica, monitoraggio cardiorespiratorio per il rischio della bradicardia.

Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITA D'IMPIEGO

MITAC 20 CE è un insetticida-acaricida dotato di persistenza, che agisce per contatto, asfissia e penetrazione nei tessuti vegetali.

MITAC 20 CE è particolarmente efficace contro la psilla del pero (trattamento a uova gialle/prima comparsa pegnoli). MITAC 20 CE controlla inoltre tutti gli stadi del Ragno rosso (Acaro Tetranychid); i migliori risultati si ottengono intervenendo nelle fasi iniziali dell'infestazione, ossia in presenza di poche forme mobili per foglia. Se necessario, e qualora la coltura consenta più di un intervento per stagione, ripetere l'applicazione dopo 3 settimane o alla prima reinfestazione. Per colture in serra o nelle applicazioni precoci con clima relativamente freddo impiegare la dose di 250 ml di prodotto per ettolitro di acqua.

MITAC 20 CE può essere impiegato sia con attrezzature operanti a volume normale, sia con atomizzatori eroganti volumi ridotti di soluzione per unità di superficie, purché si rispetti sempre la quantità di formulato per ettaro.

COLTURA	ACARI ED INSETTI CONTROLLATI	DOSI DI FORMULATO INDICATE per unità di superficie (litri/ha)	NUMERO MASSIMO DI INTERVENTI PER STAGIONE
Pero	P. ulmi, T. urticae, Psille	3-4,2	2
Melo	P. ulmi, T. urticae, Afidi (A. pomi)	2,5-3,5	2
Fiorali ed ornamentali	T. Urticae	2-2,5	-

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti fitosanitari in commercio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU MELO E PERO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Officine di produzione:

- AgEvo UK Limited, Hauxton, Cambridge (Regno Unito)
- AgEvo UK Limited, Beeston (Regno Unito)
- AgEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- FlotFormula S.r.l. - Apulia (L.T)

29.0302

MITAC® TOP

Insetticida-Acaricida

in formulazione concentrato emulsionabile (EC)

MITAC® TOP



COMPOSIZIONE:

Amiraz puro 19,8% p/p (= 200g/l)
Coformulanti q. b. a 100

Partita n.:

Frasi di Rischio:

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per la pelle
Rischio di gravi lesioni oculari
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Può causare danni polmonari se ingerito.

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione:



Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Türr, 5 - MILANO

Officina di produzione:

Registrazione n. 9500 del 10.02.1998 del Ministero della Sanità

Contenuto: 1 - 5 - 10 - 20 l

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

© Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, iperexcitabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile iperglicemia.

Terapia: sintomatica, monitoraggio cardiorespiratorio per il rischio della bradicardia.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVENENI

CARATTERISTICHE

Mitac Top è un insetticida-acaricida attivo contro numerosi parassiti. Mitac Top è particolarmente efficace contro la psilla del pero (neanidi e ninfe), Mitac Top, impiegato tempestivamente ad inizio infestazione, ha elevata attività contro gli acari tetranychidi (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eutetranychus carpini) ed eriofidi (Aculus schlechtendali, Eriophyes pyri). Il prodotto manifesta anche un'interessante azione collaterale nei confronti della litocollate del melo (Phylloxera vitifoliae).

Contro psilla (Carposylla pyri) Mitac Top si applica preferibilmente alla prima comparsa delle noanidi, ma grazie agli speciali coformulanti, assicura buoni risultati anche quando è iniziata la formazione della melata.

Mitac Top è particolarmente consigliato per la protezione del pero per l'elevata azione psillicida e la contemporanea attività acaricida che contribuisce alla prevenzione del "brusone", la cui manifestazione è favorita ed aggravata dalla presenza, anche limitata, di alcuni

DOSI D'IMPIEGO

Mitac Top si impiega alla concentrazione di 250-300 ml/ha effettuando una bagnatura accurata ed omogenea di tutta la vegetazione. La tabella riporta le dosi/ha per le diverse colture.

COLTURA	PARASSITA	DOSE l/ha	N° trattamenti per stagione
PERO	Psilla ed acari (Panonychus ulmi, eriofidi) con trattamenti tempestivi all'inizio dell'infestazione	3,0-4	2
MELO	Acari (P. ulmi, Aculus s., Epitrimerus p.), litocollate (azione collaterale)	2,5-3,5	2
COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI	Acari (Tetranychus urticae)	2,5	secondo necessità

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari in commercio a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di infestazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per i pesci e per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU MELO E PERO.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Officine di produzione:

AgrEvo Prods Tech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)

AgrEvo UK Limited, Beeston (Regno Unito)

AgrEvo UK Limited, Hauxton, Cambridge (Regno Unito)

Fittoformule S.r.l. - Aprila (L.T)

29.0302

NORTRON®

Erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero
e per il tabacco

Formulazione: concentrato emulsionabile (EC)

NORTRON®

Composizione:

Etolumesate puro 21,1% (200 g/l).

Coformulanti q.b. a 100 g

Contiene cicloesanone e xilene.



PARTITA N°

Infiammabile - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Titolare dell'Autorizzazione:

Aventis

Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Turr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 2342 del 5/10/1976 del Ministero della Sanità

CONTENUTO: 1 - 2,5 - 5 L

Officina di produzione

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

© Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA

Conservare il recipiente ben chiuso

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

Non operare contro vento

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveneni

Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

NORTRON® è un erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero e per il tabacco efficace contro le più comuni infestanti annuali tipiche dei bietolai e del tabacco ed in modo particolare *Alopecurus myosuroides* e *Amaranthus retroflexus*; non controlla *Malricaria* spp., *Mercurialis annua*, *Lamium* spp., *Gaïthragia parviflora*, *Senecio vulgaris*. Nel caso siano presenti le suddette infestanti si consiglia la miscela con prodotti che ne completino l'efficacia.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Barbabietola da zucchero

-pre-emergenza: subito dopo la semina e comunque prima dell'emergenza delle infestanti: 5 l/ha sia da solo che in miscela con Cloridazon a 1,6 kg s.a./ha o Lenacil a 0,5 kg s.a./ha;

-post-emergenza: con bietole che abbiano almeno due foglie vere, il NORTRON® in questo stadio della coltura si miscela alla dose di 2-2,5 l con Belanal (5 l) usando la dose più bassa con temperature elevate e la dose maggiore con temperature non superiori ai 20°C. Usare una quantità di acqua di 300-500 l/ha in pre-emergenza e non superare i 300 l in post-emergenza. Il prodotto si può distribuire anche localizzato.

Tabacco

Pre-trapianto: 5 l/ha di NORTRON® preferibilmente associato a Diflufenidato a 2,5-3 kg/ha di s.a. o a Metobromuron alla dose di 1 kg/ha di s.a.. Applicare qualche giorno prima del trapianto, possibilmente in assenza di infestanti. Si può usare su tutti i tipi di terreno, ad eccezione di quelli sabbiosi e di quelli con un tenore di sostanza organica superiore al 5%.

Avvertenza: Quando si vuole miscelare il prodotto con un altro di pre-emergenza, consultare il tecnico di zona. Su bietolai trattati con NORTRON® in pre-emergenza si può usare il Belanal in post-emergenza.

Preparazione della miscela: Quando si miscela con il Belanal o con prodotti insetticidi, mettere il NORTRON® per ultimo, agitando.

Condizioni di trattamento: Una sufficiente umidità del terreno a seguito del trattamento è essenziale per ottenere un buon risultato. Nel trattamento di post-emergenza con Belanal, evitare di intervenire quando la temperatura è superiore ai 20-25°C. In presenza di temperature elevate, trattare nel tardo pomeriggio. Se dopo il trattamento di pre-emergenza si dovesse abbandonare la coltivazione della bietola, prima di seminare un'altra specie, effettuare una profonda aratura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SUL TABACCO L'INTERVALLO DI SICUREZZA È DI 90 GIORNI

AVVERTENZE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Precauzioni: Si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco nel periodo estivo ed evitare il gelo nel periodo invernale.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Officine di produzione:

-AgriEvo Prode Tech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)

-AgriEvo UK Limited Hauxton, Cambridge (Regno Unito)

-FlorFormula s.r.l. - Aprilia (LT)

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

POINTER®

GRANULI IDRODISPERSIBILI

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA
DEL FRUMENTO TENERO E DURO E DELL'ORZO**POINTER®**


Composizione:

100 g di prodotto contengono:

Tribenuron metile p.a. puro 75 g

Coformulanti q.b. a 100 g

Partita N.

**FRASI DI RISCHIO**

Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrarli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione



Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Taur.5 - 20149 MILANO

Officina di produzione

Reg. n° 7995 del 24/1/1992 Ministero della Sanità

CONTENUTO: 50 - 100 g

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato dalla E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

NORME PRECAUZIONALI

- conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici
- conservare la confezione ben chiusa
- non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- può irritare occhi, naso e gola: evitare pertanto il contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti e di respirare i vapori durante il trattamento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi non sono noti in caso di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea.

Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

EPOCA D'IMPIEGO

In post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga. POINTER® viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate: subito dopo l'assorbimento POINTER® blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione.

Condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.

DOSI D'IMPIEGO: 10-15 g/ha, da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di 3 foglie fino a quello di botticella delle colture.

E' attivo su: Aneto (*Anethum graveolens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Rughetta (*Dipsacis spp.*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Magra (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggola (*Polygonum aviculare*), Convulvulo nero (*Fallopia convolvulus*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*). Per il controllo di *Fioridalo* (*Centaurea cyanus*), *Fumaria* (*Fumaria officinalis*), *Geranio* (*Geranium dissectum*), *Falsa orlica* (*Lamium purpureum*), *Ranuncoli* (*Ranunculus spp.*), *Romice* (*Rumex spp.*), *Pettine di venere* (*Scandix peden-veneris*), *Veronica* (*Veronica persica*), *Vecchia* (*Vicia spp.*), *Viola* (*Viola tricolor*), si consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggiunta di bagnante.

In caso di forti infestazioni di *Crisantemo delle messi* (*Chrysanthemum segetum*) e *Ravanello selvatico* (*Raphanus raphanistrum*) applicare POINTER® alla dose di 20 g/ha con bagnante allo 0,1%.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

POINTER®, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE

- nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
 - svuotare il serbatoio, risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuolare nuovamente;
 - riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere ammoniaca (una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora;
 - ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al secondo punto;
 - rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita;
 - filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%.
 - su varietà di frumento e orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
 - dopo un trattamento con POINTER® si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
- Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**FITOTOSSICITA'**

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di contaminare corpi idrici. Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.**

Officine di produzione:

- Hoechst Schering Agrovet GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
- AgriEvo ProdeTech S.A. - Saint-Marcel - 13367 Marseilla (Francia)
- Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay (Francia)

13.202

FORMATO RIDOTTO POINTER®

GRANULI IDRODISPERSIBILI

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA
DEL FRUMENTO TENERO E DURO E DELL'ORZO

POINTER®


Composizione:

100 g di prodotto contengono:

Tribenuron metile p.a. puro 75 g

Coformulanti q.b. a 100 g

Partita N.



IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione



Aventis
Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Turr, 5 - 20149 MILANO

Officina di produzione:

Reg. n° 7995 del 24/1/1992 Ministero della Sanità

CONTENUTO: 50 - 100 g

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo

® Marchio registrato dalla E.I. Du Pont de Nemours & Co.
(Inc.) 13 202

POINTER®

**GRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI
ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA
DEL FRUMENTO TENERO E DURO E DELL'ORZO**

POINTER®


Composizione:

100 g di prodotto contengono:

Tribenuron metile p.a. puro 75 g

Coformulanti q.b. a 100 g

Partita N.



FRASI DI RISCHIO irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione



Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Turr, 5 - 20149 MILANO

Officina di produzione

Reg. n° 7995 del 24/1/1992 Ministero della Sanità

CONTENUTO: 10g (1 x 10g) - 15g (1 x 15g)

Il CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato dalla E.I. Ou Pont de Nemours & Co. (Inc.)

AVVERTENZE

- nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
 - svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente;
 - riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere ammoniacca (una soluzione di ammoniacca di uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri di acqua.
- Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora;
- ripetere il lavaggio con ammoniacca come descritto al secondo punto;
- rimuovere le tracce di ammoniacca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita;
- filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniacca di uso domestico al 6%;
- su varietà di frumento e orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività;
- dopo un trattamento con POINTER® si sconsiglia la kasemina di leguminosa foraggiere.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Evitare di contaminare corpi idrici.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

Officine di produzione:

- Hoechst Schering AgroVet GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
- AgrEvo Prode Tech S.A. - Saint Marcel - 13367 Mairsiglia (Francia)
- Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Caray (Francia)

13.202



Questa confezione contiene sacchetti con idrosolubili



Non toccare mai i sacchetti con maniglieri bagnati

AVVERTENZE PARTICOLARI

Per la preparazione della soluzione procedere come di seguito indicato:



1. Assicurare la completa pulizia della bottiglia e riempirla per 1/3 con acqua facendola scorrere su pareti e fondo.



2. Togliere i sacchetti idrosolubili dalla confezione, facendo attenzione a non lacerare i sacchetti.



3. Introdurre nella bottiglia il necessario numero di sacchetti idrosolubili facendoli scorrere su pareti e fondo.



4. Azionare l'agitatore nel giro di qualche minuto si completa la soluzione.



5. Completare il riempimento della bottiglia con acqua ed eventuale altri prodotti da miscelare.

STOCAGGIO
Se non si utilizza tutti i sacchetti inghiottire bene la confezione.
Conservare in un luogo asciutto.
ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenuto dei sacchetti idrosolubili non venga mai in contatto con l'ambiente. Il prodotto non deve essere smaltito nella confezione vuota, deve essere effettuato nel rispetto della legislazione vigente.

POINTER®

GRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI
ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA
DEL FRUMENTO TENERO E DURO E DELL'ORZO

POINTER®**Composizione:**

100 g di prodotto contengono:
Tribenuron metile p.a. puro 75 g
Coformulanti q.b. a 100 g

Partita N.

**Titolare dell'Autorizzazione**

Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Türr, 5 - 20149 MILANO

Reg. n° 7995 del 24/1/1992 Ministero della Sanità

CONTENUTO: 10 - 15 g

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI

Attenzione per l'uso leggere attentamente il testo riportato sulla confezione


Fac-simile di stampa per la monodose idrosolubile

PREMIS® GETA

Fungicida liquido per la difesa dei cereali
mediante la concia delle sementi.

Sospensione concentrata per trattamento delle sementi (FS)

PREMIS® GETA



Composizione

Triticonazolo puro 1,17 g (12,5 g/l)
Guazatina pura 14 g (150 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

Partita n.

Frasi di Rischio

Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi

Consigli di prudenza

Conservare lontano dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'Autorizzazione



Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Türr, 5 - 20149 MILANO

Officina di produzione:

Contenuto netto: 1 - 10 - 20 - 25 - 50 - 200 - 900 - 1000 L

Registrazione N. 10122 del 02/09/99 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

© Marchio registrato

Norme precauzionali

Non operare contro vento

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Triticonazolo 1,17 %

Guazatina 14 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione

Guazatina: sostanza non volatile, solubile in acqua e metanolo,

insolubile nella maggior parte dei solventi organici.

Sintomi: vomito, ipotensione, bradipnea, collasso cardiocircolatorio (shock).

Triticonazolo: --

Terapia: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVENENI

CARATTERISTICHE

PREMIS® GETA è un'associazione fungicida ad azione sistemica e di contatto caratterizzata da ampio spettro di azione per l'impiego nella concia delle sementi dei cereali.

PREMIS® GETA è efficace contro il complesso delle malattie trasmesse dal seme e del piede dei cereali: Fusariosi (Fusarium culmorum, Fusarium graminearum e Fusarium nivale), Carie (Tilletia caries) e Septoriosi (Septoria nodorum).

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Cereali: (Frumento tenero, duro, Orzo, Avena, Segale, Triticale e Farro): 250- 400 ml /100 kg di semente.

Utilizzare la dose più elevata su seme da moltiplicazione e su partite di seme sicuramente infette.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il trattamento va effettuato a macchina (concia slurry o tecnologie similari) irrorando direttamente sul seme la dose tale quale di prodotto, oppure diluita in un quantitativo di acqua (200 ml o più per 100 kg di seme) in funzione del tipo di impianto disponibile e del seme da trattare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato preferibilmente da solo

AVVERTENZE

E' necessario utilizzare una maschera di protezione facciale con filtro EN 149 FFP3 o equivalente monouso in tutte le operazioni di concia delle sementi e durante gli interventi di manutenzione e pulizia delle apparecchiature.

I semi trattati non devono essere destinati all'alimentazione dell'uomo e del bestiame.

Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

Attenzione, il formulato contiene sostanza attiva tossica per gli uccelli, molto tossica per gli organismi acquatici e nociva per la fauna selvatica.

Durante la fase di caricamento adoperare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

PER LE TAGLIE DA 200 - 900 - 1000 LITRI

AD ESCLUSIVO USO DELLE INDUSTRIE SEMENTIERE

**ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL
PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO**

**LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI
CONTENITORI DA 200-900-1000 LITRI DEVE ESSERE
EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI**

**CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A
RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI
DEL PRODOTTO**

Officina di produzione

AgriFormula s.r.l. - Paganica (AQ)

Rhône-Poulenc Agro France - Villefranche (Francia)

CMPA - Beziers (Francia)

06.202

REAL® GETA

Fungicida liquido per la difesa del frumento mediante la concia delle sementi.

Sospensione concentrata per trattamento delle sementi (FS)

REAL® GETA

**Composizione**

Triticonazolo puro 11,2 g (120 g/l)
Guazatina pura 11,2 g (120 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

Partita n.

Frasi di Rischio

Nocivo per ingestione
Possibile rischio di ridotta fertilità
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'Autorizzazione



Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Turr, 5 - 20149 MILANO

Officina di produzione:

Registrazione N. 10123 del 02/09/99 del Ministero della Sanità

Contenuto: 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50 - 200 - 900 - 1000 L

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato

Norme precauzionali

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Triticonazolo 11,2 %
Guazatina 11,2 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione

Triticonazolo: —

Guazatina: sostanza non volatile, solubile in acqua e metanolo, insolubile nella maggior parte dei solventi organici.

Sintomi: vomito, ipotensione, bradipnea, collasso cardiocircolatorio (shock).

Terapia: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**CARATTERISTICHE**

REAL® GETA è un fungicida specifico per il trattamento delle sementi dei cereali in grado di prevenire le malattie trasmesse da seme o presenti nel terreno nonché di contenere e ridurre l'intensità delle malattie fogliari e dei culmi.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Frumento tenero e duro: 500 ml / 100 kg di seme contro
Fusarium roseum, Fusarium nivale, Tilletia caries, Septoria nodorum, Ustilago spp., Fusarium spp. (mal del piede, infezioni tardive dei culmi), Erysiphe graminis, Septoria spp., Puccinia striiformis, P. recondita

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il trattamento va effettuato a macchina (concia slurry o tecnologie similari) irrorando direttamente sul seme la dose di prodotto tal quale, oppure diluita in acqua in funzione del tipo di impianto disponibile e del seme da trattare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto va impiegato preferibilmente da solo.

AVVERTENZE

E' necessario utilizzare una maschera di protezione facciale con filtro EN 149 FFP3 o equivalente monouso in tutte le operazioni di concia delle sementi e durante gli interventi di manutenzione e pulizia delle apparecchiature.

Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte.

I semi trattati non devono essere destinati all'alimentazione dell'uomo e del bestiame.

Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi

Attenzione, il formulato contiene sostanza attiva tossica per gli uccelli, molto tossica per gli organismi acquatici e nociva per la fauna selvatica. Durante la fase di caricamento adoperare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

PER LE TAGLIE DA DA 200 - 900 - 1000 LITRI

AD ESCLUSIVO USO DELLE INDUSTRIE SEMENTIERE

ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO

LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI DA 200-900-1000 LITRI DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO

Officine di produzione
AgrimFormula s.r.l. - Paganica (AQ)
CMPA - Beziers (Francia)

06/202

TRAMAT®

Erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero
e per il tabacco

Formulazione: concentrato emulsionabile (EC)

TRAMAT®**Composizione:**

Etiomesate puro 21,1% (200 g/l).
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene cicloesanone e xilene.

**PARTITA N°**

Inflammabile - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Titolare dell'Autorizzazione:

Aventis

Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Turr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 2343 del 5/10/1976 del Ministero della Sanità

CONTENUTO: 1 - 2,5 - 5 L

Officina di produzione

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA

Conservare il recipiente ben chiuso
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

TRAMAT® è un preparato indicato per il diserbo della barbabietola da zucchero e perfettamente tollerato dalla coltura del tabacco. È caratterizzato da uno spettro d'azione sufficientemente ampio da comprendere le principali erbe infestanti, sia graminacee che a foglia larga, comunemente presenti nei nostri campi coltivati. In particolare controlla efficacemente: *Alopecurus m.*, *Avena spp.*, *Poa spp.*, *Echinochloa c.g.*, *Setaria spp.*, *Digitaria s.*, *Panicum d.*, *Amaranthus f.*, *Perfoliata o.*, *Stellaria m.*, *Galium a.*, *Fumaria o.* Non controlla sufficientemente *Matricaria c.*, *Lamium spp.*, *Galinsoga p.*, *Senecio v.*, *Stachys a.* Nel caso siano presenti queste ultime infestanti è necessario ricorrere ad una idonea associazione per completare lo spettro d'azione del prodotto.

TRAMAT® è un diserbante che si presta molto bene ad essere impiegato in epoche diverse (pre/post-emergenza della bietola, pre-trapianto del tabacco).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO**Barbabietola da zucchero**

In pre-emergenza: 5 l/ha di TRAMAT® in miscela con 0,5 kg/ha di Lenaci oppure con 1,6 kg/ha di Cloridazon.
In post-emergenza: 2-2,5 l/ha di TRAMAT® in miscela con Betanal 5 l/ha.

Usare una quantità di acqua di 400-500 l/ha nelle applicazioni di pre-emergenza e non superare i 300 l/ha in post-emergenza.

Tabacco

In pre-trapianto: 5 l/ha di TRAMAT® preferibilmente associato a Difenamide alla dose di 2,5-3 kg/ha di p.a. o a Metobromuron alla dose di 1 kg/ha di p.a.

Il prodotto va usato qualche giorno prima del trapianto, possibilmente in assenza di infestanti.

Avvertenza

Condizioni per la riuscita del trattamento: una sufficiente umidità del terreno è essenziale per ottenere un buon risultato; in caso di siccità prolungata, nel periodo successivo al trattamento, intervenire con una normale irrigazione.

Negli interventi di diserbo in post-emergenza evitare di intervenire quando la temperatura dovesse essere superiore a 25°C: in tal caso rimandare l'applicazione al tardo pomeriggio.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto è miscibile con i preparati più comunemente usati nel diserbo della bietola e del tabacco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SUL TABACCO L'INTERVALLO DI SICUREZZA È DI 90 GIORNI**AVVERTENZE**

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE****SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI****Officine di produzione:**

-AgriEvo Prode Tech S.A. - Saint Marcel - 13387 Marsiglia (Francia)

-AgriEvo UK Limited Hauxton, Cambridge (Regno Unito)

-Fitofarm s.r.l. - Aprilia (LT)

TRAMAT® FLO

Erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero e per il tabacco

Formulazione: pasta fluida

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Etofumesate puro 44,64 g (500 g/l)

Coformulanti: q.b. a 100 g

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Partita N°

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
conservare la confezione ben chiusa;
non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corli d'acqua;
non operare contro vento;
evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Titolare dell'autorizzazione

 **Aventis**

Aventis CropScience Italia S.p.A. - P.le S. Türr, 6 - 20149 MILANO

Registrazione N° 5804 del Ministero della Sanità del 27/03/84

© MARCHIO REGISTRATO

CARATTERISTICHE

TRAMAT® FLO agisce per assorbimento fogliare e radicale.
Efficacia erbicida: il prodotto usato da solo è attivo contro le più comuni infestanti annuali graminacee ad eccezione del *Lolium* spp. (lolaia) e contro diverse infestanti a foglia larga quali *Stellaria* spp. (stellaria), *Galium* spp. (attaccamano), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Solanum nigrum* (erba morella), *Polygonum persicaria* (persicaria).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Pre-semina: Con leggera incorporazione a 2-3 cm di profondità, in miscela con Cloridazon o Lenacil o Metolamitron.

Pre-emergenza: Subito dopo la semina e comunque prima dell'emergenza delle infestanti, ancora in associazione con Cloridazon o Lenacil o Metolamitron, miscela ancor più polivalente e completa del TRAMAT® FLO impiegato da solo.

Post-emergenza: In miscela con Fenmedifam su infestanti ai primi stadi di sviluppo e con bietole che abbiano già differenziato almeno 2 foglie vere.

Nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza il prodotto può essere usato su tutti i tipi di terreno ad eccezione di quelli sabbiosi e di quelli con tenore di sostanza organica superiore al 5%. Il pre-semina è preferibile al pre-emergenza soprattutto in coincidenza di semine tardive.

Con la miscela sopra suggerita (TRAMAT® FLO + Lenacil o Cloridazon o Metolamitron in pre-semina o pre-emergenza e con Fenmedifam in post-emergenza) lo spettro d'azione è più ampio e completo.

DOSI D'IMPIEGO

Bietola di semina autunnale
Pre-semina o pre-emergenza: TRAMAT® FLO a 2 l/ha in miscela con Lenacil a 0,7-0,8 kg di p.a./ha.

Post-emergenza: Usare TRAMAT® FLO alla dose di 1,2-1,5 l/ha in combinazione con 0,8-1 l/ha di Fenmedifam.

Bietola di semina primaverile

Pre-semina o pre-emergenza: Usare TRAMAT® FLO a 2 l/ha miscelato con Lenacil a 0,4-0,5 kg di p.a./ha o Cloridazon a 2-2,5 kg di p.a./ha o Metolamitron a 2,5-3 kg/ha di p.a.

Post-emergenza: TRAMAT® FLO in questa epoca può essere miscelato alla dose di 1-1,2 l/ha con Fenmedifam 0,6-0,8 l/ha di p.a., usando la dose più bassa in presenza di temperature relativamente elevate (20-24°C) e la dose più alta con temperature non superiori a 20°C. Usare un volume di acqua di 300-500 l/ha nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza, mentre si raccomanda di non superare i 300 l/ha in post-emergenza. Il prodotto può essere distribuito anche localizzato.

Preparazione della miscela: Agitare il contenitore diverse volte prima di procedere alla misurazione della quantità di liquido richiesta. Quando si miscela il prodotto con Fenmedifam o insetticidi, mettere il TRAMAT® FLO per ultimo tenendo la poltiglia in costante agitazione.

Condizioni di trattamento: Un sufficiente grado idrometrico del terreno nel periodo successivo al trattamento di pre-emergenza è condizione essenziale per ottenere un buon risultato; in caso di siccità effettuare un intervento irriguo. Nelle applicazioni di post-emergenza con Fenmedifam, è consigliabile non trattare quando la temperatura è superiore ai 25°C, in tal caso è buona norma rimandare il trattamento al tardo pomeriggio.

Se dopo il trattamento di pre-emergenza si dovesse abbandonare la coltivazione della barbabietola, prima di seminare un'altra specie, effettuare una profonda aratura.

Tabacco

Epoca d'intervento: Intervenire qualche giorno prima del trapianto, possibilmente in assenza delle infestanti.

Dose in pre-trapianto: 1,5-2 l/ha di TRAMAT® FLO associato a Pendimetalin 700-950 g p.a./ha o Diflometilamida a 2,5-3 kg/ha di p.a. o a Metolamitron alla dose di 750-1000 g/ha di p.a. per il completamento dello spettro d'azione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

il prodotto è miscelabile con altri formulati che ne completino l'efficacia contenenti i principi attivi Fenmedifam, Lenacil, Cloridazon, Metolamitron, Pendimetalin, Diflometilamida, Metolamitron.

AWERTENZE

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SUL TABACCO L'INTERVALLO DI SICUREZZA È DI 90 GIORNI

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare il prodotto in luogo fresco nel periodo estivo ed evitare il gelo nel periodo invernale.

DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**

Officine di produzione

- Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Wollensbüttel (Germania)

- AgrEvo UK Limited, Hauxton, Cambridge (Regno Unito)

- AgrEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marseglia (Francia)

- FlotFormula s.r.l. - Aprilia (LT)

- AgrFormula s.r.l. - Paganica (AQ)

Taglie autorizzate: 1 - 3 L

IMPRESA

BASF A.G. (AKTIENGESELLSCHAFT)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

STRATOS®

**ERBICIDA DI POST-EMERGENZA
PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI GRAMINACEE
ANNUALI E PERENNI.
LIQUIDO EMULSIONABILE**

STRATOS

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
Cycloxydim puro g 21,0 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100



FRASI DI RISCHIO:

Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare della registrazione e Stabilimento di produzione:

**BASF Aktiengesellschaft
D-67056 Ludwigshafen
Germania**

**Distribuito da: BASF Agro Spa
Cesano Maderno (Milano)**

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 7984 del 25.07.91

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 litri

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.

* Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA

Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Stratos è un erbicida sistemico di post-emergenza assorbito per via fogliare, con elevata efficacia anche verso gli organi sotterranei di propagazione vegetativa (rizomi) delle infestanti graminacee.

L'effetto erbicida si manifesta nel volgere di alcuni giorni.

La rapidità d'azione varia in relazione alle condizioni ambientali, risultando più pronta in situazioni di temperatura ed umidità relativa dell'aria elevate.

Infestanti sensibili:

avena selvatica (*Avena fatua*), coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), cappellini dei campi (*Apera spica-venti*), dente canino (*Agropyron repens*), forasacco (*Bromus spp.*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), gramigna (*Cynodon dactylon*), loglio (*Lolium multiflorum*), pabbio (*Setaria viridis*), sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), scagliola (*Phalaris spp.*), sorghetta (*Sorghum halepense*).

CAMPI DI IMPIEGO:

Stratos può essere impiegato per il diserbo delle seguenti colture: barbabietola da zucchero, soia, girasole, patata, colza, vite, melo, pero, pisello, carota, cavoli (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolfiore), cipolla, porro, fagiolo, fagiolino, lattughe e simili (lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, crescione, dolcetta) pomodoro, cotone, floreali e ornamentali.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

Stratos si applica con le usuali irroratrici distribuendo 200-400 litri di acqua per ettaro.

Dosi d'impiego:

litri per ettaro

- graminacee annuali	
fino allo stadio di inizio accestimento	0,75-1,0
da inizio a fine accestimento	1,25
- graminacee perennanti	
<i>Sorghum halepense</i> (sorghetta)	2,0-2,5
trattare con infestanti alte 20-40 cm	
<i>Agropyron repens</i> (dente canino)	
e <i>Cynodon dactylon</i> (gramigna)	2,5-3,0
trattare con infestanti alte 10-20 cm	

Per un miglior controllo di queste infestanti, in particolare in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli all'assorbimento ed alla traslocazione dell'erbicida, si consiglia di frazionare l'applicazione ed effettuare due trattamenti, a metà dose, distanziati di 15-30 giorni.

E' opportuno distribuire il prodotto in miscela ad olio minerale (1,2 kg/ha). Stemperare la dose stabilita di prodotto in poca acqua e portare la soluzione al volume previsto. Mantenere costantemente in funzione l'agitatore dell'irroratrice.

COMPATIBILITÀ:

Stratos è miscibile con alcuni erbicidi di post-emergenza efficaci contro le infestanti a foglia larga.

FITOTOSSICITÀ:

Il prodotto è fitotossico per i cereali e, più in generale, per tutte le colture graminacee.

Stratos può essere inoltre fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela di irrorazione venga trasportata dal vento su colture vicine sensibili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:

30 giorni prima della raccolta per fagiolino, lattughe e simili;

60 giorni prima della raccolta per pisello, cavoli, cipolla, porro, fagiolo, pomodoro, vite e pomacee;

80 giorni prima della raccolta per carota;

100 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, colza, soia, patata e girasole.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO - Smaltire secondo le norme vigenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

02/2002

STRATOS Ultra®

**ERBICIDA DI POST-EMERGENZA
PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI GRAMINACEE
ANNUALI E PERENNI.
LIQUIDO EMULSIONABILE**

STRATOS ULTRA

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
Cycloxydim puro g 10,9 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:

Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare della registrazione e Stabilimento di produzione:

**BASF Aktiengesellschaft
D-67056 Ludwigshafen
Germania**

**Distribuito da: BASF Agro Spa
Cesano Maderno (Milano)**

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10117 del 30/07/1999

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 litri

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.



* Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA

Non contaminare altre colture alimentari e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Stratos è un erbicida sistemico di post-emergenza assorbito per via fogliare, con elevata efficacia anche verso gli organi sotterranei di propagazione vegetativa (rizomi) delle infestanti graminacee. L'effetto erbicida si manifesta nel volgere di alcuni giorni. La rapidità d'azione varia in relazione alle condizioni ambientali, risultando più pronta in situazioni di temperatura ed umidità relativa dell'aria elevate.

Infestanti sensibili:

avena selvatica (*Avena ludoviciana*), coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), cappellini dei campi (*Apera spica-venti*), falsa gramigna (*Agropyron repens*), forasacco (*Bromus spp.*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), gramigna (*Cynodon dactylon*), loglio (*Lolium multiflorum*), pabbio (*Setaria viridis*), sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), scagliola (*Phalaris spp.*), sorghetta (*Sorghum halepense*), riso crodo (*Oryza sativa*).

CAMPI DI IMPIEGO:

Stratos Ultra può essere impiegato per il diserbo delle seguenti colture: barbabietola da zucchero, soia, riso, tabacco, girasole, patata, colza, vite, melo, pero, pesco, albicocco, pisello, carota, cavoli (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolfiore), cipolla, porro, fagiolo, fagiolino, lattughe e simili (lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, crescione, dolcetta), pomodoro, peperone, melanzana, spinacio, carciofo, finocchio, asparago, cotone, floreali e ornamentali.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

Stratos Ultra si applica con le usuali irroratrici distribuendo 200-400 litri di acqua per ettaro. Stemperare la dose stabilita di prodotto in poca acqua e portare la soluzione al volume previsto. Mantenere costantemente in funzione l'agitatore dell'irroratrice.

Dosi d'impiego:

litri per ettaro

TUTTE LE COLTURE ESCLUSO RISO

- graminacee annuali

fino allo stadio di inizio accestimento	1,5 - 2,0
da inizio a fine accestimento	2,5

- graminacee perennanti

Sorghum halepense da rizoma (sorghetta) trattare con infestanti alte 20-40 cm	4,0 - 5,0
Agropyron repens (falsa gramigna) e Cynodon dactylon (gramigna) trattare con infestanti alte 10-20 cm	5,0-6,0

Per un miglior controllo di queste infestanti, in particolare in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli all'assorbimento ed alla traslocazione dell'erbicida, si consiglia frazionare l'applicazione ed effettuare due trattamenti, a metà dose, distanziati di 15-30 giorni.

RISO (Trattamento in presemina)

- Riso crodo, giavone

Fino allo stadio di tre culmi di accestimento	4,0
---	-----

Prima del trattamento accertarsi che la maggior parte delle infestanti sia emersa. Effettuare il trattamento con risaia in asciutta (terreno umido). Dopo il trattamento attendere almeno due giorni prima di immettere acqua nella risaia e farla scorrere per almeno 48 ore prima di procedere alla semina del riso.

COMPATIBILITÀ:

Stratos Ultra è miscibile con alcuni erbicidi di post-emergenza efficaci contro le infestanti a foglia larga.

FITOTOSSICITÀ:

Il prodotto è fitotossico per i cereali e, più in generale, per tutte le colture graminacee.

Stratos Ultra può essere inoltre fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela di irrorazione venga trasportata dal vento su colture vicine sensibili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:

20 giorni prima della raccolta di asparagi, carciofi, peperoni, melanzane, spinaci. - 30 giorni prima della raccolta di pesche, albicocche, fagiolini, finocchi, tabacco, lattughe e simili - 60 giorni prima della raccolta di fagioli, pomodori, piselli, cavoli, cipolle, porri, uva e pomacee - 80 giorni prima della raccolta per carota - 100 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, colza, soia, patata e girasole.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO - Smaltire secondo le norme vigenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERO NELL'AMBIENTE 02/2002

IMPRESA
BASF AGRO S.P.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MERIDIAN® ST

**Erbicida di post-emergenza
per ibridi di mais con dichiarata resistenza
agli erbicidi imidazolinoni
Concentrato Emulsionabile**

MERIDIAN ST - Concentrato Emulsionabile

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
IMAZAMOX, puro g 1,6 (16,7 g/l)
PENDIMETALIN, puro g 23,5 (250 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene 1-metil-2-pirrolidone



FRASI DI RISCHIO

Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

**BASF Agro Spa
Cesano Maderno (Milano)**

Officina di produzione:

BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. - Gravelines (Francia)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Pian d'Asso -
Torrenieri - Fraz. di Montalcino - Siena
WYETH LEDERLE S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - S.S. Padana Sup.re, km 110 -
Caravaggio (BG)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 1 - 5 litri

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.

NORME DI SICUREZZA

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle sostanze attive Imazamox puro 1,6% e Pendimetalin puro 23,5%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: - Imazamox: sostanza classificata non pericolosa; - Pendimetalin: nell'animale da esperimento si osservano depressione del SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. **Terapia sintomatica.** Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 m dai corsi d'acqua.

RISCHI PARTICOLARI. Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il prodotto è selettivo per il diserbo in post-emergenza delle ibridi di mais aventi dichiarata resistenza agli erbicidi imidazolinoni (varietà IMI-resistenti).

Il prodotto agisce sulle piante infestanti per assorbimento, penetra velocemente nelle piante e viene traslocato verso i punti di accrescimento (tessuti meristematici) sia dei germogli che delle radici dove causa subito un rapido arresto della crescita seguito da progressivo ingiallimento e quindi la morte, che sopraggiunge in genere circa 10 giorni dopo l'applicazione.

Spettro d'azione.

Le principali infestanti controllate sono: fra le dicotiledoni, *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Amaranthus sp.* (amaranto), *Atriplex patula* (atriplce), *Chenopodium spp.*, (farinello), *Daucus carota* (carota selvatica), *Datura stramonium* (stramonio), *Lolium spp* (loglio), *Sinapis spp.* (senape), *Raphanus spp* (rapastrello), *Capsella bursa pastoris* (borsapastore), *Polygonum spp* (poligoni), *Solanum spp.* (erba morella), *Stachys annua* (betonica), *Xanthium spp* (nappola); fra le graminacee: *Digitaria spp.* (sanguinella), *Echinochloa crus galli* (giavone) (non oltre le 3 foglie), *Setaria spp* (pabbio), *Sorghum halepense da seme* (sorgheta).

La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2 - 4 foglie vere per le dicotiledoni e di 1 - 3 foglie per le graminacee

Epoca d'impiego.

Post-emergenza precoce. Su ibridi di mais con dichiarata resistenza agli erbicidi imidazolinoni (IMI-resistenti) usare 3,0-4,0 l/ha, diluiti in 300-600 litri d'acqua/ha, esclusivamente miscelato con un partner per completare lo spettro di azione.

La dose più elevata va riservata ai trattamenti su appezzamenti con forte presenza di infestanti graminacee o su terreni ricchi di sostanza organica.

Modalità di impiego.

L'epoca di distribuzione è la post-emergenza precoce negli stadi dalle 2 alle 5 foglie del mais di varietà IMI-resistenti. Utilizzare su terreni con pH maggiore di 6.

FITOTOSSICITA'

Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte il prodotto risulta selettivo sulle colture raccomandate, tuttavia qualche transitorio rallentamento vegetativo potrebbe verificarsi se si effettua il trattamento su colture che si trovano in condizioni di forte stress (per es., dovuto a siccità o caldo eccessivi).

Nel caso che si debba sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse specie possono essere seminate fava, cece, trifoglio, insalata e radicchio. Lasciar trascorrere un periodo di almeno 4 mesi prima di poter seminare in successione alla colture trattate: cavoli, girasole, orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo dopo 6 mesi dal trattamento, previa aratura del terreno.

COMPATIBILITÀ.

Il prodotto normalmente si usa da solo, tuttavia all'occorrenza può essere miscelato con graminicidi specifici qualora l'infestazione si presenti prevalentemente composta di graminacee con molte erbe cresciute oltre lo stadio ottimale previsto per il trattamento.

Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO. Smaltire secondo le norme vigenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

* Marchio registrato

19/03/2002

IMPRESA

BAYER S.P.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CONFIDOR GIARDINO

insetticida-aficida sistemico

CONCENTRATO SOLUBILE**COMPOSIZIONE**

g 100 di Confidor Giardino contengono:

g 17,8 di principio attivo IMIDACLOPRID (200 g/l)

coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non applicare in presenza di vento. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'applicazione su zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante l'applicazione del prodotto indossare quanti protettivi sciacquandoli dopo l'uso. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Conservare soltanto nel recipiente originale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii*, *Macrosiphoniella chrysanthemi*, *Macrosiphum rosae*) e *Metcalfe pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno.**Nocività:** il prodotto è molto tossico per le api. Non trattare né in immediata prefioritura né in fioritura (almeno 10 giorni prima) per evitare la mancata impollinazione.**Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione.****Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.****Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.****BAYER S.p.A. - MILANO**

Officine di produzione e confezionamento: Bayer S.p.A.-Filago (BG); Bayer AG-Leverkusen (Germania); IRCA Service S.r.l. Fornovo S. Giovanni (BG)

Officine di confezionamento: SCB Marle sur Serre (Francia); STI Solfotecnica Italiana Torrenieri (SI)

PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI

Registrazione Ministero della Sanità n. del

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE****SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**

Partita n.

Conservare al riparo dal gelo

ml 5-10-20-25-50-100

Bayer S.p.A**Divisione Agraria**

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

CONFIDOR GIARDINO

insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

COMPOSIZIONE

g 100 di Confidor Giardino contengono :
g 17,8 di principio attivo IMIDACLOPRID (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali : conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non applicare in presenza di vento. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'applicazione su zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante l'applicazione del prodotto indossare quanti protettivi sciacquandoli dopo l'uso. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Conservare soltanto nel recipiente originale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

BAYER S.p.A. - MILANO

Officine di produzione e confezionamento: Bayer S.p.A.-Filago (BG); Bayer AG-Leverkusen (Germania); IRCA Service S.r.l. Forno S. Giovanni (BG)

Officine di confezionamento: SCB Marle sur Serre (Francia); STI Solfotecnica Italiana Torrenieri (SI)

PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI

Registrazione Ministero della Sanità n. del

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Partita n.

Conservare al riparo dal gelo

ml 50-100

Bayer S.p.A

Divisione Agraria



ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

CONFIDOR GIARDINO

insetticida-aficida sistemico

CONCENTRATO SOLUBILE**COMPOSIZIONE**

g 100 di Confidor Giardino contengono :

g 17,8 di principio attivo IMIDACLOPRID (200 g/l)

coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**ATTENZIONE**
Manipolare
con prudenza**PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI**

Registrazione Ministero della Sanita' n. del

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Partita n.

Conservare al riparo dal gelo

ml 5 - 10 - 20 - 25

Bayer S.p.A**Divisione Agraria**

CYDIAN 25 PB

INSETTICIDA INIBITORE DELLA SINTESI DELLA CHITINA

Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

100 g di CYDIAN 25 PB contengono:
25 g di Triflumuron puro
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare mani, cibi, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Melo e pero: 40-60 g/hl contro Lithocolletis, Cemiostoma, Archips, Pandemis, Carpocapsa, Orgia e Psilla, Cydia molesta, Zeuzera.

Pesco: 40-60 g/hl contro Cydia, Anarsia, Lithocollete, Zeuzera.

Cavolo bianco: 50-80 g/hl contro larve defogliatrici (Cavolaia e Mamestra).

Piante forestali: 40-50 g/hl contro Processionaria, Limantria ed Ifantria e Orgia.

Floreali e ornamentali: 40-70 g/hl contro Limantria, Spodoptera littoralis, Ifantria e Orgia.

Modalità di impiego: i migliori risultati si ottengono effettuando il trattamento dall'inizio del volo degli adulti all'inizio della schiusura delle uova.

Non impiegare in fioritura; è necessario sfalcare le erbe in fiore nei frutteti inerbiti.

Nota Bene : per il suo specifico meccanismo d'azione il prodotto si è dimostrato selettivo verso numerosi artropodi utili quali: Fitoseidi, Coccinellidi, Orius spp., Anthocoris spp., Chrisopa spp., Calcididi, Icteuronidi e Sirfidi.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra; escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri ad es.).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER S.p.A. - MILANO

Officine di produzione e confezionamento:

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)

BAYER S.p.A. FILAGO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n° 10625 del 14.11.2000

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Il contenitore non può essere riutilizzato

Smaltire secondo le norme vigenti

0,25-0,5-1 kg

Partita n°

BAYER S.p.A. - MILANO

Divisione Agraria



agg0110

CYDIAN 25 PB

Insetticida inibitore della sintesi della chitina
POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

COMPOSIZIONE

100 g di Cydian 25 PB contengono:
25 g di Triflumuron puro
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Melo e pero: 40-60 g/hl (pari a un sacchetto da g 250 in 600-400 litri di acqua)* contro Lithocolletis e Cerniostoma, Archips, Pandemis, Carpocapsa, Orgia e Psilla, Cydia molesta, Zeuzera.

Pesce: 40-60 g/hl (pari a 1 sacchetto da g 250 in 600-400 litri di acqua)* contro Cydia, Anarsia, Lithocollete, Zeuzera.

Cavolo bianco: 50-80 g/hl (pari a un sacchetto da g 250 in 500-300 litri di acqua)** contro larve defogliatrici (Cavolaia e Mamestra).

Piante forestali: 40-50 g/hl (pari a un sacchetto da g 250 in 600-500 litri di acqua)*** contro Processionaria, Limantria ed Ifantria e Orgia.

Floreali e ornamentali: 40-70 g/hl (pari a un sacchetto da g 250 in 600-350 litri di acqua)**** contro Limantria, Spodoptera littoralis e Ifantria e Orgia.


SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI PREPARAZIONE



Non toccare mai i
sacchetti con
maniguanli
bagnati



Assicurare la com-
pleta pulizia della
botte e riempirla
per 1/3 con acqua
lasciando fermo
l'agitatore



Introdurre nella botte il
necessario numero di
sacchetti idrosolubili
chiusi e lasciare a
riposo per 5-10 minuti



Azionare l'agitatore:
nel giro di qualche
minuto si completa
la solubilizzazione



Completare il riep-
pimento della botte
con acqua ed even-
tuali altri prodotti da
miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i
sacchetti richiudere bene la
confezione. Conservare in
luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

MODALITA' DI IMPIEGO

I migliori risultati si ottengono effettuando il trattamento dall'inizio del volo degli adulti all'inizio della schiusura delle uova.

Non impiegare in fioritura; e' necessario sfalcare le erbe in fiore nei frutteti inerbiti.

Nota Bene: per il suo specifico meccanismo d'azione il prodotto si e' dimostrato selettivo verso numerosi atropodi utili quali: Fitoseidi, Coccinellidi, Orius spp., Anthocoris spp., Chrisopa spp., Calcididi, Ictoneumonidi e Sirfidi.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il prodotto puo' essere miscelato con formulati a reazione neutra; escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri ad es.).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette Istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER S.p.A. - MILANO

Officine di produzione:

- Bayer S.p.A. - Filago (BG);
- S.T.I.-Solfotecnica Italiana - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità N. 10625 del 14/11/2000
DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Il contenitore non può essere riutilizzato
Smaltire secondo le norme vigenti

1 kg (4 x 250 g); 1 kg (5 x 200 g)

Partita n°

BAYER S.p.A. - MILANO
Divisione Agraria

oppure:

* pari a 1 sacchetto da g 200 in 500-350 litri di acqua

** pari a un sacchetto da g 200 in 400-250 litri di acqua

*** pari a 1 sacchetto da g 200 in 500-400 litri di acqua

**** pari a 1 sacchetto da g 200 in 500-300 litri di acqua

agg0110

Bayer

CYDIAN 25 PB

Insetticida inibitore della sintesi della chitina

POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

COMPOSIZIONE

100 g di Cydian 25 PB contengono:
25 g di Triflumuron puro
coformulanti q. b. a 100

Contenuto del sacchetto: 250 g – 200 g

ATTENZIONE

**Manipolare
con prudenza**

AVVERTENZA

**LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE
NON TOCCARE CON MANI BAGNATE**

DA SCIogliere IN ACQUA SENZA ROMPERE

SPHERE

FUNGICIDA SISTEMICO/MESOSTEMICO

EMULSIONE CONCENTRATA contro Cercospora e Oidio della BARBABIETOLA DA ZUCCHERO e Oidio e Ruggini di GRANO e ORZO

SPHERE

COMPOSIZIONE

100 g di SPHERE contengono :
17,2 g di trifloxystrobin puro (187,5 g/l)
7,3 g di ciproconazolo puro (80 g/l)
dispendenti e coadiuvanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO

Possibile rischio per i bambini non ancora nati.

Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia.

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Titolare dell'autorizzazione: BAYER S.p.A. MILANO - Viale Certosa 130

Officina di produzione: BAYER S.p.A. Filago (BG)

Registrazione n. del

Quantità netta del preparato: 1-5-10 litri

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.



NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

TRIFLOXYSTROBIN

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Sintomi aspecifici rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.

CIPROCONAZOLO

Sintomi: Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.

In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Colture, dosi e modalità di impiego

Barbabetola da zucchero: contro Cercospora (*Cercospora beticola*) e Oidio (*Erysiphe betae*) litri 0,6 - 0,8 per ettaro, 2-3 trattamenti a intervalli di 18-21 giorni.

Utilizzare le dosi più alte e gli intervalli più corti nelle aree ad elevata pressione di infezione ed in particolare: su cercosporiosi intervenire in via preventiva (varietà sensibili) o alla comparsa delle prime macchie confluenti (varietà tolleranti); su Oidio intervenire in via preventiva o ai primi sintomi della malattia.

Grano (duro tenero) e orzo: contro Ruggine (*Puccinia* spp.) e Oidio (*Erysiphe graminis*) litri 0,6 - 1 per ettaro intervenendo alla

prima comparsa delle malattie o comunque nel periodo che va da inizio levata alla fioritura.

Il prodotto possiede effetto collaterale su Fusariosi della spiga quando applicato ad inizio fioritura.

Utilizzare le dosi più alte sulle varietà sensibili e in condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno.

Non effettuare più di 3 trattamenti all'anno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: SPHERE non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il formulato contiene sostanze attive molto tossiche per gli organismi acquatici e gli artropodi utili.

Adoperare ad una distanza non inferiore a 5 metri dai corpi idrici adiacenti ai campi trattati.

Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare indumenti protettivi e guanti adatti.

Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta per grano e orzo e 21 giorni per la barbabetola da zucchero.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare al riparo dal gelo.

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

BAYER S.p.A. - MILANO
Divisione Agraria



IMPRESA
CHEMIA S.P.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Bioglyf

Diserbante sistemico non selettivo e non residuale per il controllo delle malerbe in diverse colture e per il diserbo degli incolti
Liquido Solubile

Partita n.:

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Glicosato acido puro g 30 (= 360 g/l)

Colorimulanti a.b. a 100

ATTENZIONE:

MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del Rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme Precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Evitare la contaminazione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.



Contenuto netto: ml 100, 250; Litri 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100*, 200*

Officina di Produzione:

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Registrazione n. xxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Informazioni mediche:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche:

BIOGLYF è un erbicida di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni che infestano sia le colture arboree ed erbacee sia gli incolti. Viene assorbito per via fogliare e traslocato per via sistemica alle radici e negli organi sotterranei delle parentanti, che vengono devastati, determinando un progressivo appassimento seguito dal completo disseccamento degli organi aerei, nonché degli organi ipogei. E' preferibile impiegare BIOGLYF in prossimità della fioritura delle infestanti, quando cioè la linfa discendente facilita la distribuzione del prodotto nella porzione ipogea della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, quali siccità, freddo o attacchi parassitari, è inefficace. BIOGLYF è rapidamente disattivato nel terreno, quindi la presenza del prodotto nel terreno non causa danni alle colture. Non possedendo attività di pre-emergenza, onde ottenere un disetto duraturo è necessario prima e dopo il trattamento con BIOGLYF, intervenire con un erbicida ad azione persistente nel terreno (es.: Simazina o Diuron).

Dosi e modalità d'impiego:

BIOGLYF si distribuisce con volumi di acqua di 200-400 l/ha, utilizzando attrezzature a bassa pressione (1-3 atm) munite di ugelli schermati oppure a specchio o a ventaglio, nonché attrezzature selettive che distribuiscono il prodotto per contatto (a spazzolamento o di tipo urmettante-lambente). Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture, provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. ATTENZIONE: le piogge cadute entro 5 ore dal trattamento, il taglio, il pascolo o il danneggiamento della vegetazione infestante prima del trattamento, possono ridurre l'efficacia del prodotto.

BIOGLYF si impiega sulle seguenti colture di interesse agrario:

- Pomacee (melo, pero), Agrumi (arancio dolce ed amaro, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, chinotto, limetta, kumquat), Dru-pacee (pesco, nectarine, percoche, albicocco, ciliegio dolce ed acido, susino), Mandorlo, Olivo, Noce, Vite
- Il trattamento può essere eseguito a pieno campo o localizzato nell'interfilare o sotto la chioma, in quest'ultimo caso la dose va rapportata alla superficie realmente trattata.

- Carciofo, Fava, Pisello, Fagiolo, Pomodoro, Melanzana, Carota, Asparago (prima dell'emergenza dei turioni o alla fine del raccolto), Patata, Mais (solo nell'interfilare; da non impiegare in pre-raccolta), Soia, Medica, Prati (leguminose e graminacee), Bietola da zucchero, Rosa, Vivali e sementi di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Il trattamento deve essere effettuato solo con attrezzature selettive.

Il formulato si impiega inoltre su:

Terreni in attesa della coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, bietola da zucchero, soia, mais, frumento, orzo, segale, avena, riso, ortaggi, prati, vivali.

Area non destinate alle colture agrarie, quali sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scolline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

*Avvertenze limitate alle taglie da litri 100 e 200:

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da litri 100 o 200 deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali di prodotto. Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo

INFESTANTI ANNUALI E BIENNIALI:

Veronica (*Veronica* sp.), Centocchio (*Stellaria media*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Riso crodo, Ravanella selvatica (*Raphanus raphanistrum*), Erba porcellana (*Portulaca oleraceae*), Orbanche (*Orobancha* sp.), Marcorella (*Mercutalis annua*), Loglio (*Galium* sp.), Chenopodio (*Chenopodium* sp.), Cappuccino dei campi (*Celestina arvensis*), Avena (*Avena* sp.), Amaranto (*Amaranthus* sp.), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Fianorola (*Poa* sp.), Vigna maggiore (*Ammi majus*).....3-5 l/ha

INFESTANTI PERENNANTI:

Gramigna (*Agropyron repens*), Carice (*Carex* sp.), Stoppione (*Cirsium* sp.) - in fioritura - Euforbia (*Euphorbia* sp.), Gliceria (*Glyceria* sp.), perico (*Hypericum* sp.), Lersia (*Laseria oryzoides*), Falanide (*Phalaris* sp.), Romice (*Rumex* sp.), Crespino (*Sonchus* sp.), Sorghetto (*Sorghum halepense*)
Piantaggine d'acqua (*Alisma plantago-aquatica*), Asfodelo (*Asphodelus ramosus*), Giunco fiorito (*Butomus umbellatus*), Cipero (*Cyperus* sp.), Ferula (*Ferula* sp.), Giunco (*Juncus* sp.), Erba cervina (*Nardus stricta*), Quardone (*Scirpus mucronatus*), Sparganio (*Sparganium* sp.), Farfara (*Tussilago farfara*).....8-10 l/ha
Per ottenere un migliore controllo del Cipro rotondo (*Cyperus rotundus*) si consiglia un secondo trattamento sulle piante originarie da bulbi dormienti, alla dose di 5-7 l/ha.

Agrostide (*Agrostis* sp.), Aglio delle vigne (*Allium vineale*), Assenzio selvatico (*Artemisia* sp.), Canina (*Arundo donax*), Gramigna comune (*Cynodon dactylon*), Panace (*Heracleum* sp.), Edera terrestre (*Glechoma* sp.), Accetosa (*Oxalis* sp.), Gramigna d'acqua (*Paspalum* sp.), Cannuccia (*Phragmites* sp.), Ranuncoli (*Ranunculus* sp.), Mazza sorda (*Typha latifolia*), Ortiche (*Urtica* sp.).....8-10 l/ha
Aristocchia (*Aristocchia comune*), Vitalba (*Clematis vitalba*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*) e Vilucchio maggiore (*Convolvulus sepium*).....10-12 l/ha

INFESTANTI ARBUSTIVE:

Acer (*Acer* sp.), Frassino (*Fraxinus* sp.), Ginestre (*Genista* sp.), Salice (*Salix* sp.), Sambuco (*Sambucus* sp.), Mirtillo (*Vaccinium myrtillus*)
Greccia (*Calluna vulgaris*), Cisto (*Cystus* sp.), Erica (*Erica* sp.), Caprifoglio (*Lonicera* sp.), Robbia (*Rubia* sp.).....5-7 l/ha
10 l/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto si usa da solo.

Fitosicilia: il prodotto non è selettivo. Il prodotto può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi della pianta o sulla corteccia non ben lignificata della specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

Avvertenza: non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es.: zinco) o in acciaio se non protetti da vernici plastiche, perché il prodotto può corrodere.

Attenzione: da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SNALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Meter WG

Diserbante selettivo per le colture di patata, pomodoro, soia, asparago ed erba medica

GRANDI PRODOTTI

Partita n.°

ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Mefluthrin puro g 35

Coformulanti q.b. a 100

Natura del Rischio :

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme Precauzionali :

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;

Conservare la confezione ben chiusa;

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;

Non operare contro vento;

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

Informazioni per il medico

Sintomi :

organi interessati : occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.

Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo : dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia : Sintomatica

Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

Meter WG è un diserbante selettivo che controlla infestanti mono e dicotiledoni annuali applicabile in pre e post-emergenza delle infestanti. Agisce sia per assorbimento fogliare sia sui semi in fase di germinazione e sulle piantule.

Le infestanti controllate sono le seguenti :

MONOCOTILEDONI ANNUALI

Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Fienarola comune (*Poa annua*), Loglio (*Lolium spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*)

DICOTILEDONI ANNUALI :

Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Anagallis (*Anagallis arvensis*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Canapa (*Galeopsis spp.*), Centocchio (*Stellaria media*), Cicorbia (*Sonchus oleraceus*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba stoma (*Thlaspi arvense*), Euforbia (*Euphorbia spp.*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Gallinsoia (*Gallinsoga parviflora*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Poligoni (*Polygonum spp.*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*)

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

PATATA :

a) TRATTAMENTO IN PRE-EMERGENZA 0,7-1 kg/ha in 500-700 litri d'acqua, impiegando la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti, escludendo i terreni sabbiosi.

b) TRATTAMENTO IN POST-EMERGENZA 0,4-0,5 kg/ha in 500-700 litri d'acqua, riservando la dose maggiore ai terreni pesanti.

Il prodotto si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkumaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintja, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtena, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.

POMODORO :

a) TRATTAMENTO IN PRE-SEMINA 0,4-0,6 kg/ha in 500-700 litri d'acqua, intervenendo 7-14 giorni prima della semina sul terreno già preparato senza interrare

b) TRATTAMENTI DI POST-EMERGENZA E POST-TRAPIANTO 0,5-1 kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni pesanti e intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono aver differenziato almeno 8-9 foglie (pre-floritura).

SOIA :

TRATTAMENTI IN PRE-SEMINA / PRE-EMERGENZA 0,5-0,7 kg/ha evitando di trattare in terreni molto leggeri o torbosi.

ASPARAGO :

TRATTAMENTI IN PRE-EMERGENZA 1-1,5 kg/ha con 500 litri di soluzione, in asparagiale di almeno 2 anni.

ERBA MEDICA :

Terreni leggeri 1 kg/ha
Terreni di medio impasto, pesanti e molto pesanti 1,5 kg/ha
con 500-700 litri d'acqua intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito della prima brinata.

Avvertenza generale : eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere le

colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Per alcune colture (medica) il prodotto può essere miscelato solamente con alcuni altri diserbanti a reazione neutra per aumentare il campo di azione contro le infestanti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere riservato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto leggeri; non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi : a) qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura; b) nei cosiddetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento dell'emergenza delle piantine. Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto su pomodoro, attenersi alle seguenti norme : a) in caso di necessità di irrigazione al momento del diserbo eseguirlo almeno 6-7 giorni prima del trattamento diserbante; b) non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua); c) le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5-10 giorni prima del trattamento. Per quanto riguarda la patata, non effettuare il trattamento su Draga, Jaria e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.

Sospendere i trattamenti : 30 giorni prima del raccolto per pomodoro e 60 giorni prima della raccolta per le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nella epiche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Contenuto netto : g 500 kg 1 - 5 - 10

DA NON VENDERSI SFUSO



Officina di Produzione :
Schirm AG Division Sideco - Luebeck, Mecklenburger STR, 229 (D)
S.T.I. - Solitecnica Italiana S.p.A., Via Torricelli, 2 - Colligola (RA)
Officina di Confezionamento :
S.T.I. - Solitecnica Italiana S.p.A., Via Plan d'Asso - Torrenieri (SI)
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Piritre

Insetticida
CONCENTRATO EMULSIONABILE



Partita: *

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Clorpirifos metile puro..... g 22 (= 217,8 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

Frase di Rischio:

Irritante per gli occhi

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non respirare i vapori; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; In caso di contatto con gli occhi lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone; Consultare il medico; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone; Proteggersi gli occhi; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)



Stabilimento di Produzione:

Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Torrenieri (SI)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 50 - 100

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali: Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

COMPATIBILITÀ

Piritre non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

- Nocivo per i pesci
- Nocivo per api ed insetti utili
- Tossico per i crostacei

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO


SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"ATTENZIONE: PER LE MODALITÀ D'IMPIEGO CONSULTARE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO NELLA CONFEZIONE"

Pirite

Insetticida
CONCENTRATO EMULSIONABILE



Partita: *

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Clorpirifos metile puro g 22 (= 217,8 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio:

Irritante per gli occhi

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non respirare i vapori

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

In caso di contatto con gli occhi lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone

Protegersi gli occhi

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)



Chemia

spa
44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Stabilimento di Produzione:

Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Torrenieri (SI)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 750
1 l - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;

Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscolari (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (costante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

Il Pirite è un insetticida fosfororganico, agisce per contatto, ingestione ed in parte per azione di vapore. È particolarmente indicato per combattere le larve di lepidotteri e le neanidi di cocciniglie. Esplica inoltre azione frenante dello sviluppo delle popolazioni di acari tetranychidi come Panonychus, Tetranychus, Eotetranychus.

DOSI D'IMPIEGO

- **Melo, Pero e Pesco:** 200 ml/litro contro Lepidotteri, Tortricidi (Capua, Cacoecia, Pandemis, Euilia), Tignola orientale (Cydia molesta), Anarsia (Anarsia); 200 - 250 ml/litro contro neanidi di Cocciniglie (Aspidiotus ed altre).
- **Arancio:** 250 ml/litro contro neanidi di Cocciniglie (Saissetia, Ceroplastes, Pseudococcus).
- **Vite:** 100 - 150 ml/litro contro Tignole (Polycrosis, Glysia). Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili: si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.
- **Fragola:** 300 - 400 ml/litro contro Frankliniella o Notte ed Afidi.
- **Ortaggi (pomodoro, peperone, melanzana, pisello, ravanello, patata):** 1,5 - 2 litri contro Notte (Agrotis, Mamestra ed altre), Macaone (Papilio), Dorifera (Leptinotarsa).
- **Mais:** 300 ml/litro contro Notte (Agrotis), Piramide (Ostrinia) ed Elateridi.
- **Pioppo:** 400 - 500 ml/litro contro Saperda e Criptorinco.
- **Ornamentali (garofano, crisantemo, azalea, ciclamino):** 200 ml/litro contro Baga, Tortricidi, Cocciniglie, Oziornico.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Pirite non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Galla Beauty.

In post-foritura del melo non eseguire più di due trattamenti. Non effettuare trattamenti su arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

NOCIVITÀ

- Nocivo per i pesci
- Nocivo per api ed insetti utili
- Tossico per i crostacei

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA / FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

PROXAN SL è indicato per la difesa delle seguenti colture :
 pomodoro, peperone, melanzana, coconero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, insalate (lattuga, cicoria, indivia, radicchio), spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cavolfiore, cavoli, carota, rapa, bietola rossa, aglio, cipolla, porro, tabacco, fragola, colture floreali e ornamentali, campi da golf e prati ornamentali in genere.

Può essere altresì utilizzato per asfoni di melo, pero, agrumi e piante forestali sia in vivo sia nei primi anni, dopo la messa a dimora in campo, nei confronti di *Pythium* e *Phytophthora cactorum*, *P. citrophthora*, *P. parasitica* e *P. cinnamomi*.

Risulta indicato anche per la concia semi in genere.

- CONCIA DEI SEMI :
 - semi di piccole dimensioni (es.: tabacco, frumento) 1-4 ml/kg
 - semi leggeri e dotati di elevata superficie (es.: girasole) 10-40 ml/kg
- PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI : 300 ml/m² di terriccio diluiti in 20 litri di acqua
- TRATTAMENTI AI SEMINZI : 8 - 12 ml/m² di superficie in 4 - 5 litri di acqua (ripetere il trattamento 5 giorni prima del trapianto in 6 - 8 litri di acqua)
- TRATTAMENTI AL TERRENO :
 - in pre-trapianto : 8 - 12 ml/m² in 3 - 5 litri di acqua
 - in post-trapianto : 100 - 200 ml/pianta in una soluzione al 2% (200 ml/hl) : ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni (3-4 trattamenti)
- TRATTAMENTI FOGLIARI : 1,5 - 3 l/ha
 in 15-20 hl di acqua per ettaro

Indicazioni specifiche per alcune colture floreali ed ornamentali :
 - **Garofano e Gerbera** : contro *Pythium sp.* e *Phytophthora sp.* :
 a) trattamenti iniziali : 12 - 15 ml/m²
 in 2 - 4 litri d'acqua due giorni prima dell'impianto, su terreno in tempera, ed incorporare uniformemente
 b) trattamenti successivi : 200 ml/ha per via fogliare irrorando abbondantemente (400-500 litri di soluzione ogni 1000 m²). Si consiglia di effettuare i primi due trattamenti a distanza di 8-10 giorni e proseguire con interventi ogni 15 - 25 giorni.

- **Bulbose** : contro *Pythium ultimum* e *Phytophthora*
 immergere i bulbi per 20 - 30 minuti in una soluzione di 300 ml/ha di acqua. Trattare quindi il terreno prima della messa a dimora con 10 - 12 ml/m² in 2 - 4 litri di acqua ed incorporare a 10 - 12 cm di profondità.

PROXAN SL

Fungicida sistemico indicato per la protezione delle colture orticole, floreali e vivaiistiche
 LIQUIDO SOLUBILE

Partita n.°

ATTENZIONE:
 MANIPOLARE
 CON PRUDENZA

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:
 Propamocarb cloridrato puro g 66,5 (=722 g/l)
 Coformulanti q.b. a 100

Natura del Rischio :

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme Precauzionali :

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
 Conservare la confezione ben chiusa.
 Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
 Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
 Non operare contro vento;
 Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
 Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

INFORMAZIONI MEDICHE :

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

PROXAN SL è un fungicida sistemico attivo nei confronti di crittogame quali *Pythium*, *Phytophthora*, *Plasmopara*, *Pseudoperonospora*, *Aphanomyces*, *Bremia*, che attaccano le radici, il colletto e la porzione aerea di numerose colture orticole, floreali ed ornamentali, in particolare nelle zone ove si pratica la coltura intensiva. Viene assorbito prevalentemente attraverso l'apparato radicale e traslocato alla parte aerea attraverso il flusso traspiratorio, in modo da assicurare una completa protezione alla pianta.

Dalle le sue caratteristiche di sistemicità, si presta alle più disparate modalità di applicazione :

- concia delle sementi
- immersione di bulbi e talee
- disinfezione dei terricciati e letti di semina
- trattamento al terreno in pre e post trapianto delle colture
- trattamenti fogliari.

Considerando la natura dei patogeni che combatte, i migliori risultati si ottengono comunque con gli interventi preventivi.

- VIVAI DI PIANTE FORESTALI : contro *Phytophthora cactorum*, *Phytophthora cinnamomi* e *Pythium*.

Trattare il substrato colturale con 300 ml/m² in 8 - 10 litri di acqua; intervenire all'emergenza ogni 15 - 18 giorni con 4 - 5 litri di una soluzione allo 0,2 %.

- CAMPI DA GOLF E PRATI ORNAMENTALI : per il controllo di *Pythium aphanidermatum* ed eventuali altre specie, intervenire con trattamenti fogliari alla dose di 1 - 1,5 ml/m² di prodotto formulato, avendo cura di irrorare con almeno 100-200 litri di soluzione per 1000 m². Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo della malattia (caldo umido, con U.R. superiore al 70 - 80%) e, soprattutto nel periodo critico, ripetere i trattamenti ogni 14-15 giorni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i fungicidi benzimidazolici, con TM/TD, Clorotaloni, prodotti rameici e Mancozeb.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA: I semi trattati e residui dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.

Per la distribuzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Contenuto netto : ml 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500
 11 - 5 - 10

DA NON VENDERSI SFUSO



Officina di Produzione :

Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)
 S.T.I. - Solitecnica Italiana S.p.A., Via Pian d'Asso, Torrenieri (SI)
 Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xxx/xxxxx

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPOSTO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

PROXAN SL

Fungicida sistemico indicato per la protezione delle colture orticole, floricole e vivaistiche
LIQUIDO SOLUBILE

Partita n.°

ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:
Propamocarb cloridrato puro g 58,5 (= 722 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Natura del Rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme Precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;

Non operare contro vento;

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i fungicidi benzimidazolici, con TMTD, Clorotalonil, prodotti rameici e Mancozeb.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA: I semi trattati e residui dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.

Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Contenuto netto : ml 10 - 20 - 50 - 100

DA NON VENDERSI SFUSO



Officina di Produzione:

Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

S.T.I. - Sofitecnica Italiana S.p.A., Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

"ATTENZIONE: PER LE MODALITÀ D'IMPIEGO CONSULTARE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO NELLA CONFEZIONE"

IMPRESA
CHIMAC-AGRIPHAR S.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tappeti erbosi di graminacee (campi da golf e campi da calcio): contro *Coritium luciforme* (fill rouge), *Fusarium spp.* e *Typhula spp.* impiegare alla dose di 10 l/ha; contro *Helminthosporium*, *Sclerotinia homoeocarpa* (dollar spot) e *Rhizoctonia* alla dose di 5-6 l/ha.

Avvertenza: Non accedere nell'area trattata prima di 12 ore dall'irrorazione e comunque fino a che la vegetazione non sia completamente asciutta.

TRATTAMENTI DI POST-RACCOLTA

I trattamenti di seguito dettagliati andranno effettuati in ambienti appositamente attrezzati per operazioni meccaniche che escludano l'intervento diretto dell'operatore. L'eventuale soluzione eccedente ai trattamenti andrà prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).

POMACEE (Mele e Pere): contro *Alternaria*, *Botrytis* e *Penicillium*, effettuare un trattamento ai frutti per aspersione o per immersione diluendo 100-150 ml di prodotto in 100 litri d'acqua;

LIMONI: contro *Alternaria*, immergere o aspergere i frutti in una sospensione formata da 100-150 ml di prodotto in 100 litri d'acqua.

CONCIA DI BULBULE, SEMENTI

RISO: contro *Elminthosporiosi* effettuare il trattamento impiegando 150-200 ml per 100 kg di seme.

FRUMENTO, ORZO, CEREALI MINORI (esclusi mais e sorgo): contro la carie effettuare il trattamento con 150-200 ml di prodotto ogni 100 kg di seme.

PATATA: contro *Rhizoctonia* immergere i tuberi in una sospensione acquosa di prodotto allo 0,75% per 5 minuti prima della semina.

AGLIO: contro il Mal dello Sclerozio impolverare con 300 ml di prodotto per q.le di bulbilli.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro *Phoma* impiegare 280-300 ml per q.le di semi.

Avvertenza: Il materiale conciato e residuo dalla semina non deve essere destinato all'alimentazione umana o del bestiame.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

IPPON 500 SC non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri). **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI IN CAMPO 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER ACTINIDIA; 21 GIORNI PER PERO, FRAGOLA, LATTUGA, INDIVIA, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO RAPA, SOLANACEE; 28 GIORNI PER VITE E RISO; 40 GIORNI PER DRUPACEE; 45 GIORNI PER COLZA.

NEI TRATTAMENTI POST RACCOLTA FAR TRASCORRERE ALMENO 10 GIORNI FRA IL TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE AL CONSUMO DELLE POMACEE ED ALMENO 30 GIORNI PER I LIMONI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Titolare dell'autorizzazione: CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - 26, Rue de Renory - Ougrée (Belgio)

Officina di produzione: CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - 26, Rue de Renory - Ougrée (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n.

Contenuto netto: ml 100 - 250 - 500 - 1 l - 5 - 10

Partita n.

IPPON 500 SC

FUNGICIDA ORGANICO POLIVALENTE
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

- IPRODIONE puro g 42,4 (=500 g/l)
- Coformulanti, q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antivenali

CARATTERISTICHE

IPPON 500 SC è un fungicida organico che esplica la sua azione prevalentemente per contatto sia contro le spore che contro il micelio di diversi funghi patogeni che attaccano colture in campo o immagazzinate, bulbi, tuberi, semi, tappeti erbosi di graminacee.

Preparazione della miscela: diluire la prevista dose di prodotto in poca acqua, quindi aggiungere la rimanente quantità d'acqua fino a portarla al volume desiderato.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

VITE: contro *Botrytis* impiegare 150 ml/ml d'acqua, trattando alla sfioritura, alla pre-chiusura dei grappoli, all'inizio dell'invaiatura e 20 giorni dopo.

Il trattamento non ostacola la fermentazione del mosto e le caratteristiche organolettiche dei vini; per varietà di vite molto sensibile agli attacchi di *Botrytis* del peduncolo, fare anche un trattamento in pre-fioritura.

DRUPACEE (Pescio, Albicocco, Ciliegio, Mandorlo, Susino): contro *Monilia* impiegare 150 ml/ml d'acqua, ripetendo 2-3 volte il trattamento ad inizio caduta petali e su frutti sviluppati.

PERO: contro *Alternaria* impiegare 150 ml/ml d'acqua iniziando i trattamenti alla caduta dei petali e continuando ogni 15 giorni. Non impiegare su varietà Decana del Cornice.

ACTINIDIA: contro *Botrytis* e *Sclerotinia* impiegare 80-100 ml/ml d'acqua (non meno di 1,5 l/ha) ad inizio fioritura, in piena fioritura, alla caduta dei petali, all'ingrossamento dei fruttifici e 2-3 settimane prima della raccolta.

FRAGOLA: contro *Botrytis* impiegare 100-150 ml/ml d'acqua (non meno di 1,5-2 l/ha), intervenire all'inizio della fioritura e ripetere il trattamento ogni 8-10 gg. secondo l'andamento stagionale.

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA: contro *Botrytis* ed *Alternaria* impiegare 100-150 ml/ml d'acqua con trattamenti fogliari ripetuti, a partire dalla fioritura.

LATTUGA: contro *Botrytis* impiegare alla dose di 100-150 ml/ml (1,5-2 l/ha) a partire dal trapianto e ripetuti secondo necessità.

INDIVIA: contro *Sclerotinia*, effettuare un trattamento al terreno alla dose di 6-8 ml/m².

CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO RAPA: contro *Alternaria* impiegare alla dose di 100-150 ml/ml d'acqua.

COLZA: contro *Alternaria* e *Sclerotinia* impiegare alla dose di 1 l/ha, effettuando 1-2 trattamenti durante la fioritura con un intervallo di 15 gg tra un trattamento e l'altro.

RISO: contro *Sclerotiosi*, *Elminthosporiosi*, *Rhizoctonia*, trattare precocemente alla dose di 0,8-1 l/ha.

GAROFANO: contro *Alternaria* impiegare alla dose di 200 ml/ml d'acqua; contro *Rhizoctonia* effettuare trattamenti al terreno alla dose di 4 ml/m².

Altre colture floreali ed ornamentali (in pieno campo e in serra): contro *Botrytis* impiegare alla dose di 150 ml/ml, effettuando 2-3 trattamenti in funzione dell'andamento climatico e del conseguente sviluppo della malattia.

IMPRESA
CHIMIBERG S.R.L.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

CORONADO

Insetticida emulsionabile

COMPOSIZIONEMalation puro g 36,10 (361,7 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100**ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA****NATURA DEL RISCHIO**

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Conservare la confezione ben chiusa
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONECHIMBERG S.R.L.
Via Totale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)**OFFICINA DI PRODUZIONE**DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-50-100-250-500 litri 1-2-5-10**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO****PARTITA N.****INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi: colicose il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscolari (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miopia salivazione e sudorazione.
Bradicardia (neostigmina). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

CORONADO è un insetticida ad ampio spettro di azione che agisce per contatto ed ingestione.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

FRUTTIFERI (Agrumi - Pomacee - Drupacee - Fragola - Actinidia - Fruttiferi minori - Frutta a guscio) VITE - OLIVO: 200-250 ml/ha contro Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Mosca della frutta, Anthonomus, Tenebrione, Carpocapsa, Anarsia, Tignola orientale, Mosca del ciliegio, Tortricidi, Cimeci, Balanino, Tignola e Tignoletta della vite, Cicalina e larve di Lepidotteri in genere.
ORTAGGI (ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a foglia, solanacee, cucurbitacee, cavoli a infiorescenza, a testa, a foglia, cavoli-rapa, ortaggi a stelo, legumi): 250-300 ml/ha contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Notte fogliari, Pieridi, Altiche, Tenebrione, Depressaria, Cricotera.
COLZA, RAVIZZONE, GIRASOLE, COTONE, CANAPA: 1,8 - 2 l/ha contro Punteruolo, Altica dello stelo, Afidi.

PATATA: 250-300 ml/ha contro Afidi e tignola**CEREALI:** 2-2,5 l/ha contro Afidi**BARBIETOLA DA ZUCCHERO:** 1,8 - 2 l/ha contro Afidi e Notte fogliari**FORAGGERE LEGUMINOSE:** 1,5 l/ha contro Afidi, Apion, Fitonomo, Misurino**TABACCO:** 1,8 l/ha contro Afidi e Tripidi**FIORALI, ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI:** 250-300 ml/ha contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Cocciniglie, Cicaline, Tingidi.**PIOPIO:** 300-350 ml/ha contro Crisomela del pioipo, Cimicetta del pioipo**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI****COMPATIBILITA'**

Il prodotto non è miscelabile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Per le colture in serra si consiglia di eseguire saggi preliminari.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tre le 48 ore ed i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CORONADO Insetticida emulsionabile	
Composizione	
Malation puro	g 36,10
Coformulanti	q.b. a 100
ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA	
CHIMIBERG S.R.L. Via Tonale, 15 24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)	
OFFICINA DI PRODUZIONE DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG)	
Registrazione Ministero della Salute n. del	
Contenuto netto ml 10 - 50 - 100	
Partita n.	
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO	
AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO	

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfata (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: le Ossime (PAM, Comathioatoccc) che potrebbero essere nocive.

Consultare un Centro Antiveneni

MODALITA' DI IMPIEGO

IL MEDIFENE SC è un erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero, la bietola rossa e la barbabietola da foraggio, efficace su infestanti dicotiledoni, che agisce per assorbimento fogliare. Esplica la propria attività sino allo stadio compreso tra la 2ª e la 4ª foglia vera dell'infestante sulle seguenti specie dicotiledoni: *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore), *Chenopodium album* (Farnello), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Linaria minor* (Aniurmo minore), *Polygonum convolvulus* (Convolvero nero), *Senecio vulgaris* (Erba coiderna), *Sinapis arvensis* (Senape), *Stellaria media* (Centocchio), *Thlaspi arvense* (Erba storta), *Urtica urens* (Ortica piccola); risulta efficace sino allo stadio di 2 foglie vere su: *Datura stramonium* (Stramonio), *Lumaria officinalis* (Fumaria), *Papaver spp.* (Papavero), *Plantago major* (Piantaggine), *Rapianus raphanistrum* (Rafano), *Sonchus oleraceus* (Ciccorbita), *Spergula arvensis* (Spergola), *Veronica persicae* (Veronica).

IL MEDIFENE SC controlla inoltre, purché ancora allo stadio cotiledonare, le seguenti infestanti: *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Solanum nigrum* (Erba morella).

DOSI DI IMPIEGO

Eseguito il trattamento quando il maggior numero di infestanti è presente allo stadio di due foglie vere.

Impiegare la dose di 6-8 l/ha diluendo il prodotto in 300-400 litri di acqua, in giornate non ventose ed avendo cura di bagnare bene le infestanti.

Non eseguire il trattamento con temperature superiori ai 25°C ed in presenza di piante bagnate da rugiada o nell'imminenza di una pioggia.

Si consiglia di utilizzare il MEDIFENE SC su bietola danneggiata da insetti o comunque in cattivo stato vegetativo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

MEDIFENE SC

Erbicida selettivo per barbabietola da zucchero, bietola rossa e barbabietola da foraggio
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

Fenmedifam puro g 15,9 (= 160 g/l)
Emulsionanti e solventi q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA**NATURA DEL RISCHIO**

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Conservare la confezione ben chiusa

Non operare contro vento

Conservare sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici

Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

CHIMIBERG S.R.L.

via Tonale 15

ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA

CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8657 del 31.1.1995

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

IMPRESA
COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SPORAMIL R

Fungicida ad azione preventiva e curativa
in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

RAME METALLO g. 19,04 (= 259 g/l)
(sotto forma di Idrossido)
METALAXIL puro g. 3,6 (= 49 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per inalazione
e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
I usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di iniezione o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrarli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

C.Q. MASSO', S.A.

Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

COMMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A. - S. Pere Molanta - Barcellona (Spagna)

Registrazione Ministero della Salute del


QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100 - 250 - 500 - litri 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.



INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO g. 19,04 e METALAXIL g. 3,6 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC; emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroenterici, diarrea ematica, coliche addominali, turgore ematico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da malaria del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. METALAXIL: Sintomi: irritante quando ed oculare con possibili e opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esofagite, dispnea, spasmi muscolari. Torpore sinottica. Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

SPORAMIL R è una miscela fungicida ad azione preventiva e curativa. La presenza di metalaxil, dotato di attività sistemica, permette di proteggere la vegetazione agendo all'interno della pianta e di assicurare protezione anche sulla vegetazione sviluppatasi successivamente al trattamento. La componente rameica invece, protettiva sotto forma di idrossido, consente una protezione esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi.

DOSE E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro peronospora (Plasmopora viticola) alla dose di 400 ml/ha intervenire entro il 30% del periodo di insulazione dell'infezione primaria, proseguendo ad intervalli di 14 giorni fino ad allegazione. Ridurre l'intervento a 12 giorni in presenza di piogge persistenti o di elevata pressione della malattia.

POMODORO: 400 ml/ha contro Peronospora (Phytophthora infestans), alternanza (Alternaria porri sp. solani) e Batteriosi. Intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione, cadenzando i trattamenti a distanza di 10-14 giorni e per un massimo di 4 interventi.

PATATA contro peronospora (Phytophthora infestans) e alternaria (Alternaria porri sp. solani) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

FRAGOLA contro marciume bruno (Phytophthora cactorum) alla dose di 4 l/ha intervenendo dopo 15 e 30 giorni dall'impianto. Possibile immersione delle piante prima dell'impianto in una soluzione al 3 per mille.

COLTURE ORTICOLE (coconero, melone, cetriolo, carciofo, cavolo verza, fagiolo*, fagiolo*) contro peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora cubensis, Bremia lactucae), alternariasi (Alternaria spp.) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

N.B. * fagiolo e fagiolo: impiego consentito solo per trattamenti al terreno.

LATTUGA: contro peronospora (Bremia lactucae) alla dose di 2 - 3 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

SOIA: contro peronospora (Peronospora manshurica) e filofora (Phytophthora megasperma var. sojae) alla dose di 4 l/ha con 1-2 interventi a distanza di 10-14 giorni.

MELO: contro marciume del colletto (Phytophthora spp.) alla dose di 100-150 ml/pianta, dopo la ripresa vegetativa. Intervenire accuratamente la zona del colletto ed il terreno circostante. Ripetere eventualmente l'intervento 3-5 settimane dopo. In presenza di lesioni del tronco, spermellature con una soluzione al 20%.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZA: rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. Non applicare mai su vivai di vite.

COMPATIBILITÀ

Non è compatibile con i formulati a reazione alcalina quali polisolfuri, polifosfori, polifosfori, calce. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

non si deve trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITÀ

il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA

VITE: 28 giorni; FRAGOLA: 40 giorni; FAGIOLINO: 56 giorni; CAVOLO VERZA: 60 giorni;

FAGIOLINO: 120 giorni; SOIA: 150 giorni; ALTRE COLTURE: 20 giorni.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

**ETICHETTA FORMATO RIDOTTO****SPORAMIL R**Fungicida ad azione preventiva e curativa
in sospensione concentrata**COMPOSIZIONE**

RAME METALLO	g. 19,04 (= 259 g/l)
(sotto forma di Idrossido)	
METALAXIL puro	g. 3,6 (= 49 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100

**FRASI DI RISCHIO**

Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO g. 19,04 e METALAXIL g. 3,6 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. METALAXIL: Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esofalmo, dispnea, spasmi muscolari. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**C.Q. MASSO', S.A.**

Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. - S.Pere Molanta - Barcellona (Spagna)

Registrazione Ministero della Salute del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100 - 250 - 500 - litri 1 - 2-3-5 - 10 - 20**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO****PARTITA N.**

COMERCIAL QUÍMICA MASSÒ, S.A.

**FOGLIO ILLUSTRATIVO PER CONFEZIONI DI FORMATO RIDOTTO****SPORAMIL R****Fungicida ad azione preventiva e curativa
in sospensione concentrata****CARATTERISTICHE**

SPORAMIL R è una miscela fungicida ad azione preventiva e curativa. La presenza di metalaxil, dotato di attività sistemica, permette di proteggere la vegetazione agendo all'interno della pianta e di assicurare protezione anche sulla vegetazione sviluppata successivamente al trattamento. La componente rameica invece, presente sotto forma di idrossido, consente una protezione esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

VITE : contro peronospora (*Plasmopora viticola*) alla dose di 400 ml/hl intervenire entro il 30% del periodo di incubazione dell'infezione primaria, proseguendo ad intervalli di 14 giorni fino ad allegagione. Ridurre l'intervallo a 12 giorni in presenza di piogge persistenti o di elevata pressione della malattia.

POMODORO: 400 ml/hl contro *Peronospora* (*Phytophthora infestans*), *alternaria* (*Alternaria porri* sp. solani) e Batteriosi. Intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione, cadenzando i trattamenti a distanza di 10-14 giorni e per un massimo di 4 interventi.

PATATA contro peronospora (*Phytophthora infestans*) e *alternaria* (*Alternaria porri* sp. solani) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

FRAGOLA contro marciume bruno (*Phytophthora cactorum*) alla dose di 4 l/ha intervenendo dopo 15 e 30 giorni dall'impianto. Possibile immersione delle piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3 per mille.

COLTURE ORTICOLE (cocomero, melone, cetriolo, carciofo, cavolo verza, fagiolo*, fagiolino*) contro peronospora (*Peronospora* spp., *Pseudoperonospora cubensis*, *Bremia lactucae*), *alternariosi* (*Alternaria* spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

N.B. * fagiolo e fagiolino: impiego consentito solo per trattamenti al terreno.

LATTUGA: contro peronospora (*Bremia lactucae*) alla dose di 2 - 3 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

SOIA: contro peronospora (*Peronospora manshurica*) e fitoftora (*Phytophthora megasperma* var. *sojae*.) alla dose di 4 l/ha con 1-2 interventi a distanza di 10-14 giorni.

MELO: contro marciume del colletto (*Phytophthora* spp) alla dose di 100-150 ml/pianta, dopo la ripresa vegetativa. Irrorare accuratamente la zona del colletto ed il terreno circostante. Ripetere eventualmente l'intervento 3-5 settimane dopo. In presenza di lesioni del tronco, spennellature con una soluzione al 20%.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZA: rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. Non applicare mai su vivai di vite.

COMPATIBILITÀ

Non è compatibile con i formulati a reazione alcalina quali polisolfuri, poltiglia bordolese, calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA

VITE: 28 giorni; **FRAGOLA**: 40 giorni; **FAGIOLINO**: 56 giorni; **CAVOLO VERZA**: 60 giorni; **FAGIOLO**: 120 giorni;

SOIA: 150 giorni; **ALTRE COLTURE**: 20 giorni.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**C.Q. MASSO', S.A.**

Viladomat 321, 5° - Barcellona (Spagna)

OFFICINA DI PRODUZIONE

-DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

-COMERCIAL QUÍMICA MASSÒ, S.A. - S.Pere Molanta - Barcellona (Spagna)

Registrazione Ministero della Salute del

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100 - 250 - 500 - litri 1 - 2-3-5 - 10 - 20**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

- PARTITA N.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**

IMPRESA
DIACHEM S.P.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO**CARATTERISTICHE**

DIEFFE 80 WG è uno zolfo realizzato in granuli idrodispersibili caratterizzati da una pronta e facile dispersibilità in acqua durante la preparazione della poltiglia. La finezza ed uniformità di lavorazione fanno sì che quando questa formulazione viene irrorata sulla vegetazione, le particelle di zolfo si dispongono le une accanto alle altre con regolarità, a guisa di film, senza lasciare spazi scoperti sulla vegetazione.

Per le particolari caratteristiche il DIEFFE 80 WG resiste bene al dilavamento ed ha, conseguentemente, un'ottima persistenza. Il DIEFFE 80 WG è usato contro l'oidio o mal bianco delle colture agrarie affette da tale fitopatia.

EPOCHE DI IMPIEGO

DIEFFE 80 WG si impiega in trattamenti preventivi o alla prima comparsa della crittogama ripetendo i trattamenti ad intervalli variabili in funzione dell'andamento stagionale e della intensità degli attacchi.

COLTURE E DOSI DI IMPIEGO

VITE: 200-400 g/ha in situazioni a bassa pressione di oidio, 400-800 g/ha in situazioni ad alta pressione. A parità di pressione della malattia, scegliere le dosi maggiori nel caso si adottino intervalli di trattamento più lunghi.

POMACEE: 300-500 g/ha in pre-floritura; 200-300 g/ha in trattamenti post-floritura.

DRUPACEE: 200-400 g/ha in pre e post-floritura; 400-600 g/ha nei trattamenti post-raccolta

AGRUMI: 200-400 g/ha intervenendo alla prima comparsa dei sintomi

OLIVO: 200-400 g/ha intervenendo alla prima comparsa dei sintomi

FRAGOLA: 250-300 g/ha intervenendo alla prima comparsa della malattia

NOCCIOLO: 300-500 g/ha intervenendo alla prima comparsa della malattia

ORTAGGI, PATATA: 200-500 g/ha effettuando le prime applicazioni non appena si manifestano i primi sintomi dell'infezione; le dosi più elevate dovranno essere impiegate nel periodo primaverile e nei momenti in cui gli attacchi del patogeno sono più virulenti

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: utilizzare 6-8 kg per ettaro di superficie effettuando il primo trattamento non appena appaiono i sintomi della malattia e ripetendo gli interventi ad intervalli di 15-20 giorni.

CEREALI: 6-8 kg per ettaro intervenendo quando l'oidio si manifesta sulle ultime foglie del culmo

GIRASOLE, SOIA, TABACCO: 4-6 kg/ha

VIVAI DI PIÙ: 200-400 g/ha

COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI: da g 150 a g 400 per 100 litri di acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

DIEFFE 80 WG è incompatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (poltiglia bordellese, polisolfuri, ecc.), con oli minerali, con Captano, DDVP, Dicothamide.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

Può arrecare danno alle seguenti colture di MELO: Black Ben Davis, Black Seaman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Seaman red, Winesap, IREB, Buona Luigia D'Avranhes, Confessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio, VITE: Sangiovese, CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 5 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e condizioni è essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI****DIEFFE 80 WG**

Zolfo in microgranuli idrodispersibili ad azione fungicida

COMPOSIZIONE

ZOLFO puro g 80
(essente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA**NATURA DEL RISCHIO**

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A.

via Tonale, 15

ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Sulphur Mills Limited

1904-1905 G.I.D.C. Panoli

Dist. Bharuch, Gujarat (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA

CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: g 100-250-500 kg 1-2,5-5-10-25

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consulti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveneni.

DIEFFE 80 WG

Zolfo in microgranuli idrodispersibili ad azione fungicida
Sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE

ZOLFO puro

(esente da Selenio)

Coformulanti

g 80

q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A.

via Tonale, 15

ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Sulphur Mills Limited

1904-1905 G.I.D.C. Panoli

Dist. Bharuch, Gujarat (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA

CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (n. 5 s. i. da g 200);
kg 1 (n. 4 s. i. da g 250)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consulti interventi di pronto soccorso. Consultare un Contro Antiveloni

CARATTERISTICHE

Il DIEFFE 80 WG è uno zolfo realizzato in granuli idrodispersibili caratterizzato da una pronta e facile dispersibilità in acqua durante la preparazione della poltiglia. La finezza ed uniformità di lavorazione fanno sì che quando questa formulazione viene irrorata sulla vegetazione, le particelle di zolfo si dispongono le une accanto alle altre con regolarità, a guisa di film, senza lasciare spazi scoperti sulla vegetazione.

Per le peculiari caratteristiche il DIEFFE 80 WG resiste bene al dilavamento ed ha, conseguentemente, un'ottima persistenza. Il DIEFFE 80 WG è usato contro l'oidio o mal bianco delle colture agrarie affette da tale fitopatia.

EPOCHE DI IMPIEGO

Il DIEFFE 80 WG si impiega in trattamenti preventivi o alla prima comparsa della ortogama ripetendo i trattamenti ad intervalli variabili in funzione dell'andamento stagionale e della intensità degli attacchi.

COLTURE E DOSI DI IMPIEGO

VITE: 200-400 g/hl in situazioni a bassa pressione di oidio; 400-800 g/hl in situazioni ad alta pressione. A parità di pressione della malattia, scegliere le dosi maggiori nel caso si adottino intervalli di trattamento più lunghi.

POMACEE: 300-500 g/hl in pre-fioritura; 200-300 g/hl in trattamenti post-fioritura.

DRUPACEE: 200-400 g/hl in pre e post-fioritura; 400-600 g/hl nei trattamenti post-raccolta.

AGRUMI: 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi. OLIVO: 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi. FRAGOLA: 250-500 g/hl intervenendo alla prima comparsa della malattia. NOCCIOLO: 300-500 g/hl intervenendo alla prima comparsa della malattia.

Il DIEFFE 80 WG si impiega in trattamenti preventivi o alla prima comparsa della malattia.

ORTAGGI, PATATA: 200-500 g/hl effettuando le prime applicazioni non appena si manifestano i primi sintomi dell'infezione, le dosi più elevate dovranno essere impiegate nel periodo primaverile e nei momenti in cui gli attacchi del patogeno sono più virulenti.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: utilizzare 6-8 kg per ettaro di superficie effettuando il primo trattamento non appena appaiono i sintomi della malattia e ripetendo gli interventi ad intervalli di 15-20 giorni.

CEREALI: 6-8 kg per ettaro intervenendo quando l'oidio si manifesta sulle ultime foglie del culmo.

GRASOLE, SOIA, TABACCO: 4-6 kg/ha. VIVAI DI PIOPIO: 200-400 g/hl.

COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI: da g 150 a g 400 per 100 litri di acqua. AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il DIEFFE 80 WG è incompatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (poltiglia bordellese, polisolfuri, ecc.), con oli minerali, con Caplano, DIOVP, Picotolquande.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione/computa.


FITOTOSSICITA' Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli oli minerali e del Caplano. Può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELIO: Black Ben Davis, Black Starman, Colville bianca, Comodoro, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman red, Winesap, PERE: Buona Lunga, D'Aranches, Contessa di Parigi, Kaiser, Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio, VITIS: Sangiovese, CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 5 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione
contiene sacchetti
idrosolubili.




1
Riempi l'atomizzatore
con circa il 30% di acqua.



2
Porre i sacchetti
idrosolubili direttamente
nell'atomizzatore e quindi
azionare l'agitatore.



3
Attendere sino a quando i
sacchetti idrosolubili
non si siano completamente
sciolti (alcuni minuti).



4
Aggiungere la restante
acqua nell'atomizzatore.

DIEFFE 80 WG
ZOLFO IN MICROGRANULI DRODISPERSIBILI AD AZIONE FUNGICIDA
SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

Zolfo puro g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
SCIogliere in acqua senza rompere

PESO NETTO : g 200 – g 250

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA
RIPORTATO SUL CONTENITORE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DIEFFE 80 WG	
Zolfo in microgranuli idrodispersibili ad azione fungicida	
Composizione	
Zolfo puro	g 80
(esente da Selenio)	
Coformulanti	q.b. a 100
ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA	
NATURA DEL RISCHIO	
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle	
DIACHEM S.P.A.	
Via Tonale, 15	
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)	
OFFICINA DI PRODUZIONE	
SULPHUR MILLS LIMITED	
Dist. Bharuc, Gujarat (India)	
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO	
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA	
CARAVAGGIO (BG)	
Registrazione Ministero della Salute n.	del
Contenuto netto g 100	
Partita n.	
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO	
AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO	

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi, colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche. Le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi insensibili (di prima comparsa): nausea, vomito, erupcia addominale, diarrea. Broncospasmo, ipersensibilità bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miopia, salivazione e sudorazione. Bradicardia (insensibile), sintomi neonatali (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, tinnito, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esseri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccide, in seguito spastiche, delle estmità) (terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la profilassi). Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

VAFOR DIM è un insetticida dotato di efficacia contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie. VAFOR DIM ha un potere abbatteente ed una azione citotopica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste.

AGRICOLI: contro Mosca della frutta, Afidi, Tignole, Acaro delle miraviglie, Cocciniglie (studio di neanidi), alla dose di 100-125 ml/ha
MELIO, PERO: contro Afidi, Psilla, Tentredine, Tignole, Zeuzera, Cocciniglie (studio di neanidi) alla dose di 100-150 ml/ha

PERICO, SUSINO: contro Afidi, Mosca (all'invasione), Tentredine, alla dose di 120 ml/ha

CILIEGIO, ALBICOCCO: contro Mosca alla dose di 50-70 ml/ha (all'invasione);

OLIVO: contro Mosca delle olive, Tignola, Lioripide alla dose di 75-150 ml/ha

VITE: contro Cicaline, Tripide, Ragno giallo alla dose di 100 ml/ha

NOCE: contro Carpocapsa alla dose di 100 ml/ha

FRAGOLA: contro Afidi, Aleurodidi alla dose di 150 ml/ha

COLTURE ORTICOLE: contro Afidi, Aleurodidi, Mosca, Depressaria, Nottua, Cricca, Sminutide, Tortrici in genere, alla dose di 100-125 ml/ha

PATATA: contro Afidi alla dose di 75-100 ml/ha

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Afidi e Mosca minatrice alla dose di 1 litro/ettaro;

FRUMENTO, ORZO, MAIS, RISO, GIRASOLE: contro Afidi alla dose di 0.8-1 l/ha,

ERBA MEDICA, TRIFOLIO: contro Afidi alla dose di 80-100 ml/ha;

TABACCO: contro Afidi alla dose di 80-100 ml/ha;

FLORALI, ORNAMENTALI, FORESTALI, PIOPPO: contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Cicaline, Tignole, Cimecia, Siricidina, Mosca, alla dose di 75-150 ml/ha

Per la preparazione dell'emulsione basta versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto in tutto il quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

VAFOR DIM è compatibile con tutti i fungicidi comunemente usati ad eccezione della poliglia bordellese, bergognona e polisolfuro di calcio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Si sconsiglia l'impiego del prodotto su cedro, arancio amaro, limoncello interdonato, crisantemo, e su varietà di olivo quali: Coratina, Canino, Frantoio, Simona, Vernina, Marsella, Itrani, Rossina.

RISCHI DI NOCIVITA'

A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

VAFOR DIM

Insetticida a base di Dimetoato
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE

DIMETOATO puro g. 38 (= 395,2 g/l)

Cofarmulanti q.b. a g. 100

Contiene Xilene e Ciclosanone

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Infiammabile

Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non respirare i vapori

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Non distarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone

Usare guanti adatti

In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A.

via Tonale 15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA:

IQV ITALIA S.R.L.

MILANO

OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

SCAM S.R.L. - MODENA

SCHIRM AG - DIVISION SIDEKO - LUBECCA (Germania)

SIPCAM S.P.A. - SALERNO S/LAMBRO (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 - 500 litri 1 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

VALREG**Erbicida selettivo in sospensione concentrata****COMPOSIZIONE**

Propizamide pura g 35,5 (400 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti e mangimi o da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.p.A.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

Distribuito da:

IQV ITALIA S.r.l.
MILANO

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto del preparato: ml 10-100-250-500 litri 1-2-3-5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, disturbi addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

VALREG è un erbicida selettivo in sospensione concentrata. Assorbito per via radicale, esplica azione antigerminale pur risultando efficace anche su infestanti emerse nei primi stadi di sviluppo. Il prodotto, per queste sue caratteristiche, richiede al momento del trattamento un sufficiente grado di umidità del terreno, in caso contrario viene consigliata un'irrigazione entro 2-3 giorni dall'intervento.

Irrigando per infiltrazione distribuire il prodotto prima della semina o del trapianto incorporandolo con una leggera lavorazione.

Risultano sensibili all'azione di VALREG le infestanti seguenti: Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Avena fava (Avena selvatica), Avena spica-venti (Agrostide annuale), Phalaris spp. (L'alalide), Poa spp. (Fienarola), Setaria spp. (Falso panico), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Lolium spp. (Loglio), Chenopodium album (Farinello), Cuscuta spp. (Cuscuta), Papaver rhoeas (Papavero), Dipsacus spp. (Ruchetta), Fallopia convolvulus (Poliogono convolvolo), Plantago spp. (Plantaggine), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Rumex spp. da seme (Rumice), Solanum nigrum (Erba morella), Stellaria media (Centocchio), Veronica spp. (Veronica), Urtica urens (Ortica minore).

Mostro invece media sensibilità le infestanti: Amaranthus retroflexus (Amaranto), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Polygonum lapathifolium (Poliogono nodoso), Echinochloa crus-galli (Giarvone comune).

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

L'attività di VALREG risulta massima nel periodo autunno-invernale dove mostra efficacia anche su infestanti già emerse, purché nelle prime fasi di sviluppo. Negli interventi primaverili-estivi risulta invece attivo solo su infestanti in fase di pre-emergenza.

Distribuire il prodotto in 600-800 litri di acqua per ettaro, sulle seguenti colture:

VITE: 2-4 litri/ha in autunno-inverno anche su terreno moltiplo. Evitare gli interventi primaverili-estivi.

MELO, PERO: 2-4 litri/ha in autunno-inverno (novembre-febbraio) in post-emergenza delle infestanti.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: per la lotta alla cuscuta intervenire su barbabietole di almeno 5-6 foglie vere e non oltre lo stadio di 9-10 foglie alla dose di 4-5 litri/ha.

LATTUGHE e simili: 3,5-4,5 l/ha in pre-semina / pre-trapianto con innaffiamento o post-semina / post-trapianto nei 15-20 giorni successivi.

ERBA MEDICA: in autunno-inverno su coltura in atto alla dose di 2,5-3,5 litri/ha.

Lotta alla cuscuta, entro febbraio o dopo il primo sfalcio alla dose di 4 litri/ha.

LEGUMINOSE FORAGGERE (trifoglio violetto, trifoglio ladino, sulla, lupinella): 2-2,5 litri/ha su coltura in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITA'**

Il prodotto deve essere impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per colture non riportate in etichetta. Su colture di barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni).

Si consiglia il rispetto degli intervalli di tempo sotto indicati tra l'epoca di trattamento e le successive semine delle seguenti colture:

2 mesi: mais, fragola, crocifere, sorgo

4 mesi: melanzana, lino, aglio, menta, cipolla, peperone, patata, spinacio, barbabietola da zucchero, pomodoro

6 mesi: cereali da granella e grammece foragere

Prima della semina di tali colture eseguire una profonda lavorazione interrando concimi organici.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole tra le 48 ore ed i tempi di carezza del formlato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carezza.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VALREG	
Erbicida selettivo in sospensione concentrata	
COMPOSIZIONE Propizamide puro g 35,5 (= 400 g/l) Coformulanti q.b. a g 100	 NOCIVO
DIACHEM S.P.A. via Tonale, 15 24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)	
Officina di produzione DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG)	
Registrazione Ministero della Salute del Contenuto netto ml 10 - 100 Partita n.	
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO	
AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO	

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

VADTOR

Erbicida selettivo in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONEMetribuzin puro g 35
Coformulanti q.b. a g. 100**ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA****NATURA DEL RISCHIO**

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Conservare la confezione ben chiusa
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONEDIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
ALBANO S. ALESSANDRO (BG)**DISTRIBUITO DA**IQV ITALIA S.R.L.
MILANO**OFFICINE DI PRODUZIONE**

SIDECO DR. SCHIRM GMBH

Mecklenburger Str. 229

LUBECCA (Germania)

SULPHUR MILLS LIMITED

1904-1905 G.I.D.C. Panoli

Dist. Bharuch, Gujarat (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA

CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100-250-500 - kg 1-5-10-20-25**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO****PARTITA N.****INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o

renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

E' un erbicida selettivo ad assorbimento radicale e fogliare utilizzato per il diserbo di patata, pomodoro, asparago, frumento, orzo, soia ed erba medica. Risulta efficace nei confronti delle seguenti infestanti graminacee: *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Apera spica-venti* (Agrostide annuale) *Lolium multiflorum* (Loretto), *Poa annua* (Fiancola comune) e dicotiledoni: *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Aragallis arvensis* (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore), *Centaurea cyanus* (Fiordaliso), *Chenopodium album* (Parietaceo), *Chenopodium* spp., *Fumaria officinalis* (Funaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Lamium purpureum* (Falsa ortica) *Melicaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercuriella), *Myagrum perfoliatum* (Migro) *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum* spp., *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica arvensis* (Veronica).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

PATATA: in pre-emergenza alla dose di 0,5-0,8 kg/ha, impiegando la dose più alta nei terreni argillosi, evitare l'applicazione nei terreni sabbiosi. In post-emergenza alla dose di 0,5-0,6 kg/ha. Risultato selettivo sulle seguenti varietà: *Admirandus*, *Alkanaria*, *Apollo*, *Arsy*, *Bea*, *Binje*, *Cardinal*, *Desiree*, *Favorita*, *Ilumalda*, *Kentabee*, *Majestic*, *Monalisa*, *Primura*, *Resj*, *Rosanna*, *Saxia*, *Sirtelma*, *Spunta*, *Tonda di Berlino*, *Vokal*. Se ne consiglia l'impiego su *Jaaga*, *Jarla*, *Vivax*.

POMODORO: 0,5-0,6 kg/ha intervenendo 7-14 giorni prima della semina o del trapianto su terreno preparato e senza interrare.

0,5-0,8 kg/ha in post-emergenza o post-trapianto con piante di pomodoro con almeno 8-9 foglie e comunque dopo il superamento della crisi di trapianto.

ASPARAGO: in pre-emergenza dei turioni alla dose di 1-1,2 kg/ha e su impianti di almeno 2 anni.

FRUMENTO E ORZO: 0,2 kg/ha dallo stadio di 2 foglie vere a fine accrescimento

SOIA: 0,5 - 0,7 kg/ha in pre-semina o pre-emergenza. Evitare l'impiego nei terreni più sabbiosi e turbosi.

ERBA MEDICA: 1-1,5 kg/ha in autunno/inverno e con coltura in pieno riposo vegetativo. Dose minore nei terreni sabbiosi.

AVVERTENZE D'USO

Impiegare il prodotto con 300-700 litri di acqua ad ettaro in pre-semina, pre-trapianto e pre-emergenza della coltura e con 300-400 litri ad ettaro in post-emergenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITA'**

Il prodotto è compatibile con erbicidi a reazione neutra. In particolare miscelate con 2,4D, MCPA, tralkoxydim, fenoxaprop-ethyl, tribenuron-metil, florasulfuron, fluroxypir, flusulfuron, consentono di ampliare lo spettro di efficacia del trattamento erbicida.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

PATATA, ASPARAGO, SOIA, ERBA MEDICA: 60 giorni.
POMODORO, FRUMENTO, ORZO: 30 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

VALTOR

Erbicida selettivo in granuli idrodispersibili - Sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE

Metribuzin 900 g 33
Coformulanti 400 g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Conservare la confezione ben chiusa
Non aprire contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.p.A.

Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (RG)

DISTRIBUITO DA:

IQV ITALIA S.R.L. - MILANO

OFFICINE DI PRODUZIONE

SCHIRM AG DIVISION SIECO

Macklenburger Str., 229

LUPFCCA (Germania)

SULPUR MILLS LIMITED

1904-1905 G.L.D.C. Panoli

Dist. Bharneh, Gujarat (India)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)


Registrazione Ministero della Salute n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO

g 500 (n. 5 sacchetti idrosolubili da g 100)
g 500 (n. 1 sacchetto idrosolubile da g 500)
kg 1 (n. 2 sacchetti idrosolubili da g 500)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO PARTITA N.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione
contiene sacchetti
idrosolubili.



1
Riempi l'atomizzatore
con circa il 30% di acqua.




2
Porre i sacchetti
idrosolubili direttamente
nell'atomizzatore e quindi
azionare l'agitatore.



3
Attendere sino a quando i
sacchetti idrosolubili
non si siano completamente
sciolti (alcuni minuti).



4
Aggiungere la restante
acqua nell'atomizzatore.



5
Aggiungere la restante
acqua nell'atomizzatore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni ottiche su base allergica (da semplici dermatiti enterotossiche a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubonerosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

E' un erbicida selettivo ad assorbimento radicale e fogliare utilizzato per il diserbo di patata, pomodoro, asparago, fiumento, orzo, soia ed erba medica. Risulta efficace nei confronti delle seguenti infestanti graminacee: Alopecurus myosuroides (Coda di voipe), Apera spica venti (Agerone annuale) Lolium multiflorum (Lietto), Poa annua (Fienarola comune) e dicotiledoni: Amaranthus retroflexus (Amaranto), Amaranthus arvensis (Aragallide), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Granaio), Chenopodium spp., Pumaria officinalis (Humaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Lamium purpureum (Falsa ortica), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercuria), Myragrum perfoliatum (Madrone), Papaver rhoeas (Papavero), Polygonum spp., Rappianus raphanistrum (Ravanella selvatica), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Stellaria media (Centocchio), Veronica arvensis (Veronica).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

PATATA: in pre-emergenza alla dose di 0,5-0,8 kg/ha impiegando la dose più alta nei terreni argillosi; evitare l'applicazione nei terreni sabbiosi. In post-emergenza alla dose di 0,5-0,6 kg/ha. Risulta selettivo sulle seguenti varietà: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Asy, Bea, Binje, Cardinal, Desiree, Favorita, Ilumalda, Kennebec, Majestic, Monalisa, Primavera, Resj, Rosanna, Saxa, Sirtina, Tonda di Berlino, Vokal. Se ne consiglia l'impiego su Draga, Jafra, Viva.

POMODORO: 0,5-0,6 kg/ha intervenendo 7-14 giorni prima della semina o del trapianto su terreno preparato e senza interfare - 0,5-0,8 kg/ha in post-emergenza o post-trapianto con piante di pomodoro con almeno 8-9 foglie e comunque dopo il superamento della crisi di trapianto.

ASPARAGO: in pre-emergenza dei turioni alla dose di 1-1,2 kg/ha e su impianti di almeno 2 anni.
FRUMENTO E ORZO: 0,2 kg/ha dallo stadio di 2 foglie vere a fine accrescimento - **SOIA:** 0,5 - 0,7 kg/ha in pre-semina o pre-emergenza. Evitare l'impiego nei terreni più sabbiosi e torbosi. **ERBA MEDICA:** 1-1,5 kg/ha in autunno/inverno e con coltura in pieno riposo vegetativo. Dose minore nei terreni sabbiosi.

AVVERTENZE D'USO: Impiegare il prodotto con 500-700 litri di acqua ad ettaro in pre-semina, pre-trapianto e pre-emergenza della coltura e con 300-400 litri ad ettaro in post-emergenza. Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. - Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. - Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' Il prodotto è compatibile con erbicidi a reazione neutra. In particolare miscela con 2,4D, MCPA, trialkoxydim, fenoxaprop-ethyl, tribenuron-methyl, rimsulfuron, fluorsulfuron, consentendo di ampliare lo spettro di efficacia del trattamento erbicida.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione coinvolta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: PATATA, ASPARAGO, SOIA, ERBA MEDICA: 60 giorni. POMODORO, FRUMENTO, ORZO: 30 giorni.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VALTOR Erbicida selettivo in granuli idrodispersibili	
Composizione Metribuzin puro g 35 Coformulanti q.b. a 100	
ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA	
NATURA DEL RISCHIO Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle	
NORME PRECAUZIONALI Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego Conservare la confezione ben chiusa Non operare contro vento Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.	
DIACHEM S.P.A. Via Tonale, 15 24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)	
DISTRIBUITO DA : IQV ITALIA S.R.L. - MILANO	
OFFICINE DI PRODUZIONE SCHIRM AG DIVISION SIBECO Mecklenburger Str. 229 LUBECCA (Germania) SULPHUR MILLS LIMITED 1904-1905 G.I.D.C. Panoji Dist. Bharuch, Gujarat (India)	
Registrazione Ministero della Salute n.	del
Contenuto netto g 100	
Partita n.	
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO	
AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO	

VALTOR
ERBICIDA SELETTIVO
GRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

Metribuzin puro g 35
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

PESO NETTO : g 100 - 500

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

DIACHEM S.P.A.

Via Tonale, 15

24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA
RIPORTATO SUL CONTENITORE

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente a personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3/8/1968 n. 1255.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscolari: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miopia, lacrimazione; selettoria e broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni ipertensive, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

VAMILO è un insetticida che si presenta in forma liquida prontamente dispersibile in acqua.

VAMILO agisce per contatto ed ingestione su larve ed adulti di insetti che attaccano numerose colture agrarie quali lepidotteri, emitteri, ornitteri, ditteri e coleotteri.

Per la limitata persistenza VAMILO può essere impiegato sino a 10 giorni prima della raccolta (14 giorni su lattuga).

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO

PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, MANDORLO: contro Afidi, Anarsia, Tignola orientale 200 ml/ha; contro Cocciniglie 180-200 ml/ha.

MELLO E PERO: contro Afide larnoso e verde; Litocolletole, Cernostoma, Carpocapsa e Ricamatrici 150-200 ml/ha.

VITE DA VINO: contro Tignole 150-200 ml/ha.

VITE DA TAVOLA: contro Tignole 150-200 ml/ha non superando comunque i 2 litri per ettaro di superficie e per un numero massimo di 2 applicazioni.

AGRUMI: contro Cocciniglie, Afidi 200 ml/ha.

OLIVO: contro Cocciniglie e Tignola 200 ml/ha.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Alica e Cleono 150-180 ml/ha.

TABACCO: contro Afidi, Tripidi, larve di Lepidotteri 150-180 ml/ha.

COLTURE ORTICOLE (cavoli, escluso cavolfiori e cavolo cappuccio, lattuga, cucurbitacee, fagiolo, pisello, solanacee) contro Afidi, Cavolaia, larve di Notturni, Aleurodidi, 150-200 ml/ha.

PIOPOPO: contro larve defogliatrici, Saperda, Crisomela del pioppo, Cincietta del pioppo 200 ml/ha.

COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI: contro Afidi, Cocciniglie, Cicadine, Cecidemia, larve defogliatrici, Coleotteri defogliatori, Malinche della gerbera, Tortrice del garofano, Tingidi 150-200 ml/ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni, 14 giorni su lattuga, 30 giorni su vite da tavola

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

VAMILO

Insetticida polivalente in forma liquida

COMPOSIZIONE
METOMIL puro g 15,6 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Contiene N-metil-2-pirrolidone

FRASI DI RISCHIO

Allergene tossico per ingestione

Tossico per inalazione

Irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non respirare i vapori

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico

Usare indumenti protettivi e guanti adatti

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.p.A.

Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA

IQV ITALIA S.R.L. - MILANO

OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

SIPCAM S.p.A. - SALERANO SUL LAMBRO (LO)

SCAM S.R.L. - MODENA

SCHIRM AG DIVISION SIECO - LUBECCA (Germania)

Registrazione Ministero della Salute n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

IMPRESA
DOM SEMENTI S.R.L.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Limacid

Lumachicida ad impiego floreale in appartamenti e giardini ornamentali per combattere l'infestazione di lumache e chioccioline.

Esca pronta all'uso

Partita n. :*

Composizione :

100 g di prodotto contengono

Metaldeide pura4,75

Coformulanti q.b. a 100

Contiene Denatonio Benzoato (repellente)

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Conservare la confezione ben chiusa. Conservare soltanto nel recipiente originale. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Informazioni per il medico

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica acuta: circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, iperemia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Limacid è un molluschicida pronto all'uso, sotto forma di esca granulare con speciali ingredienti particolarmente appetibili per gasteropodi (lumache, limacce e chioccioline) che danneggiano le piante floreali ed ornamentali sia in vaso, sia in piena terra.

Il prodotto agisce per ingestione e contatto; non è asportato dal vento, resiste alle innaffiature, e alle piogge.

MODALITÀ APPLICATIVE

Intervenire preventivamente o alla prima comparsa delle lumache, spargendo le esche nelle ore pomeridiane o serali e dopo un'eventuale pioggia o una buona irrigazione: infatti, i granuli dell'esca in presenza d'acqua o d'elevata umidità si gonfiano e si ammorbidiscono rendendosi così appetibili e facilmente ingeribili.

Le dosi consigliate sono di 4 - 5 g/m² di superficie, oppure trattamenti localizzati con mucchietti di esche di 4-5 grammi (circa un misurino dosatore) nella zona dove si nota l'infestazione.

EPOCA D'IMPIEGO

G F M A M G L A S O N D

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo

**DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE
COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE**

Attenzione : contiene una sostanza sgradevole all'uomo e agli animali domestici che rende il prodotto disgustoso in casi di ingestione accidentale.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Officine di Produzione :

— Industrialchimica srl — Via Lion, 9 — 35020 Maserà (PD)

— L.I.F.A. srl — Via Piave Z.I. Fossanigo — 36033 Isola Vicentina (VI)

Contenuto netto : g 100 — 200 — 500 — 1000

Prodotto per Piante Ornamentali

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

IMPRESA

DOW AGROSCIENCES B.V.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DIRIS NOVEL FLO* 480

**Diserbante di post-emergenza contro il giavone ed
altre infestanti della risaia**

Sospensione concentrata

**ATTENZIONE:
manipolare con prudenza**

Composizione:

PROPANIL puro.....41,4 % (480g/l)
Coformulanti q. b. a. g.....100

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patrolo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:

Dow AgroSciences B.V. - Mozzanica (Bergamo)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Taglie autorizzate:

20 - 25 - 50 litri

Registrazione n. del del Ministero della Salute
Partita n.

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Generalità: Diris Novel Flo 480 è un erbicida selettivo ad azione principalmente per contatto, ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti. Viene formulato in sospensione concentrata, da diluirsi successivamente in acqua per l'applicazione mediante irrorazione. Diris Novel Flo 480 viene impiegato nella lotta contro i giavoni (*Echinochloa crusgalli* e specie affini) e contro le ciperacee e le alismacee provenienti da seme comunque solo nei primi stadi del loro sviluppo. Il prodotto va applicato con le comuni pompe montate su trattore, diluito in quantità d'acqua sufficiente a consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere.

Epoca di intervento: è molto importante al fine di ottenere i migliori presupposti per una buona riuscita del diserbo, effettuare un buon livellamento del terreno e subito dopo la semina, tenere un livello d'acqua basso (cm 6-8 al massimo). Tutto ciò porterà ad avere una nascita contemporanea del giavone ed in percentuale elevatissima e quindi, come ultimo effetto, il duplice vantaggio di trattare il giavone tutto all'incirca nel medesimo stadio vegetativo e di ridurre od eliminare le nascite successive dell'infestante. Il giavone presenta la massima sensibilità a Diris Novel Flo 480, cioè viene distrutto con la dose più bassa (7,5 litri per ha) quando si trova nello stadio vegetativo compreso fra la 1a e la 3a foglia. Ciò non significa però che non si possa intervenire, naturalmente con dosi e modalità appropriate, anche quando il giavone è ancora più sviluppato, pure in fase di accostimento.

Modalità di applicazione: Diris Novel Flo 480 va diluito in un quantitativo di acqua variabile da 300 a 400 litri per ha. Nel caso di intervento su giavone molto sviluppato è consigliabile aumentare il quantitativo di acqua. La barra di distribuzione deve essere tenuta più bassa possibile, cioè a circa 50 cm da terra, irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutta la pianta di giavone, in modo da consentire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaina dell'infestante. La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta per la qual cosa è sufficiente, di norma, togliere l'acqua dalle camere 3-4 giorni prima del trattamento. Anche le piantine di giavone dovranno essere asciutte. Quindi, non si deve operare nelle ore di primo mattino o verso sera, quando la vegetazione è ricoperta di rugiada. Effettuato il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo per 6-8 giorni il più alto possibile, naturalmente in relazione allo sviluppo del riso. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello più basso ma tale da evitare nuove infestazioni di giavone. Evitare di trattare nel caso si preveda una pioggia a distanza di 6-8 ore.

Dosi di impiego:

- 1) Giavone con 1-2-3 foglie, ma in maggioranza con 2 foglie: 7,5 litri/ha
- 2) Giavone con 3-4 foglie: 10 litri/ha
- 3) Giavone dalla 4a foglia all'inizio dell'accostimento: 11,5-14 litri/ha.
- 4) Giavone in accostimento: 2 trattamenti con 10 litri/ha a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro sempre su risaia in asciutta.

In linea di massima il giavone si presenta nello stadio della 2a-3a foglia da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina. L'oscillazione è in rapporto alla temperatura, che tanto più è alta, quanto più abbrevia l'intervallo fra la semina e la comparsa della 3a foglia e viceversa.

Diris Novel Flo 480 è maggiormente efficace quando le infestanti sono in rapido accostimento. Quando il giavone cresce con un andamento climatico caratterizzato da temperature basse, si presenta con apparato fogliare più ridotto rispetto a quello che avrebbe in normali condizioni di temperatura, mentre l'apparato radicale è robusto e profondo. Così un giavone sulla 3a foglia cresciuto con temperature basse è da considerare "invecchiato" e paragonabile come sensibilità a Diris Novel Flo 480 ad un giavone sulla 4a-5a foglia. Pertanto, dovendo operare in tali condizioni, cioè con giavone "invecchiato", è necessario aumentare convenientemente le dosi come di seguito specificato:

- 1) Giavone 1-2-3 foglie - 10 litri/ha di Diris Novel Flo 480 (anziché 7,5)
- 2) Giavone 2-3-4 foglie - 11,5-14 litri/ha di Diris Novel Flo 480 (anziché 10).

NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITÀ

Diris Novel Flo 480 può essere usato in miscela con i più comuni prodotti impiegati in risaia (a base di solfoniluree, MCPA sale e estere, triclopir, quinclorac, bentazone, proflachlor), ad eccezione dei fertilizzanti, insetticidi, fosforantici e carbammici (carbati, fenitrothion, parathion, metidathion, dimetato) e non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'uso di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle ustioni.

FITOTOSSICITÀ

Alle dosi di impiego più elevate Diris Novel Flo 480 sotto condizioni particolari, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento delle giovani piante di riso.

Effettuare i trattamenti in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti e colture orticole in genere.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Non effettuare trattamenti con Diris Novel Flo 480 a distanza inferiore a 30 giorni dalla raccolta.

EVITARE L'ACCESSO DI UOMINI E ANIMALI NELLE 24 ORE SUCCESSIVE AL TRATTAMENTO.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

SLASH*

Fungicida ad azione preventiva per il controllo dell'oidio su vite, melone, anguria e zucca.

SOSPENSIONE CONCENTRATA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

Quinoxifen 22,58 % (= 250 g/l)
Coformulanti e solventi 1,39 %
Acqua q. b. a g 100

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patrolo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti di produzione

Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (UK)
Dow AgroSciences S.A. - DRUSENHEIM (Francia)
Fitofarmila S.r.l. - Aprilla (LT)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Taglie autorizzate: 10 - 30 - 50 - 100 - 250 - 300 - 500 - 1000 - 3000 ml

Registrazione n. del del Ministero della Salute
Partita n.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

NO CITA': sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Attenzione: il formulato contiene sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

SLASH controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*), e di melone, anguria e zucca (*Erysiphe cichoracearum* e *Sphaerotheca fuliginea*).

Modalità d'applicazione:

Vite da tavola: impiegare SLASH alla dose di 20-25 ml/ha iniziando i trattamenti quando i germogli sono ben formati. Proseguire ad intervalli di 10-14 giorni fino all'allegagione. Dopo l'allegagione impiegare SLASH alla dose di 25-30 ml/ha ad intervalli di 8-10 giorni.

Si raccomanda di impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia.

Vite da vino: impiegare SLASH alla dose di 15-25 ml/ha iniziando i trattamenti con germogli ben formati. Proseguire ad intervalli di 8-14 giorni fino all'allegagione. Dopo l'allegagione impiegare SLASH alla dose di 20-30 ml/ha ad intervalli di 8-12 giorni.

In entrambi i periodi vegetativi si raccomanda di aumentare la dose d'impiego dalla minima alla massima proporzionalmente all'allungamento degli intervalli.

Avvertenza: se alla ripresa vegetativa fossero presenti sintomi di infezioni primarie (germogli a bandiera), è consigliabile effettuare un trattamento con SLASH in combinazione estemporanea con anticidici ad azione endoterapica o curativa alle dosi riportate in etichetta, ripetendo l'applicazione dopo 5-7 giorni.

Successivamente è possibile continuare i trattamenti seguendo il calendario d'impiego riportato per vite da vino e da tavola.

Melone, anguria, zucca (in pieno campo): impiegare SLASH alla dose di 20-25 ml/ha iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia continuando ad intervalli di 10-12 giorni.

Se si impiegano meno di 10 hl di acqua per ettaro, aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200-250 ml/ha di SLASH.

Non applicare su colture che non hanno ancora superato la crisi di post-trapianto o che risultano indebolite da squilibri idrici, termici o nutrizionali.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni fungicidi, insetticidi ed acaricidi impiegati sulle colture riportate in etichetta.

Intervallo di sicurezza: sospendere le applicazioni 28 giorni prima della raccolta dell'uva da tavola e da vino, 7 giorni per anguria, melone, zucca.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 h.
Adoperare ad una distanza non inferiore a 5 m dai corpi idrici quando impiegato su vite e ad una distanza non inferiore a 1 m dai corpi idrici quando impiegato su melone, anguria e zucca.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO**SLASH*****FUNGICIDA****Sospensione concentrata****Composizione:**

Quinoxifen.....22,58 % (= 250 g/l)
Coformulanti e solventi11,39 %
Acqua q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)

Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti di produzione

Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (UK)

Dow AgroSciences S.A - DRUSENHEIM (Francia)

FitoFormula S.r.l. - Aprilia (LT)

DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Taglie autorizzate: 10 - 30 - 50 - 100 ml

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Partita n.

DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO
ILLUSTRATIVO.**

® Marchio registrato della Dow AgroSciences

STARANE* GOLD

Erbicida selettivo per frumento, orzo e mais,
efficace contro infestanti dicotiledoni

SUSPO-EMULSIONABILE

STARANE GOLD

Composizione:

Florasulam puro ..g 0,1 (=1 g/l)
Fluroxypyr puro ..g 14,57 (=100 g/l)
Coformulanti q.b. a.....g 100,0

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi e per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)

Sede Secondaria in Italia - Via Patrolo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:

Dow AgroSciences S.A. - DRUSENHEIM (Francia)

DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

STI-Solfotecnica Italiana Spa - Torrenieri (SI)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 litri

Registrazione n. del del Ministero della Salute
Partita n.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO



NORME DI SICUREZZA

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento

Informazioni per il Medico:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: florasulam 2,5g ae/l e fluroxypyr 100 g ae/l, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi: **Florasulam**: in caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Fluroxypyr**: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene. Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveneni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

Erbicida selettivo per frumento, orzo e mais, efficace contro infestanti dicotiledoni

Campi d'impiego

FRUMENTO E ORZO: Pianta infestanti sensibili: *Galium aparine* (Attacchamano), *Stellaria media* (Centocchio), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio comune). Pianta infestanti mediamente sensibili: *Sinapis arvensis* (Senape), *Diploaxis erucoides* (Ruchetta violacea), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Raphanus raphanistrum* (Ravanella selvatica), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune).

Dosi d'impiego: 1,5-1,8 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo. Impiegare le dosi più elevate in presenza di grave infestazione di *Galium aparine*.

Epoca e modalità di applicazione: Trattare quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese tra accostimento e fine levata.

AVVERTENZA: Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare Frumento ed Orzo, Avena, Segale e Mais senza attendere nessun intervallo.

MAIS: Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Bidens tripartita* (Forbicina). STARANE GOLD è attivo anche contro infestanti perennanti quali: *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Calystegia sepium* (Vilucchiene), *Rumex spp* (Romice).

Dosi d'impiego: 1-1,2 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo.

Epoca e modalità di applicazione: applicare STARANE GOLD sino allo stadio di 6-7 foglie vere della coltura.

Lavaggio delle attrezzature: Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- 1) Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
- 2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
- 3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
- 4) Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.

Compatibilità: STARANE GOLD è miscibile con i principali prodotti autorizzati per la protezione delle colture indicate in questa etichetta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, floreali in genere, ecc. Pertanto è consigliabile evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Intervallo di sicurezza: non necessario

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VEDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

SYSTHANE* K

**FUNGICIDA SISTEMICO
PER VITE, PESCO E CUCURBITACEE**

EMULSIONE CONCENTRATA

SYSTHANE K

Composizione:

MICLOBUTANIL puro ... 7,6% (75 g/l)
DINOCAP puro..... 32,9% (325 g/l)
Coformulantiq.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per la pelle e per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/faccia. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Dow AgroSciences B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patrolo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti di produzione:

Dow AgroSciences B.V. - Mozzanica (Bergamo)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
Agriformula S.r.l. - Paganica (L'Aquila)

Taglie autorizzate: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 litri

Registrazione n. del del Ministero della Salute
Partita n.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO



DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

GENERALITÀ

Il SYSTHANE K è un fungicida ad azione sistemica e di contatto, costituito da una miscela di miclobutanil e dinocap in opportuna proporzione, in modo da sfruttare nel modo migliore le caratteristiche biologiche dei due principi attivi.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Vite - Contro l'oidio e il marciume nero (Black rot): impiegare 25-35 ml/hl con un intervallo di 10-14 giorni a seconda della pressione delle malattie e della suscettibilità varietale.

Pesce - Contro l'oidio: impiegare 40-50 ml/hl. Iniziare i trattamenti alla scamicatura del frutto e proseguirli con un intervallo di 10-14 giorni.

Melone, cocomero, zuccchino, cetriolo - Contro l'oidio: impiegare 40 ml/hl. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa della malattia e proseguire con intervalli di 8-10 giorni. Non impiegare in serra.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

Avvertenze - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Non impiegare con temperature superiori a 32° C. Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

RISCHI DI NOCIVITÀ

E' tossico per acari predatori e insetti utili.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 3 giorni prima della raccolta per melone, cocomero, zuccchino, cetriolo; 7 giorni per il pesce; 20 giorni per la vite.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL' AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

NORME DI SICUREZZA

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazioni delle seguenti sostanze attive: Miclobutanil 7,6% e Dinocap 32,9% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **Miclobutanil:** organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Dinocap:** sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertemia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria. Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare.

Terapia sintomatica. Combattere l'ipertemia con impacchi freddi alla radice degli arti.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

* Marchio registrato Dow AgroSciences