

I - MEDICINALI PER USO INTERNO

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
I - Analgesici						
1. Morfina	Fiale da 1 ml con 10 mg Etichettare «stupefacente» Si trova tra gli stupefacenti affidati al comandante	—	—	10	—	Sempre e solo dietro consiglio medico, dato in chiaro. Eccezionalmente può essere somministrata una fiala intramuscolo senza consiglio medico in caso di violentissimo dolore retrosternale, che non passa in seguito alla somministrazione di due compresse di trinitrina
2. Pentazocina	Fiale 1 ml/30 mg Comprese da 50 mg Etichettare «stupefacente»	— —	5 20	10 40	— —	Può essere somministrata una fiala in caso di urgenza, quando l'origine del dolore è chiara (es. fratture, ustioni), da non somministrare, senza consiglio medico, nei dolori addominali, nei traumi cranici, nelle cefalee -
3. Naloxone	Fiale da 0,4 mg	—	—	10	—	Antidoto nel trattamento degli effetti tossici dei narcotici. Una fiala per via i.m., e e.v., o sottocute
II - Analgesici - Antipiretici - Antireumatici						
4. A base di acido acetilsalicilico	Comprese da 500 mg gastroresistenti	20	20	100	—	Una-due compresse ripetibili ogni 6-8 ore, a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite o di ulcera gastrica
5. A base di derivati pirazolici	Comprese Gocce - Flaconi	10 1	20 2	100 10	— —	In caso di febbre o dolori di media entità (reumatismo, dolori muscolari, nevralgie, mal di testa e manifestazioni di tipo influenzale o da raffreddamento) una-due compresse ovvero 20-30 gocce ripetibili ogni 8 ore a stomaco pieno
III - Analgesici - Antispastici						
	Discoidei 10 mg Supposte 10 mg Fiale	20 — 3	20 — 3	40 20 15	— — —	In caso di dolori viscerali, tipo coliche di fegato, coliche renali, coliche intestinali, dolori premenstruali e mestruali, un discoide ripetibile dopo due ore ed in seguito ripetibile ogni 6-8 ore oppure una supposta, ripetibile dopo due ore ed in seguito ripetibile ogni 6-8 ore oppure una fiala intramuscolare ripetibile dopo 4 ore; se il dolore non passa, consultare al più presto un medico
IV - Anestetici locali						
7. Lidocaina	Flaconi da 0,5%-50 cc	—	—	1	—	Anestetico locale da usarsi in chirurgia per l'anestesia di infiltrazione terminale o di superfice. Da usare in caso di effettiva necessità in quantità ridotta solo su indicazione medica

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
V - Antiacidi						
8. A base di idrato di alluminio colloidale	Comprese da 500 mg	—	50	100	—	Nei casi di acidità di stomaco: una-due compresse da masticare alla comparsa di bruciore di stomaco
9. A base di H ₂ antagonisti	Comprese Fiale	— —	1 sc. 1 sc.	1 sc. 1 sc.	— —	In caso di ulcera peptica e sue complicanze solo su indicazione medica
VI - Antiasmatici						
10. A base di aminofillina . . .	Comprese Fiale da 3 ml	— —	— —	30 10	— —	Da somministrare solo dietro prescrizione medica: in caso di dispnea (difficoltà di respiro), in attesa di mettersi in contatto col medico, somministrare 1 fiala intramuscolo
11. A base di betastimolanti .	Fiale	—	1 sc.	1 sc.	—	In caso di crisi asmatica grave, solo su prescrizione medica
12. Salbutamolo	Spray - flac. 20 mg	—	1	3	—	Broncodilatatore nel trattamento dell'asma bronchiale, bronchite asmatica, enfisema polmonare. Da usare con precauzione nell'ipertensione e nelle cardiopatie
VII - Antibiotici e sulfamidici						
13. Ampicillina	Capsule 500 mg Flaconi 1 g	— —	24 —	60 12	— —	Nei casi di infezioni con febbre (otiti, tonsilliti, bronchiti, polmoniti ecc.). Prima di iniziare la somministrazione, 1 capsula ogni 6 ore per via orale o un flacone ogni 8-12 ore per via intramuscolare, consultare preferibilmente un medico. Può dare reazioni allergiche (orticaria o altro)
14. Cefalosporine (ceftazidima o ceftriaxone)	Flaconi 1 g	—	—	10	—	Nei casi di infezioni febbrili di particolare gravità. Somministrare dopo aver consultato un medico, alla dose di 1 flacone per via intramuscolare ogni 8-12 ore (ceftazidima) o ogni 12-24 ore (ceftriaxone)
15. Cloramfenicolo	Capsule 250 mg	—	—	36	—	Nei casi di febbre tifoide, in alcune infezioni intestinali e veneree ecc. Somministrare solo dopo aver consultato un medico, alla dose di 2 capsule ogni 6 ore
16. Gentamicina	Flaconi da 80 mg	—	—	12	—	Nei casi di infezioni febbrili di particolare gravità. Somministrare solo dopo aver consultato un medico, alla dose di 1 flacone per via intramuscolare ogni 12 ore (effetti secondari o tossici sul rene e sull'udito)
17. Tetraciclina	Capsule 250 mg	—	—	80	—	Nei casi di brucellosi, infezioni dell'apparato respiratorio, in alcune infezioni veneree ecc. Somministrare solo dopo aver consultato un medico alla dose di 2 capsule ogni 6 ore per via orale (può dare reazioni cutanee in caso di esposizione al sole)

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
18. Codrimoxazolo	Comprese	—	20	80	—	Nei casi di infezione con febbre (infezioni dell'apparato respiratorio, infezioni urinarie, infezioni intestinali ecc.). Prima di iniziare la somministrazione alla dose di 2 compresse ogni 12 ore per via orale consultare preferibilmente un medico. Può dare reazioni allergiche
19. Spectinomina	Fiale 2 g	—	—	20	—	In caso di blenorragia somministrare per via intramuscolare su prescrizione medica
VIII - Antidiarroici						
20. Insulina ad azione pronta per via ipodermica	Fiaconi 400 U.I.	—	—	2	—	Somministrare solo su consiglio medico dato in chiaro: con siringhe apposite munite di ago ipodermico. L'uso dell'insulina è subordinato al controllo della glicemia e della glicosuria a mezzo delle strisce reattive. Conservare in frigorifero a + 2 + 8
21. A base di sufamiluree e biguanidi	Comprese	—	—	1 sc.	—	1-3 compresse al dì su prescrizione medica
IX - Antidiarroici e reidratanti						
22. A base di loperamide . . .	Comprese da 2 mg	—	—	30	—	Antidiarroico ad azione antiperistaltica: nelle diarree acute di varia origine fino a 16 mg al giorno per uso orale da usarsi solo su prescrizione medica
23. Miscela glucosalina per soluzione estemporanea in acqua	Confezione per 10 l	—	—	2	—	Reidratante da somministrare per via orale
X - Antiemetici						
24. A base di metoclopramide o domperidone	Supposte	—	1 sc.	2 sc.	—	In caso di nausea e vomito incoercibili
XI - Antiemorragici						
25. A base di acido tranexanico	Fiale da 5 ml	5	5	10	—	In caso di emorragia abbondante e persistente. Una fiala intramuscolo, ripetibile dopo 2 ore. In caso di ferita con emorragia abbondante e continua o a fiotti, anche dopo applicazione del laccio una fiala intramuscolo dopo mezz'ora e poi dopo 2 ore. Inoltre può essere utile applicare sulla parte garze sterili o cotone imbevuti del medicinale. In caso di emorragie viscerali (es.: emottisi, vomito di sangue, emissione di feci nere) iniettare una fiala intramuscolo e consultare il medico
26. Emostatici uterini a base di ergotamina	Gocce - Fiaconi Fiale 1 cc	—	—	1 1 sc.	—	Solo su indicazione medica
XII - Antimalarici						
27. Chinino bisolfato	Comprese	—	—	100	—	Terapia dell'accesso febbrile malarico: iniziare con tre compresse per via orale in singola somministrazione, continuando con due compresse ogni 6 ore per dieci giorni o secondo prescrizione medica

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
28. Cloroquina	Comprese 250 mg	—	—	100	—	<p>Profilassi: 2 compresse in singola somministrazione una volta alla settimana, iniziando 2 settimane prima dell'ingresso in zona malarica e proseguendo per tutto il periodo di permanenza e per altre 6 settimane dopo aver lasciato la zona malarica</p> <p>Terapia: somministrare 4 compresse come prima dose; dopo sei ore dalla prima dose altre 2 compresse (2^a dose); dopo 24 ore dalla prima dose altre due compresse (3^a dose) dopo 48 ore dalla prima dose, altre due compresse (4^a dose)</p>
29. Sulfametopirazina e Pirimetamina	Comprese 500 mg S e 25 mg P	—	—	20	—	<p>Può dare reazioni allergiche gravi in persone sensibili ai sulfamidici. Terapia: Qualora la malaria sia contratta in zone dove esistono ceppi di parassita malarico resistente alla cloroquina somministrazione per via orale 2 compresse (peso corporeo 50 - 70 kg) o 3 compresse (peso corporeo superiore a 70 kg) in dose unica iniziando anche il trattamento con chinino (vedi) o secondo prescrizione medica</p>
XIII - Antipertensivi e coronarodilatatori						
30. Antipertensivi a base di clonidina cloridrato	Comprese da 0,150 mg	—	—	30	—	Vasodilatatore e antipertensivo associabile ai cardiotonici controindicato nell'alcolismo e nell'abuso degli ipnotici. Da somministrare solo su consiglio medico
31. Coronarodilatatori a base di nitroglicerina ad assorbimento percutaneo	Cerotti	—	—	5	—	Vasodilatatore coronarico negli attacchi anginosi e stenocardici
32. Coronarodilatatori a base di trinitrina	Pillole da 0,3 mg	—	70	70	—	In caso di dolore violento nella zona precordiale sinistra o retrosternale, esteso eventualmente anche al braccio sinistro con senso di angoscia, di costrizione toracica e di morte imminente. Una pillola da porre sotto la lingua e lasciare fino al completo assorbimento, da ripetere dopo 5 minuti, se occorre. Se il dolore persiste dopo due pillole di trinitrina, consultare con urgenza un medico. Qualora ciò sia impossibile, ricorrere alla morfina: una fiala intramuscolo di morfina ed una fiala intramuscolo di analettico
XIV - Antistaminici - Antiallergici - Antishock						
33. A base di desclorfeniramina maleato	Comprese 2 mg	30	30	60	—	In caso di allergia tipo orticaria o in caso di raffreddore da fieno, somministrare tre compresse al giorno ovvero secondo prescrizione medica

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
34. A base di metilprednisolone	Fiale da 20 mg	1 sc.	1 sc.	2 sc.	—	In caso di reazioni allergiche gravi Da usare dietro consiglio medico
35. A base di cortisone iniettabile (idrocortisone succinato)	Fiale da 100 mg	—	—	5	—	In caso di allergia grave, ivi compresa quella alla penicillina ed' altri antibiotici, con respiro difficoltoso a tipo di asma, eruzioni cutanee tipo orticaria, diminuzione grave della pressione (collasso). Iniettare una fiala intramuscolo e consultare con urgenza un medico
XV - Cardiotonici e antiaritmici						
36. Digitale (lanatoside C)	Confetti 0,250 mg Fiale 0,4 mg	— —	6 6	12 12	— —	Da somministrare solo su prescrizione medica
37. Antiaritmici a base di chinidina	Capsule 200 mg	—	20	20	—	Da somministrare solo su prescrizione medica
38. Antiaritmici a base di ajmalina	Capsule 75 mg	—	—	20	—	Da somministrare solo su prescrizione medica
39. Simpatomimetici adrenalina	Fiale 1 cc	—	6	6	—	Per uso sottocutaneo; in caso di shock; da usare su prescrizione medica
XVI - Decontratturanti						
40. Piridinolo	Fiale	—	5	5	—	Nel trattamento di contratture della muscolatura (lombaggini, torcicollo ecc.) da somministrare su consiglio medico
XVII - Diuretici						
41. A base di furosemide . . .	Compresse da 25 mg Fiale 2 cc/20 mg	— —	— 5	30 5	— —	Somministrare solo su consiglio medico
42. A base di acetazolamide . .	Compresse 250 mg	—	—	12	—	Indicato in caso di glaucoma. Somministrare solo su consiglio medico
XVIII - Lassativi						
43. Lassativo liquido	Gocce	—	—	3 fl.	—	8-10 gocce ripetibili una sola volta nelle 24 ore
44. Supposte di glicerina . . .		—	10	10	—	In caso di stitichezza. Prima di somministrare qualsiasi lassativo per via orale tentare l'applicazione di 1-2 supposte
XIX - Sedativi						
45. A base di clorpromazina .	Compresse da 25 mg Fiale da 50 mg	— —	— 5	25 5	— —	Da somministrare solo su prescrizione medica
46. A base barbiturici	Compresse da 100 mg	—	20	40	—	Da somministrare solo dietro consiglio medico
47. A base di benzodiazepina	Gocce-flaconi da 20 cc/2 mg Fiale 10 mg	— —	1 3	3 12	— —	Da somministrare solo su consiglio medico
XX - Soluzioni per uso endovenoso e/o ipodermico						
48. Soluzione fisiologica	Flaconi da 500 ml	—	3	4	—	In caso di abbondante perdita di liquidi (emorragie, ustioni, schiacciamento, vomito persistente e diarrea abbondante e persistente): somministrare sottocute o endovena un flacone di soluzione fisiologica facendo scendere il liquido alla velocità di 40-60 gocce al minuto. In seguito attenersi al consiglio medico

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
49. Soluzione glucosata.	Flaconi da 500 ml	—	—	3	—	(Vedi 48)
50. Plasma liofilo con acqua bidistillata (sostituti del plasma)	Flaconi da 500 ml	—	—	3	—	(Vedi 48)
XXI - Vitamine						
51. Polivitaminici complesso B	Confetti	—	—	40	—	In caso di terapia antibiotica somministrare due-tre confetti al giorno. Come ricostituente uno-due confetti al giorno
52. Vitamina B1 - B12 - B6	Fiale	—	—	12	—	In caso di dolori nevralgici praticare una fiala intramuscolo ogni 24 ore

2 - MEDICINALI PER USO ESTERNO

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
Colliri						
53. A base di ossibuprocaina .	Flaconi con contagocce oftalmico 20 ml	1	1	1	—	Secondo prescrizione medica
54. Collirio antisettico con antibiotico e cortisone	Flaconi con contagocce oftalmico	—	—	2	—	Vedi sopra
55. Collirio a base di atropina	Flaconi con contagocce oftalmico 10 ml	—	—	1	—	Solo su espressa indicazione medica
56. Collirio a base di pilocarpina	Flacone con contagocce oftalmico 1% da 10 ml	—	—	1	—	Da usarsi nel caso di glaucoma solo su espressa indicazione medica
Colluttori gocce						
57. Antisettico per uso orale	Flaconi con contagocce	—	—	1	—	In caso di irritazione delle gengive e della parte interna delle guance e della lingua e, comunque, nei casi di infiammazione del cavo orale 20 gocce in mezzo bicchiere d'acqua per sciacqui (non ingoiare)
58. A base di naftimetil inidazolina nitrato (uso orale)	Flaconi con contagocce 10-15 ml	—	—	1	—	In caso di raffreddore con abbondante muco e naso chiuso: somministrare 2 gocce per ogni narice, ogni 4-5 ore
59. Gocce antiodontalgiche (contro il mal di denti)	Flaconi o fiale	1	1	1	—	In caso di dolore provocato da denti cariati applicare un batuffolo di cotone imbevuto nel liquido del flaconcino o il contenuto della fiala, sul dente dolente
60. Gocce antiotalgiche (a base di antibiotici e antinfiammatori)	Flaconi con contagocce da 10 ml	—	—	1	—	In caso di infiammazione dell'orecchio, con dolore: 2 gocce in ogni orecchio 3-4 volte al giorno. Attenzione: nel caso vi sia anche una secrezione mucopurulenta o sia abbia febbre, consultare un medico
Lozioni antiparassitarie						
61. A base di dimetilfenilene	Flaconi 100 g	—	—	1	—	

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
<i>Pomate</i>						
62. A base di prometazina . .	Crema o pomata 2% tubetti	1	1	3	—	Antiallergico per applicazioni locali: può causare disturbi dopo esposizione al sole
63. A base di aureomicina. . .	Tubi pomata da g 30	—	1	1	—	Applicazioni locali 2 volte al giorno
64. Antiemorroidari a base di idrocortisone	Tubetti da 15 g	—	1	2	—	
65. A base di econazolo nitrato	Crema 1% tubetti	—	—	3	—	Antimicotico: applicazioni locali 2 volte al giorno
66. Contro le ustioni (1). . . .	Spray da 100 g .flac. o tubetti pomata 30 g	1	1	3	—	Applicare come primo intervento sulla parte ustionata, coprire con garza sterile e consultare il medico
67. Pomata uretrale.	Tubetti 6-10 g	—	—	1	—	Per il cateterismo uretrale
68. Pomata oftalmica con antibiotico	Tubetti	—	1	2	—	
<i>Potabilizzanti dell'acqua</i>						
69. A base di cloro.		a seconda dei quantitativi d'acqua da trattare			—	Attenersi alle apposite istruzioni relative ai singoli prodotti
<i>Disinfettanti liquidi per uso esterno</i>						
70. Acqua ossigenata a 12 vol.	grammi	100	200	500	—	Usare solo sulla pelle circostante, mai sulla ferita
71. Alcool denaturato	litri	—	1	3	—	
72. Tintura di iodio	grammi	50	50	100	—	
73. Altri disinfettanti a base di ammonio quaternario	Flaconi da cc 250	1	2	10	1	
<i>Insetticidi</i>						
74. Insetticida ad azione residua	Flaconi da 1 litro	—	1	6	—	
75. Liquido insetticida a base di piretro	Flaconi piretrina 25%	—	—	(*)	—	
76. Polvere insetticida	Barattoli da 50 g uso esterno	—	—	1	—	

(1) Per le navi petroliere e trasportanti materiali infiammabili dotazione quintupla.

(*) Un flacone per ogni membro dell'equipaggio nelle navi su rotte tropicali.

3 - MATERIALE PER MEDICAZIONE

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D
77. Ago e tubi di plastica per fleboclisi sterili		—	3	10	—
78. Ambupallone per rianimazione (**)		—	1	1	—
79. Ammoniaca	In flaconi di vetro scuro	1	1	1	1
80. Bacinella reniforme		—	—	2	—
81. Barella a canoa		—	—	1	—
82. Bende di cambric	Confezioni di varie misure	5	10	20	5
83. Bende di mussola idrofila (**)	Confezioni di varie misure	2	5	10	—
84. Bende di rete elastica tubolari		—	1	1	—
85. Benzina grammi		—	—	500	—
86. Bicchiere graduato a calice di vetro		—	—	1	—
87. Bombola ossigeno lt 1000, completa di maschera gorgogliatore e occhiali (**)		—	—	1	—

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D
88. Borsa di gomma per acqua calda (**)		—	1	2	—
89. Borsa di tela gomma per ghiaccio (**)		—	1	2	—
90. Busta chirurgica	Contenuto: aghi di sutura a traumatici già pronti forbice chirurgica curva forbice chirurgica retta manico da bisturi con lame intercambiabili pinza anatomica pinza emostatica di Klemmer pinza emostatica Pean pinza porta aghi n. 2 pinze a denti di topo (durante) porta caustico con cannello di nitrato d'argento porta stuelli di medicazione degli orecchi seta per sutura n. 0-1-2 (tubetti sterili) sonda scanalata specchio	—	—	1	—
91. Camice monouso		—	—	2	—
92. Catetere Foleyuretrale monouso	Calibro n. 18	—	—	2	—
93. Cerotto adesivo	Confezioni	1	2	4	1
94. Cerotto medicato (**)	Confezioni	1	1	2	1
95. Acquavite di vino	Litro	—	—	2	—
96. Cotone di Germania	Pacchi da 250 gr.	—	—	2	—
97. Cotone idrofilo	Pacchi da 250 gr.	1	2	5	1
98. Elenco dei dispensari dermocoltici e per la cura delle malattie veneree nei porti	Publicato dall'Organizzazione mondiale della sanità	—	—	2	—
99. Etere solforico	In boccette da 100 gr.	—	—	2	—
100. Ferule di fildiferro		—	—	1	—
101. Fogli per registrazione temperature		—	—	10	—
102. Fonendoscopio		—	1	1	—
103. Forbice comune		1	1	1	1
104. Fornelletto		—	1	1	—
105. Fornelletto elettrico		—	—	1	—
106. Garza idrofila compresse	Confezioni di varie misure	1	2	5	1
107. Garza vaselinata compresse	Confezioni	1	1	3	1
108. Guanti monouso	Confezioni	—	—	1	—
109. Laccio emostatico		1	1	1	1
110. Manuale di pronto soccorso		1	1	1	—
111. Mutanda elastica		—	—	1	—
112. Pacchetti sterili di medicazione (**)	Di varia misura	2	2	4	—
113. Padella in plastica		—	—	1	—
114. Pappagallo in plastica		—	—	1	—
115. Pera di gomma	Da gr. 200	—	—	1	—
116. Sfigmomanometro		—	1	1	—
117. Siringone da irrigazione		—	—	1	—
118. Siringhe da insulina monouso		—	—	5	—
119. Siringhe monouso	Da cc 5 Da cc 10	2 2	10 5	60 10	— —
120. Sondino naso-gastrico		—	—	2	—
121. Abbassalingua monouso	Confezione	—	—	1	—
122. Stecche palmari di legno	Confezione	—	1	1	—
123. Stecche per fratture	Confezione	1	1	1	1
124. Contenitore per il materiale della tabella D, avente caratteristiche indicate al paragrafo 4 delle istruzioni del presente decreto		—	—	—	1
125. Doccia per arto sup. Doccia per arto inf.		—	1 1	1 1	— —
126. Sterilizzatore elettrico		—	—	1	—

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D
127. Strisce reattive per ricerche varie in un'unica soluzione (albumina, sangue, glucosio, acetone)	Confezione	—	—	1	—
128. Termometro clinico		1	1	2	—
129. Lavaocchi in plastica		—	—	1	—
130. Tamponi oculari	Buste	—	—	1	—
131. Tiralingua		—	—	1	—

(**) Per le navi petrolifere e trasportanti materiale infiammabile dotazione tripla.

NOTE:

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 18 luglio 1899 ha approvato il T.U. coordinato che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto dei passeggeri.

— La legge n. 1045/1939 reca norme sulle condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali e, all'art. 88, stabilisce che i medicinali, gli oggetti di medicatura o gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, siano quelli indicati in apposite tabelle annesse alla legge medesima.

— Il regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639/1968, disciplina la pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo.

— Il D.P.R. n. 1154/1972, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, determina i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione.

— La legge n. 292/1974, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045/1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare e modificare le tabelle annesse alla citata legge 1045/1939.

— Il D.M. 15 settembre 1977 (regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto) contiene le norme di sicurezza per le unità da diporto in relazione al tipo ed all'impiego; all'art. 21, lettera m), prescrive tra le dotazioni richieste per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa una cassetta contenente materiale di pronto soccorso.

— Il D.P.R. n. 1154/1972, già citato, determina le caratteristiche della navigazione cui sono abilitate le navi mercantili ai punti:

47: «Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra i porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa».

48: «Navigazione internazionale breve (per le sole navi da passeggeri): una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località dove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempre che la distanza tra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia».

49: «Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti di Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa».

50: «Navigazione nazionale: una navigazione che svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa».

51: «Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa».

52: «Navigazione nazionale litorale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa».

— L'art. 9 del D.P.R. n. 1639/1968 definisce i seguenti tipi di pesca:

la pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 6 miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di 4ª categoria o da terra; la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 20 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla 3ª;

la pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda;

la pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti con navi di 1ª categoria.

— La legge n. 50/1971, all'art. 1, determina la denominazione delle costruzioni destinate alla navigazione da diporto come segue:

unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 30 tonnellate;

imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario o a motore destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate; e che non sia compresa nella categoria natanti;

natanti da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti come specificato nell'art. 13 della legge medesima.

88G0338