


ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **nicosulfuron** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **CA2613** di All. III fino **al 31 dicembre 2018** ai sensi decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008 che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dal titolare
1.	13172	CREW 40 OD	15/05/2009	Nufarm Italia S.r.l.	Sensibilizzante per la pelle, pericoloso per l'ambiente acquatico ; H317-H410- EUH401-P261-P272-P280- P302+352-P333+P313-P273- P501.
	Modifiche autorizzate - <u>Modifica di composizione</u> - <u>Cambio formulazione da: SC</u> - <u>Rinuncia alle taglie: 50-100-250 mL</u>				
2.	13106	IKANOS	29/12/2010	Nufarm Italia S.r.l.	Sensibilizzante per la pelle, pericoloso per l'ambiente acquatico ; H317-H410- EUH401-P261-P272-P280- P302+352-P333+P313-P273- P501.
	Modifiche autorizzate - <u>Modifica di composizione</u> - <u>Cambio formulazione da: SC</u> - <u>Rinuncia alle taglie: 50-100-250 mL</u>				
3.	15507	CREW SUPERB	08/10/2012	Nufarm Italia S.r.l.	Sensibilizzante per la pelle, pericoloso per l'ambiente acquatico ; H317-H410- EUH401-P261-P272-P280- P302+352-P333+P313-P273- P501.
	Modifiche autorizzate - <u>Modifica di composizione</u> - <u>Cambio formulazione da: SC</u> - <u>Rinuncia alle taglie: 50-100-250 mL</u>				



presenza degli infestanti nelle prime fasi di sviluppo. Il prodotto non ha azione residuale.

AVVERTENZE:

Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.

Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto specialmente nel trattamento unico.

Al termine dei trattamenti diserbanti con CREW 40 OD è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:

Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.

Riemplire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.

Rimuovere le tracce di candeggina, risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.

Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione ed adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Effettuare un solo intervento per anno in tutti gli impieghi.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consulti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE e CAMPI di IMPIEGO: CREW 40 OD è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais e per le aree extragricole, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

MAIS: Infestanti sensibili

Graminacee: *Echinochloa crusgalli* (Giovane comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetto).

Dicotiledoni : *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens bipartita* (Forbicina comune), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Stellaria media* (Centocchio).

Infestanti mediamente sensibili

Graminacee: *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Dicicliodon : Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola).

Modalità d'impiego

CREW 40 OD si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie

Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie

Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accetimento

Sorghetto da rizoma: 10-20 cm di altezza.

CREW 40 OD si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici. CREW 40 OD si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

Dosi di impiego su mais

1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

AREE INDUSTRIALI, BORDI STRADALI, ARGINI E SEDI FERROVIARIE: Applicare CREW 40 OD alla dose di **1-1,5 l/ha** in

CREW® 40 OD

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais e per impieghi nelle aree extra agricole
Olio dispersibile

Partita n.°

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Nicosulfuron puro e 4,4 (= 40 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

Contiene olio di ricino tossilato, oleato;

può provocare una reazione allergica.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea.
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P261 – Evitare di respirare gli aerosol. P272 – Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della registrazione:

Nularm Italia S.r.l. Via Luigi Majno, 17/A Milano. Sede amm.va

Via Gueffia, 5 – 40138 Bologna Tel. 051 0394022

Registrazione n. 13172 Ministero del Lavoro, della Salute e delle

Politiche Sociali del 15/05/2009

Officine di Produzione e confezionamento:

GAT Microencapsulation AG – Ebenfurth, Austria

Contenuto netto: 500: litri 1, 5, 10

® marchio registrato Nularm


PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

(Uso extragricolo): Tabellare le aree pubbliche da trattare con opportuni cartelli per evitare che persone estranee accedano durante l'applicazione del prodotto e prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2014



AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di semi fertili.

Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto specialmente nel trattamento unico.

Al termine dei trattamenti diserbanti con CREW 40 OD è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:
Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.

Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.

Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.

Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione ed adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Effettuare un solo intervento per anno in tutti gli impieghi.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consulti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO: CREW 40 OD è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais e per le aree extragrocole, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

MAIS: Infestanti sensibili

Graminacee: *Echinochloa crusgalli* (Giovane comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetto).

Dicotiledoni : *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Stellaria media* (Centocchio).

Infestanti notevolmente sensibili

Graminacee: *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).

Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola).

Modalità d'impiego

CREW 40 OD si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie

Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie

Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accrescimento

Sorghetto da rizoma: 10-20 cm di altezza.

CREW 40 OD si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici. CREW 40 OD si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

Dosi di impiego su mais

1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

AREE INDUSTRIALI, BORDI STRADALI, ARGINI E SEDI FERROVIARIE: Applicare CREW 40 OD alla dose di **1-1,5 l/ha** in presenza delle infestanti nelle prime fasi di sviluppo. Il prodotto non ha azione residuale.

CREW® 40 OD

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais e per impieghi nelle aree extra agricole

Olio dispersibile

Partita n.°

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Nicosulfuron puro g 4,4 (= 40 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

Contiene olio di ricino etossilato, oleato: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:

Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

Alimento tossico per gli organismi acquatici,

può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede amm. va

Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0594022

Registrazione n. 13172 Ministero del Lavoro, della Salute e delle

Politiche Sociali del 15/05/2009

Officine di Produzione e confezionamento:

GAT Microencapsulation AG - Ebenfurth, Austria

Contenuto netto: 500: litri 1, 5, 10

® marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

(Uso extragroicolo): Tabellare le aree pubbliche da trattare con opportuni cartelli per evitare che persone estranee accedano durante l'applicazione del prodotto prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2014



IKANOS®

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais e per impieghi nelle aree extra agricole

Partita n.: *
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Nicosulfuron puro g 4,4 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Contiene olio di ricino etossilato, oleario; può provocare una reazione allergica.

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea.
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P261 – Evitare di respirare gli aerosol. P272 – Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della registrazione:
Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede am.m. va
Via Guelfa, 5 – 40138 Bologna. Tel. 051 0394022

Registrazione n. 13106 del Ministero della Salute del 29/12/2010
Ufficio di Produzione e confezionamento:
Lehnkering GmbH - Duisburg – Germany
Arysta LifeScience – Route d'Arrix, 64150 Nogueres – France
Sipeam S.p.a. – Salerno sul Lambro (MI) - Italy

Distribuito da:
NUFARM ITALIA SRL – Via Guelfa, 5 – 40138 – Bologna (BO)
Sumitomo Chemical Italia Srl – Via Caldera, 21 – 20153 – Milano (MI)

Contenuto netto : ml 500; litri 1, 5, 10
® marchio registrato Nufarm

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea.
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P261 – Evitare di respirare gli aerosol. P272 – Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della registrazione:
Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede am.m. va
Via Guelfa, 5 – 40138 Bologna. Tel. 051 0394022

Registrazione n. 13106 del Ministero della Salute del 29/12/2010
Ufficio di Produzione e confezionamento:
Lehnkering GmbH - Duisburg – Germany
Arysta LifeScience – Route d'Arrix, 64150 Nogueres – France
Sipeam S.p.a. – Salerno sul Lambro (MI) - Italy

Distribuito da:
NUFARM ITALIA SRL – Via Guelfa, 5 – 40138 – Bologna (BO)
Sumitomo Chemical Italia Srl – Via Caldera, 21 – 20153 – Milano (MI)

Contenuto netto : ml 500; litri 1, 5, 10
® marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
(Uso extraagricolo): Tabellare le aree pubbliche da trattare con opportuni cartelli per evitare che persone estranee accedano durante l'applicazione del prodotto e prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2014

Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare il Centro Antidoti

CARATTERISTICHE e CAMPI di IMPIEGO: IKANOS è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais e per le aree extraagricole, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

MAIS: Infestanti sensibili

Graminacee: *Echinochloa crusgalli* (Giovane comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetto).

Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Portulaca oleracea* (Porsellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Stellaria media* (Centocchio).

Infestanti non dannate sensibili

Graminacee: *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola).

Modalità d'impiego

IKANOS si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

Maïs: da 2-3 fino a 5-6 foglie

Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie

Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accrescimento

Sorghetto da rizoma: 10-20 cm di altezza.

IKANOS si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con maïs in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici. IKANOS si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

Dosi di impiego su maïs

1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il

controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

AREE INDUSTRIALI, BORDI STRADALI, ARGINI, E SEDI FERROVIARIE: Applicare IKANOS alla dose di **1-1,5 l/ha** in presenza delle infestanti nelle prime fasi di sviluppo. Il prodotto non ha azione residuale.

AVVERTENZE:

Non impiegare su varietà di maïs dolce e su linee di maïs per la produzione di sementi ibridi.

Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.

Al termine dei trattamenti diserbanti con IKANOS è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:

Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.

Riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.

Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.

Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione ed adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.


Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI INOCUITÀ

Effettuare un solo intervento per anno in tutti gli impieghi.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.



IKANOS®

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais e per impieghi nelle aree extra agricole

Partita n.:

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Nicosulfuron puro g 4,4 (= 40 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

Contiene olio di ricino etossilato, oleato;

può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:

Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

Altamente tossico per gli organismi acquatici,

può provocare a lungo termine effetti negativi per

l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare i mangimi e da bevande. Evitare il contatto con la pelle. Usare

indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature.

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti

pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni

speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede amm.va

Via Gueffia, 5 – 40138 Bologna. Tel. 051 0394022

Registrazione n. 13106 del Ministero della Salute del 29/12/2010

Officina di Produzione e confezionamento:

Lehkerling GmbH - Duisburg - Germany

Arysta LifeScience - Route d'Arrix, 64150 Nogueres - France

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (MI) - Italy

Distribuito da:

NUFARM ITALIA SRL - Via Gueffia, 5 - 40138 - Bologna (BO)

Sumitomo Chemical Italia Srl - Via Caldera, 21 - 20153 - Milano (MI)

Contenuto netto : ml 500; litri 1,5, 10

® marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia

completamente asciutta.

(Uso extragricolo): Tabellare le aree pubbliche da trattare con opportuni

cartelli per evitare che persone estranee accedano durante l'applicazione

del prodotto e prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio, rispettare

una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e

da zona non coltivata.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire

il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare

la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende

agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il

medico per i consulti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE e CAMPI DI IMPIEGO: IKANOS è un

erbicida di post-emergenza selettivo per mais e per le aree extragricole,

assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto

ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti

nella coltura.

MAIS: Infestanti sensibili

Graminacee: *Echinochloa crusgalli* (Giovane comune), *Lolium spp.*

(Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e

rizoma (Sorghetta).

Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens tripartita*

(Forbicina comune), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus*

raphanistrum (Ramolaccio selvatico), *Stellaria media* (Centocchio).

Infestanti medicamentose sensibili

Graminacee: *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).

Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum*

(Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola).

Modalità d'impiego

IKANOS si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei

seguenti stadi di sviluppo:

Maïs: da 2-3 fino a 5-6 foglie

Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie

Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.

IKANOS si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve

essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di

attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o

superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici. IKANOS si distribuisce

impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando

pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la

preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella

botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-

miscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al

volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere

un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono

trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

AREE INDUSTRIALI, BORDI STRADALI, ARGINI E SEDI FERROVIARIE: Applicare IKANOS alla dose di **1-1,5 l/ha** in presenza delle infestanti nelle prime fasi di sviluppo. Il prodotto non ha azione residuale.

AVVERTENZE:

Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la

produzione di sementi ibridi.

Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.

Al termine dei trattamenti diserbanti con IKANOS è necessario lavare

molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:

Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua

pulita e svuotare nuovamente.

Riemplire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere candeggina (una

soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per

ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo

l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.

Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente

serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.

Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una

soluzione di candeggina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS. Allo

scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe

resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida

prodotti aventi un differente meccanismo d'azione ed adottare idonee

pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa

semina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato

il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme

precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero

casì di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non

indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Effettuare un solo intervento per anno in tutti gli impieghi.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle

condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è

responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del

preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente

etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento

e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare

con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le

istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il

contenitore completamente svuotato non deve essere disperso

nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

AREE INDUSTRIALI BORDI STRADALI ARGINI E SEDI FERROVIARIE: Applicare CREW SUPERB alla dose di **1-1,5 l/ha** in presenza delle infestanti nelle prime fasi di sviluppo. Il prodotto non ha azione residuale.

AVVERTENZE:

Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.

Operare come segue:

Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto. Al termine dei trattamenti diserbanti con CREW SUPERB è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:

Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.

Riempi il serbatoio con acqua pulita; aggiungere candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.

Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.

Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di maderbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione ed adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in fornire il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHIO DI NOCIVITÀ

Effettuare un solo intervento per anno in tutti gli impieghi.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consulti intervenienti di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveletti

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO: CREW SUPERB è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais e per le aree estrinseche, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

MAIS: Infestanti sensibili

- **Graminacee:** *Echinochloa crusgalli* (Giarone comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).

- **Dicotiledoni:** *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ranuncolo selvatico), *Stellaria media* (Cenocchio).

Infestanti mediamente sensibili

- **Graminacee:** *Digitaria sanguinalis* (Sanguinello).

- **Dicotiledoni:** *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erbia morella), *Xanthium spp.* (Lappola).

Modalità d'impiego

CREW SUPERB si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie

Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie

Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accostamento

Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza

CREW SUPERB si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici. CREW SUPERB si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompa a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.

Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

Dosi di impiego su mais

1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo della coltura. La dose maggiore è indicata per il

CREW® SUPERB

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais e per impieghi nelle aree extra agricole

Parlita n.°

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Nicosulfuron puro g 4,4 (=40 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

Contiene olio di ricino etossilato, oleato;

può provocare una reazione allergica.



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea.

H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P261 – Evitare di respirare gli aerosol. P272 – Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.

P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della registrazione:

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede amm.va

Via Guelia, 5 – 40138 Bologna. Tel. 051 0394022

Registrazione n. 15507 del Ministero della Salute del 08/10/2012

Ufficio di Produzione e confezionamento:

Lehnkering GmbH- Duisburg – Germany

Sipeam Spa – Salerno sul Lambro (MI) - Italy

Distribuito da:

NUFARM ITALIA S.r.l. – Via Guelia, 5 – 40138 – Bologna (BO)

Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldern, 21 – 20153 – Milano (MI)

Contenuto netto: ml 500; litri 1,5, 10


® marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

(Uso extragricolo): Tabellare le aree pubbliche da trattare con opportuni cartelli per evitare che persone estranee accedano durante l'applicazione del prodotto e prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2014



AREE INDUSTRIALI, BORDI STRADALI, ARGINI E SEDI FERROVIARIE: Applicare CREW SUPERB alla dose di **1-1,5 l/ha** in presenza delle infestanti nelle prime fasi di sviluppo. Il prodotto non ha azione residuale.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.

Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
Al termine dei trattamenti diserbanti con CREW SUPERB è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:
Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.

Riemplire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.

Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
Filtro e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione ed adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falciatura.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compila.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHIO DI NOCIVITÀ
Effettuare un solo intervento per anno in tutti gli impieghi.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consulti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE e CAMPI DI IMPIEGO: CREW SUPERB è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais e per le aree extragricole, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

MAIS: Infestanti sensibili
Graminacee: *Echinochloa crusgalli* (Giovane comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetto).

Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Stellaria media* (Centocchio).

Infestanti medianamente sensibili
Graminacee: *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).

Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Elaio morella), *Xanthium spp.* (Lappola).

Modalità d'impiego

CREW SUPERB si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie

Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie

Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accostimento

Sorghetto da rizoma: 10-20 cm di altezza.

CREW SUPERB si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il

trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed

infestanti in fase di attiva crescita, evitando di operare con temperatura

inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici. CREW

SUPERB si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e

400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a

ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente

il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio

di pre-miscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di

irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.

Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte

dell'erbicida, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali

piogge.

Dosi di impiego su mais

1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle

prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il

controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o

mediamente sensibili.

CREW® SUPERB



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais e per impieghi nelle aree extra agricole

Partita n. 8

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Nicosulfuron puro e 4,4 (= 40 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

Contiene olio di ricino etossilato, oleato;

può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:

Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

Altamente tossico per gli organismi acquatici,

può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da

alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con la pelle. Usare

indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature.

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti

pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni

speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:

Nufarm Italia S.r.l., Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede am.m. via

Via Gueffia, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022

Registrazione n. 15507 del Ministero della Salute del 08/10/2012

Officina di Produzione e confezionamento:

Lehnkering GmbH- Duisburg - Germany

Specan Spa - Salerano sul Lambro (MI) - Italy

Distribuito da:

NUFARM ITALIA S.r.l. - Via Gueffia, 5 - 40138 - Bologna (BO)

Sumitomo Chemical Italia S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 - Milano (MI)

Contenuto netto: ml 500; litri 1, 5, 10

® marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia

completamente asciutta.

(Uso extravaginato): Tabellare le aree pubbliche da trattare con opportuni

cartelli per evitare che persone estranee accedano durante l'applicazione

del prodotto e prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio, rispettare

una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e

da zona non coltivata.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2014

