

ALLEGATO

\*ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limiti temporanei massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %				
<b>Coccidiostatici e istomonostatici</b>										
51701	Huvepharma NV Belgio	Monensin sodico (Coxidin)	<p><i>Composizione dell'additivo:</i></p> <p>monensin sodico, sostanza tecnica equivalente all'attività del monensin: 25 %</p> <p>perlite: 15-20 %</p> <p>crusca di frumento: 55-60 %</p> <p><i>Sostanza attiva</i></p> <p><math>C_{36}H_{61}O_{11}Na</math></p> <p>Sale sodico dell'acido monocarbossilico di polietere prodotto dallo <i>Streptomyces cinnamonensis</i>, 28682, LMG S-19095 in polvere.</p> <p><i>Composizione:</i></p> <p>monensin A: non inferiore al 90 %</p> <p>monensin A + B: non inferiore al 95 %</p> <p>monensin C: 0.2-0.3 %</p> <p><i>Metodo analitico</i> (1)</p> <p>Metodo per determinare la sostanza attiva: cromatografia in fase liquida ad alta risoluzione (HPLC) con derivatizzazione post-colonna e rilevamento a UV (<math>\lambda = 520</math> nm).</p>	Polli da ingrasso	—	100	125	<p>1. Somministrazione vietata almeno un giorno prima della macellazione.</p> <p>2. L'additivo è incorporato nei mangimi composti in forma di premiscela.</p> <p>3. Dose massima consentita di monensin sodico nei mangimi complementari:</p> <p>— 625 mg/kg per polli da ingrasso,</p> <p>— 500 mg/kg per tacchini.</p> <p>4. Il monensin sodico non va mescolato con altri coccidiostatici.</p> <p>5. Indicare nelle istruzioni per l'uso:</p> <p>"Pericoloso per le specie equine. Mangime contenente uno ionoforo: evitare la somministrazione simultanea di tiamulina e controllare eventuali effetti collaterali negativi se usato contemporaneamente ad altri medicinali".</p> <p>6. Indossare guanti e indumenti protettivi adeguati e proteggere occhi e viso. In caso di locali insufficientemente aerati servirsi di appositi respiratori.</p>	6.2.2017	25 µg di monensin sodico/kg di tessuto cutaneo e adiposo peso umido
				Tacchini	16 settimane	60	100		8 µg di monensin sodico/kg di fegato, reni e muscoli (peso umido)	

