

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 febbraio 1992

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05001**

N. 39

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1992.

**Approvazione di etichette relative ai presidi
sanitari a base delle sostanze attive amitraz,
clorotalonil e linuron.**

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1992. — *Approvazione di etichette relative ai presidi sanitari a base delle sostanze attive amitraz, clorotalonil e linuron . . .*

Pag. 1

Adica	»	5
Agrifarmax	»	9
Agrimont	»	13
Agronova	»	17
Bayer Italia	»	21
Basf	»	25
Bimex	»	29
Caffaro	»	33
Chemia	»	47
Chimiberg	»	51
Ciba Geigy	»	55
Cyanamid	»	67
Dow Elanco	»	71
Du Pont Conid	»	83
Enichem Agricoltura	»	95
ICI Solplant	»	99
I.P.I.CI.	»	105
ISK Biotech	»	109
Pac	»	113
Pavoni	»	117
Rhone Poulenc Agro	»	121
Roussel Hoechst	»	131
Sandoz	»	139
Sariaf	»	143
Scam	»	149
Schering	»	155
Sepran	»	165
Siapa	»	169
Silia	»	193
Sipcam	»	205
Sipsa	»	219
Sivam	»	225
Vischim	»	229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 febbraio 1992.

Approvazione di etichette relative ai presidi sanitari a base delle sostanze attive amitraz, clorotalonil e linuron.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, concernente il regolamento per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1991 (suppl. straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1991) con il quale sono state approvate le etichette relative ai presidi sanitari «pericolosi», ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258;

Considerato che nel citato decreto ministeriale 12 novembre 1991, non sono stati inclusi i presidi sanitari «pericolosi», a base delle sostanze attive Amitraz, Clorotalonil e Linuron, in quanto per tutti i prodotti contenenti dette sostanze, pericolosi e non, sono state stabilite particolari condizioni e prescrizioni d'uso e sono stati fissati diversi periodi di tempo per lo smaltimento delle scorte esistenti in sede di commercializzazione, anche su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione e pubblicazione delle etichette di tutti i presidi sanitari, a base delle citate sostanze attive, conformi alle nuove condizioni e prescrizioni d'impiego previste e, per quanto concerne i prodotti «pericolosi», alle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 258 del 2 agosto 1990, ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 4, dello stesso decreto ministeriale n. 258/90;

Viste le note trasmesse al Ministero della sanità dalle imprese titolari delle registrazioni per l'adeguamento e l'aggiornamento delle etichette dei prodotti interessati alle nuove condizioni e prescrizioni d'impiego stabilite;

Viste le proposte di classificazione trasmesse al Ministero della sanità dalle imprese titolari delle registrazioni di presidi sanitari pericolosi a base delle citate sostanze attive, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258;

Viste le note del Ministero della sanità in data 9 agosto 1991 con le quali, in conformità al parere espresso dalla commissione consultiva, i titolari delle registrazioni sono stati diffidati a modificare in parte o in tutto le citate proposte in quanto non conformi alle prescrizioni ed ai criteri recati dal decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258;

Viste le note trasmesse dai titolari delle registrazioni inviate in risposta alle summenzionate diffide del Ministro della sanità;

Rilevato che, per quanto non innovato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988, permane l'esclusiva responsabilità dei titolari delle registrazioni circa la fedele conformità delle etichette trasmesse con quelle recate dai decreti di registrazione del Ministero della sanità a suo tempo emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visti gli atti della commissione consultiva di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, relativi all'esame delle citate proposte di classificazione;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Ritenuto di provvedere con separati provvedimenti alle revoche delle registrazioni per le quali i titolari delle registrazioni non hanno adempiuto a quanto previsto;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le etichette, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, relative ai presidi sanitari contenenti le sostanze attive Amitraz, Clorotalonil e Linuron, adeguate alle nuove condizioni e prescrizioni d'impiego stabilite per detti prodotti, nonché alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, per quanto concerne i presidi sanitari classificati pericolosi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è concesso un periodo di mesi sei per lo smaltimento, in sede di commercializzazione, delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ELENCO PRESIDI SANITARI A BASE DEI PRINCIPI ATTIVI AMITRAZ, CLOROTALONIL E LINURON

Ditta —	N. presidi —
ADICA	1
AGRIFARMAX	1
AGRIMONT	2
AGRONOVA	1
BAYER ITALIA	2
BASF	1
BIMEX	1
CAFFARO	11
CHEMIA	1
CHIMIBERG	2
CIBA GEIGY	9
CYANAMID	2
DOW ELANCO	9
DU PONT CONID	9
ENICHEM AGRICOLTURA	1
ICI SOLPLANT	3
I.P.I.C.I.	1
ISK BIOTECH	1
PAC	1
PAVONI	1
RHONE POULENC AGRO	4
ROUSSEL HOECHST AGROVET	5
SANDOZ	1
SARIAF	4
SCAM	4
SCHERING	7
SEPRAN	2
SIAPA	20
SILJA	8
SIPCAM	12
SIPSA	4
SIVAM	2
VISCHIM	1
TOTALE . . .	134

Ditta: A D I C A

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:

ADIFLUR COMBI

ADIFLUR COMBI

diserbante selettivo di pre-emergenza di cereali e semina autunno-invernale

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento

AVVERTENZE: Nella preparazione della miscela maneggiare di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdure, deposito mangimi. Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il p.a. non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive TRIFLURALIN 23,5%; LINURON 11,75%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: LINURON: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.


TRIFLURALIN: —

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni: —

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CLASSE II



NOCIVO

ADIFLUR COMBI

Composizione:

TRIFLURALIN puro

g. 23,5 (= 245 g/l)

LINURON puro

g. 11,75 (= 123 g/l)

coformulanti q.b. a 100

(contiene xilene)

FRAGI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Irritabile. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrarli l'etichetta). Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

ADICA s.r.l.

Via S. Felice, 136 - BOLOGNA

Stabilimento produttore:

SILLA S.p.A. - Aprilia (Latina)

Registrazione n. 7033 del 26-3-87

del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1-5-10

perita n.:

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

L'ADIFLUR COMBI, per l'associazione dei due principi attivi Trifluralin e Linuron, è un diserbante selettivo di cereali - e - semina autunno-invernale (grano tenero e duro, orzo e segale) ed è in grado di combattere le più importanti infestanti annuali (in dalla loro germinazione (graminacee e dicotiledoni). In particolare è efficace contro graminacee quali: Alopecurus spp (Erba codina). Apera spica venti, Lolium multiflorum. Poa spp: e dicotiledoni quali: Anagallis arvensis, Capsella, Cerastium arvense, Lamium, Erba ruota, Strigolo selvatico, Camomilla, Papavero, Correggiola, Ranuncolo, Rafanistro, Senape, Centocchio, Erba stoma, Galinetta, Veronica, Rusciano medicinale, sensitivi: l'Avena spp, il Galium aparine, la Viola tricolor e la Fumaria officinalis.

L'ADIFLUR COMBI va impiegato in pre-emergenza, nel periodo compreso tra la semina e l'emergenza delle colture, distribuendo la miscela erbicida in superficie, senza interrimento, su un letto di semina ben preparato. Il prodotto si impiega alla dose di 3-4 litri per ettaro in 600-800 litri di acqua.

La dose maggiore è consigliabile per periodi molto soleggiati e caldi oppure quando si prevedono forti infestazioni di graminacee.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non previste in etichetta. Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin in miscela con Linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pino, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, carciofo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.

La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Ditta: AGRIFARMAX

Principio attivo:


CLOROTALONIL

Presidio sanitario:

CLORVAL

CLORVAL

CLASSE II



NOCIVO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:

Clorotaloni g 40 (420 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO:

-nocivo per contatto con la pelle e per ingestione;

-irritante per gli occhi;

-possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

-conservare fuori della portata dei bambini;

-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;

-non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego;

-usare indumenti protettivi e guanti adatti;

-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;

-in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico;

-in caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

AGRIFARMAX di R. BELLONI - Via Goresina BELLOMBIA - ADRIA (RO)

Officina di produzione: **DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO**

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4669 del 25.02.1982

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
RIFERIMENTO PARTITA:

CONTENUTO: 1 LITRO

FUNGICIDA POLIVALENTE IN FORMULAZIONE FLOWABLE

NORME PRECAUZIONALI:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Evitare di respirare i vapori. - Non operare contro vento. - Durante la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Non distarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

AVVERTENZE PARTICOLARI:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. - Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. - Non utilizzare per nessuna ragione questo contenitore per altro uso. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore per i prodotti nocivi. Non utilizzare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

SINTOMI: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

TERAPIA: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E DOSI D'USO: e' un fungicida polivalente ad azione preventiva, dotato di ampio spettro di azione e persistenza. Il suo impiego consente di combattere contemporaneamente i principali parassiti fungini, ad eccezione dell'Oidio.

Culture orticole: sedano, pomodoro, fagiolo, fagiolino, cipolla, ~~patata~~ contro alternaria, cercospora, antracnosi; ~~peroneospora~~.

~~250/280 g/ettolitro; patate: 180/220 g/ettolitro; ~~peroneospora~~: ~~250/280 g/ettolitro~~; ~~alternaria~~ contro ~~peroneospora~~~~

~~250/280 g/ettolitro; colture floreali (rosa, garofano, gladiolo e crisantemo) ed ornamentali in pieno campo o in serra, contro~~

~~ticchiolatura, botrite, ruggini, antracnosi, spetoriosi, fusariosi, alternaria: 200/280 g/ettolitro. Stemperare le dosi in poca acqua,~~

~~aggiungendola poi al totale quantitativo di acqua ed agitando alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea~~

~~Dosi massime di impiego: 1000/1500 g/ha per applicazione.~~

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Associazioni possibili con: - sterolo - inibitori fungicidi - anti-peronosporici sistemici, citotropici e traslaninasi

- dicarbosimidici (antibiotici) - benzimidazolici - rame - zolfo.

Si sconsigliano le miscele con i liquidi emulsionabili.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': In condizioni normali di ambiente e di impiego il prodotto non e' fitotossico.

Alcune colture quali Melone, Pomodoro sono sensibili all'azione del prodotto.

NOCIVITA': il prodotto e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, i pesci e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Ditta: AGRIMONT

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:

LINURON
NEMINFEST

LINURON

ERBICIDA UREICO PER IL DISERBO SELETTIVO DELLA CAROTA, DELLA PATATA, DEL SEDANO E DEL FINOCCHIO

COMPOSIZIONE:

LINURON puro 37,6 (-430 g/l)
Solventi ed emulsionanti g. b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:

irritante per la pelle

CONSIGLI DI PREVENZIONE:

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
(se possibile, mostrare l'etichetta)

AGRIMONT S.r.l.

Sede legale in Piazza della Repubblica, 16 - MILANO

Registrazione Ministero delle Sanità n. 2330 del 23.10.1978


OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RUTILIZZATO

PATITA N.

CLASSE III



FRITANTE

NOTE PRECAUZIONALI:

Conservare la confezione ben chiusa.
Non spalmarla sulla cute o negli occhi.
Non contaminare altre colture o colture d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subito ed ematitici.
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CAMPO D'AZIONE

Controlla le più diffuse infestazioni annuali quali: Polipodio, Frottola, Malva, Anemone, Cissampelos, Ranuncolo, Preparone, Capella. Molto sensibile contro Gramini, Digiandrea e Setaria. Non controlla le erbe perenni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO AD ETTARO PER 600-800 LITRI DI ACQUA

Prima dell'applicazione leggere bene il foglio fino a che sia pieno di zollette ed eliminare una parte in "bavosa" con poca acqua per poter seguirlo per una esatta distribuzione del prodotto.
Dopo il trattamento l'erba non deve essere lavorata per non alterare l'effetto erbicida. Non lubrificare troppo facilmente le ruote e l'attrezzo. In colture a "verde", evitare trattamenti in periodi molto caldi e su terreno estremamente arido o secco. Usare accuratamente il macchinario usato per la distribuzione del prodotto.

CAROTA

a) In pre-emergenza, nell'intervallo che intercorre fra la semina fino a due-sei giorni prima dell'emergenza della coltura, per tutto il periodo di vita e sviluppo di pianticelle:

su terreni sciolti 1,4 litri

su terreni di medio impasto 2 litri

su terreni compatti 2,3 litri

b) In post-emergenza della coltura, prima che le piante infestanti abbiano raggiunto 2-3 centimetri di altezza e possibilmente quando la carota ha 2-3 foglie vere:

su ogni tipo di terreno 1,4-2 litri

PATATA

In pre-emergenza, nell'intervallo che intercorre fra la semina e l'inizio dell'emergenza della coltura:

su terreni sciolti 1,4 litri

su terreni di medio impasto 2 litri

su terreni compatti 2,3 litri

SEDANO E FINOCCHIO

Dopo la presa a dimora delle piante non appena sopraggiunge la crisi del trapianto:

su terreni sciolti Sedano Finocchio

1,4 litri 0,5 litri

su terreni di medio impasto 2,3 litri 1,2 litri

Avvertenze:

Il LINURON agisce per assorbimento radiale e per contatto e presenta efficacia erbicida e relativamente rapida desiccazione nel terreno (3-4 mesi) in tutte le parti della coltura che succedono a quella trattata. Il LINURON non è volatile, né corrosivo, né infiammabile. Il prodotto deve essere conservato in luogo lontano da infestanti, antichiaranti, concimi, sementi.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE:

Agitare prima dell'uso. Sbramare la poca acqua la quantità prescelta di prodotto mescolando accuratamente e versare il tutto nella quantità necessaria di acqua contenuta nel serbatoio, sempre agitando. Durante l'impiego, la pioggia deve essere tenuta costantemente in movimento di un opportuno agitatore meccanico.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto può essere miscelato con altri diserbanti a base di Diuron, Paraquat, Diquat e Tifluralid.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora il trattamento casale di impregnazione insieme il modo della miscelazione completa. Nella preparazione della miscela maneggiare di questi e di fucoli filtrare. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati dove si eviti di altri operazioni agricole, quali depositi, di frutta e verdure, deposito mangimi. Non impiegarlo il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni usate e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il formulato non deve essere impiegato in terreni erbicidi con contenuto di sostanza organica inferiore al 1%.

Fitticità: il prodotto può essere fitto per le colture non indicate in etichetta.

Sospensione: i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarlo esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco. Il rischio delle suddette situazioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SPUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
Stabilimenti di produzione autorizzati: OMICHEM S.p.A. Albano S. Alessandro(BG)
SILVA S.p.A. Avigliana(T)
SFOCAM S.p.A. Salzano nel Lancia(BG)
Taglio autorizzato: 0,1 - 0,2 - 0,5 1 litro

Ditta: AGRONOVA

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:


DISERBAS

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

* Trattato di assottigliamento delle setole e setole - Tallentian (III classe) - p. 23,50
 L'azione p. 11,75 Dicamba - p. 2
 a quadri separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TRIFLURALIN: tosse, irritazione della gola e della cute; irritazione per contatto gastroenterico, nausea, vomito o diarrea. Sono citati soltanto ad esaurimento Terreno sottostante.
DK-AMBA: sintomi irritativi oculari, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile nausea, bruciore. Toxopar. Toxopar tematica. L'assorbire un Centro Antidoti
MODALITA' DI IMPIEGO
 Il DISERBAS e' un diserbante polivalente risultante dalla appropriata associazione di tre (o in i piu' validi eticidi oggi disponibili) le cui azioni si integrano vicendevolmente. Il DISERBAS risulta pertanto efficace sia sulle infestanti a foglia larga sia sulle graminacee che infestano i cereali a semina autunnale e vernata come ad esempio: GRAMINACEE ANNUALE: Alopecurus spp (Erba voluta), Apera spica-venti (Spica venti), Lolium multiflorum (Loggio), Poa spp. (Poa) DICOTILEDONI ANNUALE: Anagallis arvensis (Auregallide), Capsella bursa-pastoris (Bozza del Pastore), Cirsium arvense (Cirsium arvense), Fumaria officinalis (Fumaria), Lamium purpureum (Oncia falsa), Lamium amplexicaule (erba mora), Lithospermum arvense (Strigolo selvatico), Myosotis arvensis (Myosotis), Papaver rhoeas (Papavero), Polygoum aviculare (Covriggolo), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Reptans raphanistrum (Rafanastro), Sisymbrium officinale (Sisymbrio), Sonchus asper (Sonco), Stellaria media (Cantocchia), Thlaspi arvense (Erba stoma), Valeriana officinalis (Gallinella), Veronica spp. (Veronica)
EPOCA E DOSI DI IMPIEGO
 Eseguire trattamenti in pre-emergenza dopo la semina del frumento, orzo, segale e prima che lo stesso emerga dal terreno. La dose di impiego e' di 1,2-5,3 di DISERBAS per ettaro di superficie; questa dose va distribuita uniformemente con le usali pompe iniettate in un volume di acqua (generalmente 400-500 litri) che copra una omogenea distribuzione del prodotto sul terreno. Il DISERBAS deve essere distribuito su un terreno ben preparato, uniformemente smazzicato e privo di zolle che potrebbero limitare o poro ai semi germinati o germinanti.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': Per le popolazioni caratteristiche il DISERBAS deve essere usato tal quale; se ne consiglia pertanto ogni e qualsiasi miscela.
FITOTOSSICITA': Il DISERBAS puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Risulta fitotossico verso la barbabietola da zucchero che non deve essere seminata nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.

ISTRUZIONI SPECIALI: Quando fosse necessaria una ricolorazione devono passare almeno 5 mesi tra l'applicazione del Trifluralin in miscela con Linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e pisce graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocconero, cetriolo, zucca, melanzana, tabacco, cipolla, patata, ortica e cavolifoglio. Non seminare barbabietola (da zucchero, da ortica, da foraggio) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni con meno dell'80% o piu' di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.
AVVERTENZE: Nella preparazione della miscela ammischiare di getto e di facciata filtrata.
 - Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati dove si deve essere applicati operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
 - Non utilizzare gli arboriceti che abbiano contenuto il fitofarmaco.
 - Non impiegare il prodotto in prossimita' di corsi d'acqua.
 - Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
 - Il principio attivo non deve essere impiegato in terreni zibbosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per usi consentiti: ogni altro uso e' proibito. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. In rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
 Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
DA NON VENDERSI SFUSO.

CLASSE II



NOCCIVO

DISERBAS

Diserbante selettivo per frumento, orzo, segale

COMPOSIZIONE
 TRIFLURALIN puro g. 23,50 = 23,5 g/l
 LINURON puro g. 11,75 = 11,75 g/l
 DICAMBA sale dimetilammmonio g. 2 = 20,0 g/l
 Coformulanti q. b. a 100g
 Contiene Xilene ed Alcool isobutilico

FRAGI DI RINGHIO:
 Irritabile
 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
 Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
 Conservare sotto chiave i vasi dalla portata dei bambini
 Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
 Non respirare i vapori
 Non distarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrare l'etichetta)

TITOLO DELL'AUTORIZZAZIONE:
 AGRONOVA S.R.L.
 Via Mazzini, 221/6
 BOLOGNA

DISTRIBUITO DA:
OFFICINA DI PRODUZIONE:
 DIACHEM S.P.A. via Tonale, 15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
 Registrazione Ministero della Sanita' n. 7062 del 18/11/1988

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento
 Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Ditta: BAYER ITALIA

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:

LIFLAN
TRIBUNIL LN

LIFLAN

LIQUIDO EMULSIONABILE

diserbante selettivo per il controllo in pre-emergenza di infestanti graminacee e dicotiledoni in colture di frumento, orzo e segale, carota, sedano, finocchio, soia, fagiolo, fagiolino

LIFLAN

COMPOSIZIONE:

g 100 DI LIFLAN CONTENGONO:
g 23,7 DI TRIFLURALIN PURO (=240 g/l)
g 8,9 DI LINURON PURO (= 90 g/l)
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

CONTIENE XILENE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA.

FRASI DI RISCHIO:

INFIAMMABILE

IRRITANTE PER GLI OCCHI, PER LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI
E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.

NON RESPIRARE I VAPORI. USARE QUANTI ADATTI.

EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE

E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.

IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO

(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 2422 DEL 23/12/1976

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

CLASSE III



NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare corsi d'acqua. Non operare contro vento. AVVERTENZE: nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di fazzoletti filtranti. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali ariati diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, depositi mangimi. Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trafasti di associazione delle seguenti sostanze attive: TRIFLURALIN 23,7%, LINURON 8,9% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.

TRIFLURALIN: -

LINURON:

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, eritema nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitono ed ematuria. Il prodotto contiene anche ISOPORONE che ha un'azione narcotica, irritante per le mucose, con la possibilità di danno cumulativo epatorenale.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Infestanti controllati: graminacee annuali: Alopecurus agrestis, Alopecurus myosuroides, Alopecurus pratensis, Apera spica-venti, Lolium multiflorum, Poa spp., Lolium spp. Dicotiledoni annuali: Alchemilla arvensis, Anagallis arvensis, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Fumaria officinale, Lamium purpureum, Larnium amplexicaule, Lithospermum arvense, Matricaria chamomilla, Mentha sylvestris, Myosotis arvensis, Myosurus minimum, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Ranunculus spp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sonchus asper, Specularia perfoliata, Stellaria media, Thlaspi arvense, Valerianella auriculata, Veronica spp. Liflan non controlla: Avena fatua, A. ludoviciana e A. sterilis, Agropyron repens, Cirsium spp., Tussilago farfara, Convolvulus arvensis.

Colture protette: frumento duro e tenero a semina invernale, orzo a semina invernale, segale a semina invernale, carota, sedano, finocchio, soia, fagiolo, fagiolino. Il Liflan è risultato selettivo verso le principali varietà di frumento, orzo e segale invernali, indipendentemente dal tipo di terreno.

Epoca di impiego: il Liflan deve essere usato dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura da trattare.

Sistema di distribuzione: il Liflan deve essere distribuito per irrorazione e non deve essere incorporato nel terreno.

Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati, il letto di semina deve essere ben preparato (eliminando le zolle grosse) e tutti i semi devono essere ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme.

Istruzioni speciali: qualora fosse necessaria una rivotazione, devono passare almeno 5 mesi tra l'applicazione di Trifluralin in miscela con Linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee lo-

reggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinaco. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% e più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia. Il principio attivo non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

Dose di impiego: sui cereali distribuire 3-3,5 lt per ha per ogni tipo di terreno. Soia, fagiolo, fagiolino, carota, sedano, finocchio, applicare in pre-emergenza della coltura alla dose di 3-3,5 l/ha. Volume di irrorazione: applicare Liflan in 200-600 litri di acqua per ha; il preparato deve essere aggiunto nella bolla nautica a metà di acqua e agitato bene durante il completamento del riempimento. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario; per la distribuzione usare una qualsiasi attrezzatura irrorante a bassa pressione (1,5-5,0 Atm) provvista di barra e di ugelli per erbicidi e di una pompa di capacità adeguata ad assicurare una buona agitazione durante l'irroramento. Si raccomanda di montare una efficiente valvola di chiusura per impedire l'accessibile fuoriuscita del prodotto nelle fasi di partenza, di svolta e di fermata. Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto venga distribuito uniformemente.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: miscela con altri prodotti antiparassitari non sono raccomandate.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZA: conservare il prodotto in locali a temperatura oltre i 5°C, non conservare presso sorgenti di calore o fiamme. Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto. Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Bayer


Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
DOWELANGO S.R.L. - OZZANO EMILIA (BO)

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-5

TRIBUNIL LN

MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE DISERBANTE SELETTIVO
per la lotta in pre-emergenza contro le infestanti graminacee e dicotiledoni del grano
e del girasole

<p>TRIBUNIL LN COMPOSIZIONE: g 100 DI TRIBUNIL LN CONTENGONO: g 60 DI METABENZTIAZURON PURO g 10 DI LINURON PURO COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.</p> <p>FRASI DI RISCHIO: IRRITANTE PER LA PELLE.</p> <p>CONSIGLI DI PRUDENZA: CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. USARE GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).</p> <p>TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126</p> <p>OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)</p> <p>REGISTRAZIONE N. 7200 DEL 3/7/1987</p> <p>QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:</p> <p>PARTITA N.:</p>	<p>CLASSE III</p>  <p>IRRITANTE</p>
---	--

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, e deposito mangimi.

Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il p.a. non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
METABENZTIAZURON 60%, LINURON 10%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METABENZTIAZURON: -
LINURON:

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveletti.

ISTRUZIONI PER L'USO

Grano: epoca d'impiego: dopo la semina e prima dell'emergenza.

Dose d'impiego: 3 kg/ha in terreni leggeri, 3,5 kg/ha in terreni di medio-impatto, 4 kg/ha in terreni pesanti. Diluire la dose consigliata in 500-800 lt d'acqua a seconda del tipo di pompa. Il Tribunil LN è particolarmente efficace contro le seguenti infestanti:

Graminacee annuali: *Alopecurus agrestis*, *Alopecurus*

mysuroides, *Alopecurus pratensis*, *Apera spica venti*, *Lolium multiflorum*, *Poa annua*, *Poa spp.*

Dicotiledoni: *Alchemilla arvensis*, *Anagallis arvensis*, *Arabis thaliana*, *Capsella bursa pastoris*, *Fumaria officinalis*, *Lamium amplexicaule*, *Lithospermum arvense*, *Papaver rhoeas*, *Polygonum spp.*, *Ranunculus spp.*, *Raphanus raphanistrum*, *Sinapis arvensis*, *Matricaria camomilla*, *Stellaria media*, *Thlaspi arvense*, *Valerianella auricula*, *Veronica spp.*

Girasole: 3-4 kg/ha diluiti in 600-800 lt di acqua contro le comuni infestanti intervenendo in pre-emergenza della coltura.

AVVERTENZE: Il diserbo con Tribunil LN non deve essere eseguito su terreni torbosi. La dose minima si impiega in terreni leggeri.

Non impiegare meno di 500 lt di soluzione per ettaro. E' da escludersi anche l'impiego della calciodanamide sia prima che dopo il trattamento con Tribunil LN. A lavoro ultimato lavare accuratamente la pompa ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione. Se in estate dopo la coltura diserbata, viene effettuata una seconda coltura (fagioli, zucchine, erbai di leguminose), e' necessario eseguire un'aratura profonda prima della semina o del trapianto.

N.B.: Si sono dimostrate resistenti al Tribunil LN alcune infestanti annuali, come *Veccia*, *Avena selvatica*, *Galium aparine* e perennanti come *Cirsio*, *Artemisia*, *Romice*, *Convolvolo* e *Tarassaco* (soffione).

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': Il prodotto va impiegato da solo.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Bayer 

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

Ditta: B A S F

Principio attivo:

CLOROTALONIL

Presidio sanitario:

RONILAN C COMBI

9091

RONILAN® C COMBI

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

Fungicida polivalente.

RONILAN® C COMBI**COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:
 Clorotalonil (+) puro g 50
 Vinclozolin puro g 16,7
 Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
 Sede legale:
 Via Marconato, 8
 Cesano Maderno (MI)


Officina di produzione:
 BASF Aktiengesellschaft
 6700 Ludwigshafen
 (REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6460 del 4/9/1985

Partita N°

- Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
- Possibilità di effetti irreversibili
- Rischio di gravi lesioni oculari
- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
- Conservare fuori della portata dei bambini
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia
- In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE
 NON PUO' ESSERE
 RIUTILIZZATO

**NOCIVO**

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI

- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito di mangimi.
- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Clorotalonil 50 %

Vinclozolin 16,7 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Clorotalonil

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ronilan C Combi è un fungicida polivalente a base di due principi attivi complementari nel controllo delle malattie fungine: il Vinclozolin, particolarmente efficace contro botrite, sclerotinia e monilia ed il Clorotalonil, attivo verso numerosi funghi patogeni.

L'impiego di Ronilan C Combi è pertanto consigliato per il controllo preventivo di infezioni da botrite, monilia e sclerotinia associate ad altre malattie fungine quali peronospora, vaiolatura, ruggine, alternaria, ecc.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Pomodoro dose per 100 litri d'acqua 200 - 250 g
 contro botrite, peronospora, alternaria, cladosporiosi, septoria e sclerotinia.
 Impiego autorizzato per un massimo di 3 trattamenti in campo e di 5 interventi in serra, ad una dose massima di impiego, per singola applicazione, di 3,0 Kg di prodotto per ettaro.
 Iniziare i trattamenti dopo la fioritura del primo palco florale e ripetere gli inter-

venti ad intervalli di 10-20 giorni, in funzione dell'andamento climatico.

Fagiolo e fagiolino 200 - 240 g
 contro botrite, sclerotinia, antracnosi, ruggine, peronospora e alternaria
 Impiego autorizzato in campo per un massimo di 2 trattamenti ad una dose, per singola applicazione, non superiore a 2,4 Kg per ettaro

Cipolla 200 - 250 g
 contro peronospora, botrite, ruggine e marciume bianco
 Impiego autorizzato in campo per un massimo di 2 trattamenti ad una dose, per singola applicazione, non superiore a 3,0 Kg di prodotto per ettaro.

Giadiolo e tulipano 200 - 250 g
 contro botrite e ruggine.

Fiorcelli in pieno campo (gerbera, ciclamino e geranio) 150 - 250 g
 contro botrite e ruggine.

Tempi di rientro negli appezzamenti trattati:

- 12 ore in campo

- 24 ore in serra

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Ronilan C Combi è miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio. Si sconsiglia di miscelare il prodotto a poltiglie fortemente alcaline ed a liquidi emulsionabili.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare semenzai o vivai.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

* Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: g 200; Kg 1 - 5 - 10

Ditta: **B I M E X**

Principio attivo:


CLOROTALONIL

Presidio sanitario:

CUPROCLOR

CUPROCLOR

CLASSE II



NOCIVO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:

Clortaloni g 15

Rame metallo (da ossicloruro di rame) g 30

Coformulanti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO:

-nocivo contatto con la pelle e per ingestione;

-irritante per gli occhi;

-possibilita' di effetti irreversibili;

-puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

-conservare fuori della portata dei bambini;

-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;

-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;

-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;

-in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico;

-usare indumenti protettivi e guanti adatti;

-in caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: ITICON N.V. TJDOKSTRAAT 12 - 8380 ZEEBRUGGE (BELGIO)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 4668 del 25.02.82

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

RIFERIMENTO PARTITA:

CONTENUTO: **1 kg**

FUNGICIDA ORGANICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

NORME PRECAUZIONALI:

-Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

AVVERTENZE PARTICOLARI:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.- Non riutilizzare per nessuna ragione questo contenitore per altro uso.- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore per i prodotti nocivi.- Non utilizzare il prodotto in prossimita' dei corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Rame 30%, Clortaloni 15%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Per il RAME: nocivo per ingestione. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle; irritante per gli occhi.

SINTOMI: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi, vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.

Per il CLORTALONIL: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacita' corneale. Sensibilizzante. Puo' provocare danni renali ed atassia.

TERAPIA: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO: CUPROCLOR e' un fungicida organico dotato di ampio spettro d'azione e persistenza. Il suo impiego permette di combattere le principali malattie fungine tranne l'Oidio.

DOSI: Colture floreali (Rosa, Garofano, Gladiolo, Crisantemo) ed Ornamentali in pieno campo o in serra: contro Peronospora, Ticchiolatura, Alternaria, Septoriosi: 400/600 g per Ettolitro intervenendo soprattutto con trattamenti preventivi secondo i normali calendari dei trattamenti. Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose prescelta in poca acqua, aggiungendo poi la miscela cosi' ottenuta al totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente fino alla formazione di una poltiglia omogenea.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli a reazione alcalina come Polisolfuri, Poltiglia Bardoese e Calca. Si sconsigliano le miscele con i liquidi emulsionabili.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto e' tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRA TAGLIA: 100 g

Ditta: CAFFARO**Principio attivo:****CLOROTALONIL****LINURON****Presidio sanitario:****CLORTOCAFFARO 85 DF
CLORTOCAFFARO L
CLORTOCAFFARO FLOW
CLORTOCAFFARO 54 FLOW
CLORTOCAFFARO SL
CLORTOCAF RAMATO DRY FLOW
CLORTOCAF RAMATO FLOW
CLORTORAM BLU DF
CLORTORAM L
LINORTO****TRIFLURON**

CARATTERISTICHE

E' un fungicida che agisce per contatto e viene impiegato nella lotta contro alcune cisticomiche che attaccano le colture orticole, la patata, pomacee e drupacee e le colture floreali ed ornamentali di seguito indicate.

MODALITA' D'IMPiego

Intervenire prima della comparsa dei sintomi, quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Il prodotto si impiega alle seguenti dosi distribuite con pompe a volume normale. Nel caso di pompe a volume ridotto le dosi vanno proporzionalmente aumentate.

COLTURE ORTICOLE

Pomodoro 130-175 g Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi e Septoria intervenire effettuando 3 trattamenti ad intervalli regolari nel corso della stagione iniziando i trattamenti prima della comparsa dei sintomi della malattia. In caso di applicazioni in serra contro le stesse malattie sono consigliati 5 trattamenti. **Sedano** 130-175 g Contro Septoria, Cercospora, Alternaria, Sclerotinia, intervenire prima della comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento altre 2 volte nel corso della stagione.

Cucurbitacee (Melone, Anguria, Cetriolo) 130-175 g Contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi effettuare 3 trattamenti sia in serra sia in pieno campo ad intervalli regolari iniziando i trattamenti prima della comparsa dei sintomi.

Cipolla 130-175 g Contro Peronospora e Botrite intervenire tempestivamente prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità.

Leguminose (fagiolo, fagiolino, pisello) 90-130 g Contro Antracnosi, Septoria, Botrite intervenire prima della comparsa dei sintomi, ripetere il trattamento in caso di necessità.

PATATA 1.3-1.7 kg/ha Contro Peronospora ed Alternaria intervenire effettuando il trattamento prima della comparsa dei sintomi e ripetendolo in caso di necessità.

FRUTTIVERI

Melo, Pero 70-120 g Contro Tachospora, Cancro renale ed Alternaria del pero intervenire solo in pieno campo, sempre in associazione con altri fungicidi sistemici, quali triazoli, o di contatto quali rame, al massimo 4 volte per stagione. In caso di miscela con prodotti rameici occorre seguire le avvertenze sulla sensibilità al rame di alcune cultivars di Melo e di Pero.

Pesce, Salsine 100-120 g Contro Botrytis, Botla, Sclerotinia, Rhabdus, Gloeosporium, Puccinillium, Monilia intervenire sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, quali triazoli, benzimidazoli, o dicarbossimidici al massimo 4 volte per stagione.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI 130-175 g Contro Peronospora, Septoria, Ruggini, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi intervenire prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità. Si consiglia di effettuare saggi preliminari di sensibilità varietale prima di trattare tutta la superficie, soprattutto nel caso di colture in serra.

Preparazione della poltiglia diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Da non applicare con nebbie aeree.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti, ad eccezione dei prodotti alcalini (poltiglia borforosa, poltiglioli).

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati devono essere rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. In caso di inossigenazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Resistenza: nel caso di colture da fiore effettuare saggi preliminari su piccole superfici. Può indurre rugginiosità su mele del gruppo Golden.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta su colture orticole e patate, 21 giorni prima della raccolta su pomacee e su drupacee.

Tempo di ricambio nell'apparato respiratorio: 12 ore in pieno campo; 24 ore in serra.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è proibito. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Non utilizzare il contenitore

Peso kg 0,2-1-5-10

CLORTOCAFFARO 85 DF

Fungicida air-flowable per la difesa di ortaggi, pomacee, drupacee, patata, colture floreali ed ornamentali.

COMPOSIZIONE

- * Clorossoloni puro g 85
- * Coadiuvanti e inerti q. l. a 100

CAFFARO SpA

Via privata Vesto, 1 - MILANO

UFFICINA DI PRODUZIONE:

SIPCAM PHYTEUROF - Zone Industrielle

49260 MONTREUIL-BELLAY (Francia)

Registrazione n. 6022 del 19.7.1984 - Ministero Sanità

FRASI DI RISCHIO


Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o da mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Togliere di doso immediatamente gli indumenti contaminati. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). In caso di contatto con gli occhi lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

PARTITA N.: kg 1

CLASSE II



NOCIVO

AVVERTENZE

Nella preparazione delle miscele miscelare con acqua e di facciale filtrante. Preparare le miscele in recipienti appositi, possibilmente all'aperto, o in locali ariati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito di mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle eventuali confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato, deve avvenire secondo le norme in vigore.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.

Terapia: sintomatica.

Avvertenze: Consultare un Centro Antiveneni.



CARATTERISTICHE

Il prodotto è un anticrottagamico indicato contro le seguenti malattie: Peronospora, Botrite, Tricbotetria, Cercosporio, RugGINE, Marciume bruno, Alternaria, Septorio, Nerezza, Cautsporiosi, Vesicatura, Antracnosi, Moniliosi, Fusariosi non sistemiche, Sclerotinia, Rizoctonia, Rizopne, Gliosporium che attaccano le colture sotto indicato.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Pomacee (Melo, Pero) - Druceacee (Pera, Susino) - Cucurbitacee (Melone, Cocomero, Cetriolo) - Legumi (Fagiolo, Fave, Pisello, Pagnone) - Ortaggi (Sedano) - Piante - Colture fluviali ed Ornamentali
Su Pomacee e Druceacee l'impiego è consentito solo in miscela con fungicidi sistemici.

Le dosi di impiego sono di cc/ml 300-475 pari a g 300-550 per litro di acqua.

Tuttavia ai primi sintomi di malattia o secondo i calcoli consigliati.

Agitare energicamente il prodotto prima di miscelarlo con l'acqua.

Per una buona riuscita del trattamento è consigliabile curare che la vegetazione sia ben coperta dal prodotto.

Non aggiungere prodotti bagnanti-adesivi a sasso che non si siano fatti prima dei saggi di compatibilità.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (pirligli bordeaux, poliofluri).

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione completa.

Precauzioni: Il prodotto può provocare reazioni su varietà di mele del gruppo Golden ed altre a buccia rossa.

Tempo di rientro: 12 ore in pieno campo, 24 ore in serra.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta in orticole e patate, 21 giorni prima su pomacee e drupacee.

Attenzioni: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentitogli altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali decessi derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere deposto nell'ambiente.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO litri: 0,1-1,5-10-20

CLORTOCAFFARO L


Anticrottagamico flowable a largo spettro di azione

COMPOSIZIONE (nitrato e g 100):
* Clortoloni puro g. 30, (= 300 g/l)
* Cofomulanti q.b. a g 100

Registrazione n. 6853 del 11/11/1986 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cervinella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:

CLASSE II



NOCIVO

litri 1

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Togliere di doso immediatamente gli indumenti contaminati. Non distanziare il prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico. (se possibile mostrargli l'etichetta) Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

PARTITA N.:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nella preparazione della miscela mescolarsi di guanti adatti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati dove si effettuano altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito di mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare sotto vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed al sistema.

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni



CARATTERISTICHE

Il prodotto è efficace per la difesa preventiva di pomacee, drupacee, ortaggi, piante e colture floreali ed ornamentali, da Peronospora, Cladosporium, Septoria, Botrite, Cercospora, Sclerotinia, Alternaria, Antracnosi, Ruggine, Turchiatura MODALITA' D'IMPiego

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per ettometro di acque e per ettaro con pompa a volume normale sulle seguenti colture.

COLTURE ORTOLE

Pomodoro 200-300 ml/ha pari a 2-3 l/ha. Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporium e Septoria intervenire effettuando 3 trattamenti ad intervalli regolari nel corso della stagione iniziando prima della comparsa dei sintomi della malattia. Per i trattamenti in serra contro le stesse malattie sono consigliati 5 trattamenti.

Solano 200-300 ml/ha pari a 2-3 l/ha. Contro Septoria, Cercospora, Alternaria, Sclerotinia, intervenire prima della comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento oltre 2 volte in caso di necessità.

Carcofiume (Melone, Anguria, Cetriolo) 200-300 ml/ha pari a 2-3 l/ha. Contro Peronospora, Botrite, Alternaria, Antracnosi, Cladosporium effettuare 3 trattamenti sia in serra sia in pieno campo ad intervalli regolari iniziando prima della comparsa dei sintomi.

Cipolla 200-300 ml/ha pari a 2-3 l/ha. Contro Peronospora, Ruggine, Botrite intervenire tempestivamente prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità.

Leguminose (fagiolo, fagiolo, pisello) 200-250 ml/ha pari a 2 l/ha. Contro Antracnosi, Ruggine, Septoria, Botrite intervenire prima della comparsa dei sintomi. Ripetere il trattamento in caso di necessità.

PATATA 2-3 l/ha. Contro Peronospora ed Alternaria intervenire effettuando il trattamento prima della comparsa dei sintomi e ripetendolo in caso di necessità.

FRUTTIERE

Melo, Pero 100-200 ml/ha pari a 1,2-2,0 l/ha. Contro Turchiatura, Ceneri rinate ed Alternaria del pero intervenire solo in pieno campo, sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, quali triazoli, o di contatto quali rame, al massimo 4 volte per stagione. In caso di miscela con prodotti rinate occorre seguire le avvertenze sulla sensibilità al rame di alcune cultivars di Melo e di Pero.

Pesce, Susino 300-400 ml/ha. Contro Botrytis, Botrite, Sclerotinia, Rizopne, Gloeosporium, Peronospora, Monilia intervenire sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, quali triazoli, benzimidazoli, o dicarbossimidi al massimo 4 volte per stagione.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI (rosa, garofano, crisantemo, giudiolo) 250-300 ml/ha

Contro Peronospora, Septoria, Ruggine, Antracnosi, Cladosporium e Turchiatura intervenire prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità. Si consiglia di effettuare saggio preliminarmente di sensibilità varietale prima di trattare tutta la superficie, soprattutto nel caso di colture in serra. Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura. Agitare energicamente la confezione prima dell'uso.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti, ad eccezione dei prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polissolfuri). **Avvertenze:** in caso di miscela con altri formulati devono essere rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. In caso di irradiazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitosensibilità: nel caso di colture da fiore effettuare saggio preliminarmente su piccole superficie. Può indurre rugginosità su mele del gruppo Golden.

Sequenziare i trattamenti 1-4 giorni prima della raccolta su colture erbacee e perenni, 21 giorni prima della raccolta su pomacee e su drupacee.

Tempo di rientro all'appezzamento trattato: 12 ore in pieno campo; 24 ore in serra.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle prodotte istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Non riutilizzare il contenitore

OFFICINE DI PRODUZIONE: ADRIA Cavanella Po (RO)

DIACHEM - Albano S. Alessandro (BG)

SIPCAM SpA - Salerno s/Lambro (MI)

CONTENUTO Litri 0,1 - 1 - 5 - 10

CLORTOCAFFARO FLOW

Fungicida floreali per la difesa di pomacee, drupacee, ortaggi, patata, colture floreali ed ornamentali.

COMPOSIZIONE

- Clortocafarolo puro 40,9 (±500 g/l)
- Coadiuvanti e inerti q. b. a 100

CAFFARO SpA
Via privata Vasto, 1 MILANO
Officina di produzione:
Adria - Cavanella Po (RO)

Registrazione n. 7051 del 16/4/87 - Ministero Sanità

FRASI DI RISCHIO:

Possibilità di effetti irreversibili. Nocivo a contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrarli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

PARTITA N.:

CLASSE II



NOCIVO

1 Litro

AVVERTENZE

Nella preparazione delle miscele maneggiare di guanti e di facciale filtrante. Preparare le miscele in recipienti appositi, possibilmente all'aperto, in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni aziendali, quali deposito di frutta e verdura, deposito di mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle eventuali confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato, deve avvenire secondo le norme in vigore.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.

Terapie: sintomatiche.

Avvertenze: Consultare un Centro Antiveletti.



CARATTERISTICHE

Il prodotto è efficace per la difesa preventiva di pomacee, drupacee, ortaggi, patata e colture floreali ed ornamentali da Peronospora, Oidiosporiosi, Septoria, Botrite, Cercospora, Sclerotinia, Alternaria, Atrac-

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi con pompe a volume normale sulle sottostaccate colture.

COLTURE ORTOFOLE

Pomodori 150-225 ml/ha (1,5-2 l/ha) Contro Peronospora, Alternaria, Oidiosporiosi e Septoria intervallare effettuando 3 trattamenti ad intervalli regolari nel corso della stagione iniziandoli prima della comparsa dei sintomi della malattia. Per i trattamenti in serra contro le stesse malattie sono consigliati 5 trattamenti.

Solano 150-225 ml/ha (1,5-2 l/ha) Contro Septoria, Cercospora, Alternaria, Sclerotinia, intervallare prima della comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento altre 2 volte in caso di necessità.

Cucurbitacee (Melone, Anguria, Cetriolo) 150-225 ml/ha (1,5-2 l/ha) Contro Peronospora, Botrite, Alternaria, Atracnosi, Oidiosporiosi, effettuare 3 trattamenti sia in serra sia in pieno campo ad intervalli regolari iniziandoli prima della comparsa dei sintomi.

Cipolla 150-225 ml/ha (1,5-2 l/ha) Contro Peronospora, Ruggine, Botrite intervenire tempestivamente prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità.

Lupinacee (fagiolo, fagiolino, pisello) 150-200 ml/ha (1,5 l/ha) Contro Atracnosi, Ruggine, Septoria, Botrite intervenire prima della comparsa dei sintomi. Ripetere il trattamento in caso di necessità.

PATATA 1,5-2 l/ha Contro Peronospora ed Alternaria intervenire effettuando il trattamento prima della comparsa dei sintomi e ripetendolo in caso di necessità.

FRUTIFERE

Melo, Pero 70-150 ml/ha (0,6-1,2 l/ha) Contro Tachibolium, Cuscuti marziali ed Alternaria del pero intervallare solo in pieno campo, sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, quali triazololi, o di contatto quali rame, al mescolio 4 volte per stagione. In caso di miscela con prodotti rameici occorre seguire le avvertenze della etichetta al rame di alcune cultivari di Melo e di Pero.

Pesce, Salmone 70-150 ml/ha (1-1,2 l/ha) Contro Botrytis, Botria, Sclerotinia, Rizogonia, Gloeosporium, Fusicarium, Monilia intervenire sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, quali triazololi, benzimidazolici, o decaboronici al massimo 4 volte per stagione.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI (rosa, geranio, citrullone, gladiolo) 200-250 ml/ha Contro Peronospora, Septoria, Ruggine, Alternaria, Atracnosi, Oidiosporiosi e Tachibolium intervenire prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità. Si consiglia di effettuare saggio preliminarmente di sensibilità varietale prima di trattare tutta la superficie, soprattutto nel caso di colture in serra.

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura. Agitare energicamente la confezione prima dell'uso.

Da non applicarsi con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti, ad eccezione dei prodotti alcalini (poltiglia bordolese, poltiglia di rame).

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati devono essere rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. In caso di interazione informare il medico della miscelazione completa.

Fitotossicità: nel caso di colture da fiore effettuare saggio preliminarmente su piccole superfici. Può indurre rugginelle su specie del gruppo Golkea.

Sospensione i trattamenti 14 giorni prima della raccolta in colture orticole e patata, 21 giorni prima della raccolta nei pomacei e nei drupacei.

Tempo di rientro nell'impiego: trattata 12 ore in pieno campo; 24 ore in serra.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non riutilizzare il contenitore.

UFFICINE DI PRODUZIONE ADRIA CAVANOLA Po (RO)

CONTENUTO Litri 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10

CLORTOCAFFARO 54 FLOW

Fungicida flowable per la difesa di pomacee, drupacee, ortaggi, patata, colture floreali ed ornamentali.

- COMPOSIZIONE
* Clorotoloni puro 54 g (=220 gr)
* Coadiuvanti e inerti g. b. a 100

CAFFARO SpA
Via privata Vesto, 1 - MILANO
Officina di produzione:
Adria - Cavanola Po (RO)

CLASSE I



TOSSICO

1 Litro

Registrazione n. 5830 del 27/13/1984. Ministero Sanità

FRASI DI RISCHIO
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI FRUIZIONE:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti ed bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non distarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

PARTITA N:

AVVERTENZE
Nella preparazione delle miscele munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare le miscele in recipienti appositi, possibilmente all'aperto, in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito di mangimi. Non riutilizzare gli imbuti che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento degli eventuali contenitori vuoti e dell'eventuale prodotto non utilizzato, deve avvenire secondo le norme in vigore.

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed alti.
Terapia: sintomatica.
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.



CLORTOCAFFARO SL

Anticrittogamico flowable a largo spettro di azione

COMPOSIZIONE (effettiva g/l):
• Clortolani puro g. 60, (= 615 g/l)
• Clortolani g. b. = g. 100

Registrazione n. 6852 del 11/11/1986 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavacchia Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:



CLASSE I

TOSSICO

litri l

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Possibile di effetti irreversibili.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Tolgliere di doso immediatamente gli indumenti contaminati. Non diluire il prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

PARTITA N.:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti adatti e di fessiale filtrate. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito di mangimi. Non realizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore, non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi irritante per le cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.
Terapia sintomatica.
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveletti



CARATTERISTICHE

Il prodotto è un anticrittogamico indicato contro le seguenti malattie: Peronospora, Botrite, Turchiatura, Cercosporiosi, Ruggini, Marciume bruno, Alternaria, Septorio, Nervo, Chetoparosi, Valsatura, Antracnosi, Moniliosi, Fusariosi non sistemiche, Rizozoniose, Rizozoniose, Rizozoniose, Rizozoniose che attaccano le colture sotto indicate.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Pessegue (Melo, Pero) - Drupeacee (Pera, Susino) - Cerealicole (Melone, Cocomero, Cetriolo) - Legumi (Pisello, Fave, Fagiolo, Fagiolino) - Ortaggi (Sedano) - Felvia - Colture floreali ed Ornamentali
Su Pomacee e Drupeacee l'impiego è consentito solo in miscela con fungicidi sistemici.

Le dosi di impiego sono di cc/ml 150-270 per a g 200-350 per litri di acqua.

Trattare ai primi sintomi di malattia o secondo i calendari consigliati.

Agitare energicamente il prodotto prima di miscelarlo con l'acqua.

Per una buona riuscita del trattamento è consigliabile curare che la vegetazione sia ben coperta dal prodotto irrorato.

Non aggiungere prodotti legnati ad altri a meno che non si siano fatti saggi di compatibilità.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (pistiglia botanica, poliniflora).

Avvertenze: in caso di miscela con altri fungicidi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può provocare rugosità su varietà di mele del gruppo Golden ed altre a buccia rossa.

Tempe di risaleto: 12 ore in pieno campo, 24 ore in serra.

Sospensione i trattamenti 14 giorni prima della raccolta se estiva e prima, 21 giorni prima su pomacee e drupeacee.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura antiparassitaria e per gli usi consentiti; ogni altro uso è vietato.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni dovuti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO litri: 0,1-1-5-10-20

CARATTERISTICHE

Il prodotto è efficace per la difesa preventiva delle Pomacee, Drupece, Ortaggi, Patata, Colture floreali ed ornamentali da Peronospora, Cladosporioni, Septoria, Botrite, Cercospora, Sclerotinia, Alternaria, Ruggini, Nematodi.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto s'impiega alle seguenti dosi con pompe a volume normale sulle sottoelencate colture:
COLTURE ORTICOLE
Pomodoro: 300-400 ml/m² (2,5-3 l/ha). Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporioni e Septoria. Numero massimo trattamenti: 3 in pieno campo; 5 in serra.
Sedano: 300-400 ml/m² (2,5-3 l/ha). Contro Septoria, Cercospora, Alternaria, Sclerotinia. Ripetere il trattamento al massimo altre 2 volte.

Cavolfiore (Meione, Asparia, Cirolo) 300-400 ml/m² (2,5-3 l/ha). Contro Peronospora, Alternaria, Alternaria, Cladosporioni effettuare 3 trattamenti sia in serra, sia in pieno campo ad intervalli regolari.
Cipolla 300-400 ml/m² (2,5-3 l/ha) Contro Peronospora, Botrite, ripetedo il trattamento in caso di necessità.
Lettucine (foglio, fagiolo, pisello) 250-300 ml/m² (2 l/ha). Contro Antracnosi, Septoria, Botrite. Ripetere il trattamento in caso di necessità.

PATATA 3-4 l/ha. Contro Peronospora ed Alternaria. Ripetere il trattamento in caso di necessità.
FRUTTIFERI: intervenire solo in pieno campo ed al massimo 4 volte per stagione.
Mela, Pera: Trattamenti preventivi 300-400 ml/m² (2,5-3 l/ha)
Trattamenti preventivi 200-300 ml/m² (1,5-2,5 l/ha). Contro Tetrachlora (in pre-fioritura), Ceneri ramate, Ruggine ed Alternaria del pero. Il prodotto va usato solo in miscela con fungicidi sistemici.
Pera, Sestiva: trattamenti preventivi 300-400 ml/m² (2,5-3 l/ha) contro Botrite e Corticeo, Ceneri ramate, Monilia, Sclerotinia, Cladosporium, Rizzopite, Penicillium, Botrytis, Nereve. Il prodotto va usato solo in miscela con fungicidi sistemici.

COLTURE FLOREALI ed ORNAMENTALI (rosa, geranio, gladiolo) 250-300 ml/m² Contro Peronospora, Septoria, Ruggine, Alternaria, Antracnosi, Cladosporioni, Tetrachlora. Effettuare saggio di sensibilità vegetale prima di trattare tutta la superficie, soprattutto nel caso di colture in serra.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in commercio.
Avvertenze in caso di miscela con altri prodotti deve essere rispettato il periodo di carezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della situazione completa.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura.
Se poco, suino e sulle seguenti varietà di melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Greenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morganthoff, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Reaneta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fodda, Bianca Ladiga d'Avranche, Beirra Chingua, Passocrasna, R.C. William, Dott. Jules Guyot, Fenotia di Clapp, Kaiser, Beirra Giffard) e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavarella Po (RO)
DIACHEM - Albano s. Alessandro (BG)

Contenuto litri 0,25-0,5-1-5-10-20

Tempo di attesa 12 ore in pieno campo; 24 ore in serra
Avvertenze: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavarella Po (RO)
DIACHEM - Albano s. Alessandro (BG)


Contenuto litri 0,25-0,5-1-5-10-20

CLORTOCAF RAMATO FLOW

Funghiada rilevabile per la difesa di Pomacee, Drupece, Ortaggi, Patata, Colture floreali ed ornamentali.

- COMPOSIZIONE**
- * Clorotoloni puro g. 20 (=300 g/l)
 - * Fiume metallo g. 16 (=240 g/l)
 - * (da ossicloruro tetramico)
 - * Coformulanti ed inerti g. b..s. g 100

CLASSE II



NOCIVO

1 litro

Registrazione n. 7427 del 25/12/1988 - Ministero della Sanità
CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
Officina di produzione - Adria Cavarella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti, mangimi, o bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di malessere consultare il medico, se possibile mostrandogli l'etichetta. In caso di contatto con gli occhi lavarsi accuratamente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Partita n.

AVVERTENZE
Nella preparazione della miscela manarsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito di mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di miscela delle seguenti sostanze attive: Ossicloruro di Rame e Clorotoloni le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione.

CLORTALONIL: Sostanza irritante per la cute e mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibilità di opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.
RAMME: Sostanza denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose. Danno epatico e renale del SNC. Emotici. Vomito con emissione di materiale di color verde, brucioni gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapie: sintomatica
Avvertenze: Consultare un Centro Antidoti.



CARATTERISTICHE

E' un fungicida protettivo che agisce per contatto e viene impiegato nella lotta contro alcune malattie che attaccano le colture orticole, la patata, pomacee e drupacee.

MODALITA' DI IMPIEGO

Intraprese prima della comparsa dei sintomi, quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Il prodotto si impiega alle seguenti dosi distribuite con pompe a volume normale. Nel caso di pompe a volume ridotto le dosi vanno proporzionalmente aumentate.

COLTURE ORTICOLE

Passarosa 300-400 g Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporium e Septoria, intervensive effettuando tre trattamenti ad intervalli regolari nel corso della stagione, iniziando i trattamenti prima della comparsa dei sintomi della malattia. In caso di applicazioni in terra contro le stesse malattie sono consigliati cinque trattamenti. Sedano 300-400 g Contro Septoria, Alternaria, Schizotheca, intervensive prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento altre due volte nel corso della stagione. Cus-cus (cuscumero, melanzana, peperone) 300-400 g Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporium, Cladosporium effluente (cuscumero, melanzana, peperone) 300-400 g Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporium, Cladosporium effluente (cuscumero, melanzana, peperone) 300-400 g Contro Peronospora e Botrite intervensive temporaneamente prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di accessi. Leguminose (fagiolo, fagiolina, pisello) 300-400 g Contro Antracnosi, Septoria, Botrite intervensive prima della comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento in caso di accessi. PATATA 3-3,5 kg/ha Contro Peronospora ed Alternaria ripetendo il trattamento prima della comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento in caso di intervensive effettuando il trattamento prima della comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento in caso di accessi. COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI 300-400 g Contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi e Tichodactena, con trattamenti preventivi. FRUTTIVERI Mele, Pero 300-400 g Contro Tichodactena, Clacuri nematici ed Alternaria del pero intervensive solo in pieno campo e solo in miscela con altri fungicidi sistemici, quali triazoli, benzimidazoli o difenossidati al massimo 4 volte per stagione. Pesca fungicidi sistemici, quali triazoli, benzimidazoli o difenossidati al massimo 4 volte per stagione. Pesca Susino 300-400 g Contro Botrite, Botrytis Sclerotinia Ribwort, Gloeosporium, Peronospora, Monilia intervensive scoprite con altri fungicidi sistemici, quali triazoli, benzimidazoli, o difenossidati al massimo 4 volte per stagione.

Preparazione della poltiglia

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

CAUSABILITA': il prodotto e' compatibile con i più comuni antimicotici.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri fungicidi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della microdose somministrata.

Filosofia: non si deve trattare durante la fioritura. Su peronospora e varicela di mele (*) e di pero (**).

caprosistibile il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne consiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. (*) Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgendunf, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Reietta del Canada, Rosa Manoussou.

(**) Jabate Red, Buona, Luigia d'Avvenezze, Battara Chiarosa, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyon, Favorita di Clapp, Kaiser, Battara Giffard.

Tempo di ritardo: 12 ore in pieno campo, 24 ore in terra.

Sospensione i trattamenti 20 giorni prima del raccolto su orticole e patata, 21 giorni prima su pomacee e drupacee.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentitivi altro uso e' vietato.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SEPARATO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PESSO KG 0,245-1-10

CLORTORAM BLU DF Fungicida cu ro-rganico dry flowable per la difesa di ortaggi, patate, colture floreali ed ornamentali.

- COMPOSIZIONE (per kg di prodotto):
- Zorolaloni puro 93
- base metallica 9
- da ossidazione capta calcio 9
- riformulanti q.b. a g 100

CLASSE II



NOCIVO

CAFFARO S.p.A. Via P. Vasta 1 - MILANO OFFICINA DI PRODUZIONE S.P.C. M. PLYTEUROF - MONTI SEUIL BELLAY (Francia) FRAS: DI RISCHIO: Irritare le parti degli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle. Possibili effetti d'effetti irreversibili. Nuovo a contatto con la pelle e per ingestione. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare lontano da altri ericidi mangimi e da cani. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli il prodotto). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare se il caso. Non respirare le polveri. PART. TA. N. Kg 1

NOTA PER LA CLASSE II:
Non si deve trattare durante la fioritura. Su peronospora e varicela di mele (*) e di pero (**).
CAUSABILITA': il prodotto e' compatibile con i più comuni antimicotici.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri fungicidi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della microdose somministrata.
Fitosistibile il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne consiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgendunf, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Reietta del Canada, Rosa Manoussou.
(**) Jabate Red, Buona, Luigia d'Avvenezze, Battara Chiarosa, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyon, Favorita di Clapp, Kaiser, Battara Giffard.
Tempo di ritardo: 12 ore in pieno campo, 24 ore in terra.
Sospensione i trattamenti 20 giorni prima del raccolto su orticole e patata, 21 giorni prima su pomacee e drupacee.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentitivi altro uso e' vietato.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SEPARATO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO



CARATTERISTICHE

Il prodotto è un anticrittogamico ad ampio spettro d'azione efficace contro numerose malattie dei fruttiferi, delle colture orticole, floreali ed industriali. La particolare formulazione in pasta fluida colloidale, oltre alla facilità di impiego, garantisce prontezza d'azione ed adattività.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

POMACEE (melo, pero)
Tritchiolatura, Cancri rimesali, Momiola

trattamenti autunno-invernali ml/m² 750-1125 pari a g 1000-1500/m² d'acqua

DRUPACEE (pesco, susino)
Bolla e Coriolo in trattamenti autunno-invernali ml/m² 750-1125 pari a g 1000-1500/m² d'acqua

Intervale al massimo 4 volte per stagione.

COLTURE ORTICOLE (cucurbitacee, pomodoro, fagiolo, pisello, sedano, aglio)

Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi ml/m² 300-375 pari a g 400-500/m² d'acqua

Intervale al massimo 3 volte per stagione.

COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI

Peronospora, Tritchiolatura, Alternaria, Septoria, Antracnosi ml/m² 300-375 pari a g 400-500/m² d'acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in commercio.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura.

Su peso, sudario e varietà di melo (Abbondanza Bellfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravacastice, Jonahan, Rose Beauty, Mongendafi, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta dei Canada, Rosa Maniowana) comprovati il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se consiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Nechrità: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospenderlo 15 giorni prima del raccolto per pomacee e drupacee, 20 giorni per le altre colture. Tempo di risalita: 12 ore in pieno campo, 24 ore in serra.

Attenzioni: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consueti: ogai altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

OFFICINE DI PRODUZIONE:

Adria Cavarella Po (RO)

Contenuto litri 1-5-10


CLORTORAM L

Anticrittogamico flowable polivalente

- COMPOSIZIONE (riferta a g 100):**
- * Fiume metalo g. 18 (= 240 g/l)
 - * (sotto forma di ossicloruro) g. 8 (= 110 g/l)
 - * Coloranti puri q. b. a g 100
 - * Corrodenti q. b. a g 100

Registrazione n. 6855 del 11/11/1986 - Ministero della Sanità

CLASSE II



NOCIVO

litri 1

CATTARO S.p.A.

Via Privata Vero 1 - MILANO

OFFICINE DI PRODUZIONE:

Adria Cavarella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:

Possibilità di effetti irreversibili. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilità per inalazione e contatto con la pelle. Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o consoci d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nella preparazione della miscela menziri di guanti e di facciale filtrante.

Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agrarie, quali deposito di frutta e verdura, deposito di mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità dei consoci d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Traiteri di associazione delle seguenti sostanze attive:

CLOROTALONIL e RAME OSSICLORURO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOROTALONIL

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassici. Terapia sintomatica.

RAME OSSICLORURO

Sintomi: desaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica.

Avvertenze: Consultare un Centro Antiveneni



LINORTO

Diserbante selettivo per colture erbive e per maïs.

- COMPOSIZIONE (riserva a g 100):**
- * Linuron puro g 37,5 (430 g/l)
 - * Coloranti g. b. a g 100

Registrazione n. 2799 del 19/4/1978 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
 Via Privata Vesto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
 Adria Cavanello Po (RO)


FRASI DI RISCHIO:

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.: Litri 1

CLASSE III



IRRITANTE

NORME PRECAUZIONALE:
 Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o colti d'acqua.
NORME PARTICOLARI:
 - Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
 - Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto e in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e di verdura, deposito di mangimi.
 - Non utilizzare le confezioni che abbiano contenuto il fitofarmaco.
 - Non impiegare il prodotto in prossimità di colti d'acqua.
 - Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
 - Il prodotto non deve essere impiegato in terreni adibiti al contenzione in sostanza organica inferiore all'1%
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
 Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite acuta, irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati sintomi ed esantemi.
 Terapia: sintomatica.
 Avvertenze: Consultare un Centro Antidoti

OFFICINE DI PRODUZIONE: - Adria - Cavanello Po (RO)
 - Chiara S. Agostino (FE)
 - Diachien Albano S. Alessandro (BG)
 - Silla Aprilia (LT)

CONTENUTO Litri: 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10



CARATTERISTICHE

Diserbante selettivo per colture erbive, patata, girasole, soia, cereali attivi prevalentemente per via radicale con azione secondaria anche per via fogliare. Controllo efficace anche nei rapporti infestati: Echinochloa (Ciarrose), Polygamon persicaria (Pezicaria), Maritocina chamosilla (Camosilla), Plantago major (Piantaggine), Euphorbia spp. (Bastardo), Abopocara agreste (Coda di volpe), Veronica spp. (Veronica).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi sottorportate sulle seguenti colture:

COLTURE OKKICOLE

- Appaço
- Intervento prima della comparsa dei turioni alla dose di 0,7 - 1,65 l/ha
- Carobò
- Effettuare il trattamento dopo la raccolta dei capolini oppure in post-trapianto dei carciofi alla dose di 0,7 - 1,65 l/ha
- Carota
- Trattamenti pre-emergenza 2,40 l/ha
- Trattamenti post-emergenza dopo la formazione del 2° paio fogliare 1,50 - 2,40 l/ha
- Sodio e rapa
- Intervento alcuni giorni dopo il trapianto, quando la coltura ne ha superato la crisi alla dose di 1,50 - 2,40 l/ha
- Finocchio
- Intervento quando la coltura ha differenziato la quarta foglia alla dose di 0,50 - 1,2 l/ha
- Fagiolo e Fagiolino
- Intervento subito dopo la semina in pre-emergenza delle colture alla dose di 0,7 - 1,40 l/ha

PIATATA

Dopo la semina o dopo la seconda rincalzatura che si effettua in corrispondenza delle carenze delle prime piantine, effettuare il trattamento diserbante impiegando 1,5 - 2,40 l/ha
 Il prodotto va sempre impiegato in miscela con altri prodotti (es.: Trifluralin, Alactor, Moundstar, Pendi-metalin, ecc.)

CEREALI

- Fruentino, Orzo, Segale
- Intervento in pre-emergenza subito dopo la semina alla dose di 0,7 - 1,2 l/ha
- Maïs
- Intervento subito dopo la semina in pre-emergenza della coltura alla dose di 1,2 l/ha
- Nei terreni sciolti o di medio impasto dovranno essere impiegate sempre le dosi più basse.
- Il prodotto va sempre impiegato in miscela con altri prodotti (es.: Alactor, Altrazina, ecc.)
- GIRASOLE, SOJA
- Intervento in pre-emergenza della coltura subito dopo la semina alla dose di 1 - 1,5 l/ha
- N.B. - Nei terreni sciolti o di medio impasto dovranno essere impiegate sempre le dosi più basse.

Da non applicare con mezzi aerei
 Compatibilità possibile impiegare il prodotto in miscela estemporanea con altri formulati erbicidi con azione di tipo sistemico. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare di compatibilità prima della preparazione della miscela.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora al verificarsi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
 Sospensione il trattamento 48 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è vietato. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
 Il contenitore completamente svuotato non può essere disperso nell'ambiente.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

TRIFLURON

Eradicida liquido emulsionabile per il controllo in pre-emergenza delle infestanti graminacee e dicotiledoni in colture di cereali a semina autunnale.

- COMPOSIZIONE (riserva a g 100):**
- Triflurone puro g 30
 - Liruron puro g 15
 - Coformulanti q.b. a g. 100

Registrazione n. 7565 del 25/10/1988 - Ministero della Sanità


CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
UFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavacchi Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare i vapori. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE II



NOCIVO

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Derivato dell'erica.

Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, irritazione della gola e dell'uculo. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitaneamente ed epatite.

Tempo di latenza: 0.

Avvertenze: Consultare un Centro Antidoti.

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è efficace contro numerose infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali che infestano le colture di cereali (frumento tenero e duro, orzo, segale) a semina autunno-invernale.

Sono particolarmente sensibili al prodotto le seguenti infestanti:

- Monocotiledoni:** Alopecurus spp., Apera spica-veali, Lolium spp., Poa spp., Setaria spp.
Dicotiledoni: Asperula arvensis, Atriplex spp., Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Galio apariteoides, Parnassia officinalis, Lamium spp., Litochloa arvensis, Matricaria spp., Myricaria arvensis, Peganum harmala, Polygonum spp., Rumex crispus spp., Rorippa nasturtium-aquaticum, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus spp., Stellaria media, Sparganium arvense, Thlaspi arvense, Veronica spp., Viola spp.

Sono invece resistenti: Avena spp., Agropyrum repens, Cirsium spp., Tussilago farfara ed in genere tutte le infestanti perenni.

Si consiglia d'intervenire subito dopo la semina della coltura e prima della emergenza delle infestanti su terreno precedentemente ben preparato, livellato e seminato alla dose di 2,5-3,0 l/ha in 200-600 litri di acqua, applicando le dosi più elevate nei terreni argillosi o moderatamente organici e se si prevedono forti infestazioni di graminacee o se la temperatura è elevata al momento del trattamento.

Seminare a profondità costante in modo che tutti i semi siano ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme.

Nei terreni torbosi e fortemente organici il prodotto perde di efficacia, in questo caso assorbire, e quindi se ne scostiglia l'uso.

Da non applicarsi con mezzi aerei.

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto in poca acqua a parte, indi versarlo nel totale quantitativo di acqua, mantenendo in agitazione la pompa.

Istruzioni speciali: Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi tra l'applicazione del Triflurone in miscela con Liruron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, coccomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, zucca e cavoli, spinacio.

Non seminare biotica, (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.

La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti 18% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con altri prodotti in formulazione liquida emulsionabile e in polvere bagnabile. Non è compatibile con i formulati flocculanti.

Si consigliano prove preliminari di miscibilità prima di preparare la miscela nella botte irroratrice.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Finalità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospensione: il trattamento prima dell'emergenza della coltura.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni e condizioni essenziali per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 0,5-1,5-10



Ditta: C H E M I A

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:

LURON



LURON

DISERBANTE SELETTIVO IN FORMULAZIONE FLOWABLE

LURON

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:

- Luron puro g. 45 (566 gr)
- Sospensivi, bagnanti ed inert. q.b.a g. 100


NATURA DEL RISCHIO:

Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

CLASSE II



N O C I V O

Contenuto:



Chemia spa

44040 S. Agostino (FE) - S.S. 255 - Km. 46

Officina di produzione CHEMIA SpA - 44040 S. Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 2090 del 22/12/1975

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RUTILIZZATO
Riferimento partita

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Durante la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Non distanziarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Prescrizioni particolari: Nella preparazione delle miscele munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, depositi di mangimi. Non utilizzare involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanze organiche inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

SINTOMI: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazioni della gola e della cute. L'ingestione può causare gastrite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subituro ed emeturia.

TERAPIA: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Il prodotto agisce per assorbimento radicale e per contatto ed è indicato per il diserbo del mais e delle colture oricole delle più comuni infestanti quali: capsella, convulvo, porcella, coraggicola, camomilla, anagallide, persicaria, senape, erba morella, poia, coda di topo, portulaca, papavero, lamio.
Risultano resistenti: fumaria, coda di volpe, avena, gramigna, villucchio, stoppone, cipero. Per il diserbo del mais il prodotto si impiega in pre-emergenza subito dopo la semina o al massimo tre giorni dopo la semina, interrando il mais a non meno di quattro centimetri per evitare manifestazioni fitossiche. Le dosi di impiego per ettaro (esclusi i terreni sabbiosi) sono di ml. 800 per i terreni di medio impasto sempre in miscela con altri prodotti attivi e di ml. 1000 per i terreni pesanti argillosi. Per il diserbo di Carota, Sedano il prodotto si impiega in pre-emergenza alla dose di ml. 1000 per i terreni sciolti, ml. 1500 per i terreni di medio impasto e di ml. 1700 per i terreni pesanti ed argillosi; per il finocchio ml. 300 per i terreni sciolti, ml. 500 per i terreni di medio impasto e ml. 800 per i terreni pesanti argillosi. Il prodotto può essere impiegato sulle colture di carote in post-emergenza quando le carote presentano 2 - 3 foglie vere. Per il diserbo della patata il prodotto si impiega subito dopo il collocamento a dimora dei tuberi, comunque prima della nascita della patata, alla dose di ml. 1000 per i terreni sciolti, ml. 1500 per i terreni di medio impasto e sempre in miscela con altri prodotti attivi o al massimo con ml. 1700 nei terreni pesanti-argillosi. Per il diserbo dai fagioli e fagiolini il prodotto si impiega alla dose di ml. 500 per i terreni sciolti, ml. 800 per i terreni a medio impasto e di ml. 1000 per i terreni pesanti-argillosi. Il trattamento va effettuato subito dopo la semina e le dosi suddette non devono essere assolutamente superate. Per l'efficacia del trattamento a dosi così ridotte è necessario provvedere ad una irrigazione superficiale subito dopo il trattamento o al massimo qualche giorno dopo. Diluire il prodotto in 800/1000 litri di acqua e trattare in modo uniforme tutta la superficie del campo. Stemperare il prodotto in poca acqua e diluire poi nel totale quantitativo di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto può essere usato in miscela con altri diserbanti ma distanziato dalle concimazioni.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le Norme Precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il Medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO: 200 ml 1 - 5 - 10 litri

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Ditta: CHIMIBERG

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:

**LINURON CHIMIBERG
TRILIANE**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Derivati dell'area Sintetici, durante l'impiego può causare congiuntivite, irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito o diarrea. Sono citati rubellato ed ematema. Tempia in ibramina.

Consultare un medico.

CARATTERISTICHE

IL LINURON CHIMBERG è un diserbante selettivo specifico per la distruzione delle specie erbacee annuali di numerose colture. Espone la propria azione per via radicale e fogliare e combatte *Amaranthus retrofractus* (Amaranto), *Cappella brava patens* (Brava del pastore), *Chenopodium spp.* (F. antemico), *Digitalis sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Civovola), *Euphorbia spp.* (Euphorbia), *Galium aparine* (Galieno), *Mari-chicca canaliculata* (Camonilla), *Morrenalis annua* (Morrenella), *Plantago major* (Fianzagallo), *Polygonum convolvulus* (Falso corofol-vo), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Setaria spp.* (Setaria), *Sisymbrium irio* (Sisimbrione), *Sisymbrium officinalis* (Sisimbrione), *Sisymbrium spp.* (Veronica), *Urtica dioica* (Urtica). Alle annuali dosi di impiego la persistenza nel terreno del LINURON CHIMBERG non supera i 2-3 mesi per cui in una buona prassi di coltura di azione senza pericolo alcuno di inconvenienti per le colture che seguono nella rotazione.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO (per 100 litri di acqua)

MARS. intervenire con mais alto 45-60 cm. limitando l'applicazione all'infertilità. La dose di impiego, opportuna ad ettaro, è di 1.100 ml in terreno a medio impasto in miscela con un erbicida a base di alachlor come ad esempio il **CHIMICLOR**, nei terreni tofoosi ed argillosi la dose è di 1.250 per ettaro di superficie. **CAROTTA:** eseguire il trattamento in pre-emergenza impiegando 1.150/1.500 ml. **SEDANO, RAPA:** intervenire dopo il trapianto alla dose di 1.150/1.500 ml. **Con le varietà strazzerate** interventi si impiegano in media da 300 a 600 litri di acqua per ettaro. **PADDA:** intervenire in pre-emergenza alla dose di 1.150-2.500 ml in terreni pesanti ed in associazione ad altri erbicidi. **CAROFANO:** intervenire all'impianto o subito dopo nel caso di orti non pre-gemmati; nel caso invece di orti pre-gemmati o di carofani, eseguire il trattamento 30 giorni dopo l'impianto. Impiegare 1.170 ml di LINURON CHIMBERG in un volume d'acqua che consenta di distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie. Su coltura già in atto il trattamento deve essere eseguito prima della ripresa vegetativa impiegando 1.150/1.500 ml. **FINOCCHIO:** seguire le indicazioni già espresse per il sedano ed applicare una dose di 1.050-1.100 per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con altri erbicidi.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della mescolazione completa.

FITOTOSSICITA':

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 60 giorni.

AVVERTENZE: Nella preparazione della miscela mettersi di guanti e di facciale filtrante.

- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati dritti da quelli edibili ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.

- Non utilizzare gli inalatori che abbiano contenuto il flucifamone.

- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eradicante prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

- Il principio attivo non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nella epoca e per usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SPUSO.

Officina autorizzata **DIACHEM S.p.A.** - ALBANO S. ALESSANDRO

Taglie autorizzate 1 1 - 5

LINURON CHIMBERG

Diserbante selettivo a base di Linuron ad azione radicale e fogliare

COMPOSIZIONE:

LINURON g. 42,8 (=500,7 gr)
Coformulanti q.li a 100g.

FRASI DI RISCHIO:

Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave lontan dalla portata dei bambini
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non respirare i vapori

Non distaccare dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

In caso di malore consultare il medico (se possibile, mostrargli etichetta).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

CHIMBERG S.R.L.

Via Tomate, 15

ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA:

OFFICINA DI PRODUZIONE:

DIACHEM S.P.A. via Tomate, 15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)


Registrazione Ministero della Sanità n. 7218 del 3/7/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RUTILIZZATO

PARITTA' N.:

CLASSE II



NOCCIVO

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento
Non contaminare al br coltura o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Tutti i dell'associazione delle seguenti sostanze attive: Trifluralina (il cloruro) = g. 23,50 Litron = g. 11,75 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di tossicazione: Trifluralina: tempra sonnolenta. Litron: Derivato dell'urea. Sintomi: dermatite | impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati soltanto ed esaurienti. Troppa tossicità.

Consultare un Centro Antidoti. CARATTERISTICHE Il TRILIANE è un diserbante polivalente di sintesi dalla appropriata associazione di due tra i più validi erbicidi oggi disponibili le cui attività si integrano vicinamente. Il TRILIANE agisce pertanto efficacemente sulla infestazione a foglia larga sia sulle graminacee che infestano i campi a semina autunnale o verna come ad esempio: GRAMINACEE ANNUALI: Alopecurus spp. (Erb. odora). Avena spica verde (Spica verde), Lolium setoloso (Loligo). Poi spp. (POA) DICOTILEDONI ANNUALI: Anagallis arvensis (magallidi), Cirsium bursa potius (borsa del pastore), Conium arvensis (cancro arvensis), Fumaria officinalis (fumaria), Lonicera prorepens (ortica falsa), Lunaria: ampeliosica (erbe mala), Lithospermum arvensis (Stigolo setoloso), Myricaria arvensis (Myricaria), Papaver rhoeas (Papavero), Polygona arvensis (Coraggione), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Roripha raphanistrum (Rafanone), Strepis arvensis (Strepe), Sonchus asper (Sonco), Stellaria media (Cantocobio), Thlaspi arvensis (Erb. storta), Valeriana arvensis (Callistena), Veronica spp. (Veronica)

EPOCAE DOSI DI IMPIEGO Il TRILIANE deve essere impiegato in pre-emergenza, precisamente dopo la semina del cereale e prima che lo stesso emerga dal terreno. Le dosi di impiego e' di litri 2,3-3 di TRILIANE per ettaro di superficie, questa dose va distribuita uniformemente con le usuali pompe irroratrici in un volume di acqua (generalmente 400-500 litri) che consenta una omogenea distribuzione del prodotto sul terreno.

MODALITA' DI IMPIEGO Come consuete nelle var. di erbicidi di pre-emergenza, il TRILIANE deve essere distribuito in un terreno ben preparato, uniformemente innaffiato e privo di zolle che potrebbero farne riparo ai semi graminati o graminati.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI! COMPATIBILITA': Per le praterie controbilanci il deve essere usato nel quale; se ne consiglia pertanto ogni e qualsiasi miscela.

ISTRUZIONI SPECIALI: Qualora fosse necessaria una ricostituzione devono passare almeno 5 mesi tra l'applicazione del Trifluralina in miscela con Litron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo o grano e graminacee foraggere, pisodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocconero, cavolfiore, zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, ortica e car. di spinaccio. Non somministrare barbabietola (da zucchero, da orto, da mangime) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contesi al 90% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

AVVERTENZE: Nella preparazione della miscela minima di grani e di sostanza filtrata. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei dotati di quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali depositi di fieno e verbi, deposito mangime.

Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il diserbante. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

Il prodotto attivo non deve essere impiegato in terreni erbosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%. Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un impiego del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni e condizioni essenziali per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenuto completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. DA NON VENDERSI SFUSO.

TRILIANE

Diserbante selettivo per cereali vernini

COMPOSIZIONE: TRIFLURALIN g. 23,50 (=239,7 g/l) LINURON g. 11,75 (=119,8 g/l) Conformità: q.b. a 100g. Contiene Xilox, Acetone, Benzolo

FRASI DI RISCHIO: Facilemente infiammabile Nocivo per inalazione e contatto con la pelle Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave fuori dalla portata dei bambini Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare Non respirare i vapori Non distanziarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni Usare indumenti protettivi e guanti adatti Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrare l'etichetta) Conservare il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: CHIMBERG S.R.L. via Tonda, 15 - ALBANO S. ALESSANDRO DISTRIBUITO DA: OFFICINE DI PRODUZIONE DIACHEM S.P.A. via Tonda, 15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6948 del 6/VI/88 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RUTILIZZATO

PARTITA N.:


NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Officina autorizzata: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S. ALESSANDRO

Taglie autorizzate : 1 1 - 5 - 10

CLASSE II



NOCCIVO



FACILMENTE INFIAMMABILE


Ditta: CIBA GEIGY**Principio attivo:****CLOROTALONIL****LINURON****Presidio sanitario:****DACONIL LIQUIDO
DACOMIL 75 WG
RIDOMIL MULTI FW
TOPAS DAC FW****DICURAN M
DUALIN
DUALIN S
DUALIN SP
PRIMAGRAM TL**

Daconil® Liquido

Sospensione concentrata.
Anticrittogamico a largo spettro di azione contro varie malattie fungine del pero, mele, pesco, carciofo, melone, pisello, fagiolo, capolla, patata, pomodoro, sedano, piante ornamentali e da fiore.

Daconil® Liquido

Composizione:
clorotalonil puro 40,7 g (= 480 g/l)
coloranti q.b. a 100 g



CLASSE II

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Possibilità di effetti irreversibili

NOCIVO

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Sanità n. 3679 del 30.5.1988

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n.

1 lt

INDICAZIONI PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di fasciolo filtrante.

Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

CLOROTALONIL
Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro antivenali

Officine di produzione: BASILINI S.p.A., Treviglio (BG)

S.I.L.I.A. S.p.A., Aprille (Lj)

S.I.P.C.A.M. S.p.A.,

Salerno S/Lambro (Mi)

CHEMAC AGRIPHAR (GECHEM),

Sarsing (Bglo)

FARM PROTECTION LTD.,

Barton-on-Humber (U.K.)

LIGTERMOET CHEMIE B.V.,

Roesendaal (Olanda)

Société Anonyme CIBA-GEIGY,

Uxelles d'Angues-Vives (Francia)

DowElanco Italia S.r.l., Ozzano Emilia (Bo)

CIBA-GEIGY AG., Basilea (Svizzera)

Taglio lt 0.2 - 0.4 - 0.5

Caratteristiche

DACONIL LIQUIDO è un fungicida a largo spettro di azione che consente di combattere contemporaneamente diverse malattie delle piante.

Indicazioni e dosi di impiego

MELO, PERO

- ticchiolatura, marciumi, cancro dei rami alternaria 1.5-2 litri/ettaro
- Effettuare al massimo 4 trattamenti, impiegando il prodotto in miscela con fungicidi sistemiche.

PESCO, SUSINO

- boia, cladosporiosi, marciumi moniliosi 2.0 litri/ettaro Effettuare al massimo 4 trattamenti, impiegando il prodotto in miscela con fungicidi sistemici.

ORTICOLE

- peronospora, alternaria, antracnosi, septoria, cladosporiosi, muffa grigia, ruggine.

Cultura	Dose etereo	Nr. trattamenti
sedano	2,5-3 lt	3 in pieno campo
peperone	2,5-3 lt	3 in pieno campo e 5 in serra
cocomero, melone, carciofo	2,5-3 lt	3 in pieno campo e in serra
fagiolo, pisello, fagiolo	2,0 lt	2 in pieno campo
capolla	2,5-3 lt	2 in pieno campo
patata	2,5-3 lt	2 in pieno campo

COLTURE FLOREALI E PIANTE ORNAMENTALI

- peronospora, muffa grigia, ruggine, alternaria, septoria, cladosporiosi, antracnosi: 2,5-3 litri/ettaro

N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompa a volume normale il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Specie e modalità d'impiego

Usare il prodotto a scopo preventivo. Bagnare bene le colture da proteggere e ripetere i trattamenti ad ogni necessità e cioè a seconda del calendario di incubazione delle malattie

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ed eccezione di quelli a reazione alcalina (Doligol borobiose, poliofufi). Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della intossicazione compiuta.

Fitosociologia

In particolari condizioni può provocare fenomeni di rugginosità su varietà di mele del gruppo Golden e sulle Sar e Starling.

Sulle colture da fiore più delicate, eseguire saggi preliminari su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

21 giorni per mele, pero, pesco, susino

Tempo di rientro: 12 ore in campo

24 ore in serra

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alla pianta, alla persona ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO


Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Daconil® 75 WG

Granuli idrodispersibili (WDG). Anticrittogamico a largo spettro di azione contro varie malattie fungine delle piante da frutto, colture orticole, piante ornamentali e da fiore.

Daconil® 75 WG

Composizione:
clorotaloni puro 75 g
coformulanti q.b. a 100 g



CLASSE II

Inocuo a contatto con la pelle e per ingestione
Possibilità di effetti irreversibili

NOCIVO

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare esclusivamente guanti e consultare il medico
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CIBA-GEIGY S.p.A., Origlio (Varese)

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Sanità n. 1161 del 9.11.72

Il contenitore non può essere rifilizzato

Partita n.

1 kg

NOTE PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (masca e bozza).
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di fasciolo filtrante.
Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

CLOROTALONI.
elementi: irritante per le orecchie e le mucose dell'apparato respiratorio; irritante cutaneo con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro antivenefici.

Officina di produzione: CIBA-GEIGY AG., Solothurn (Svizzera)

LIGTERMOET CHEMIE B.V.,

Roosendaal (Olanda)

Société Anonyme CIBA-GEIGY,

Union d'Alpages-Vivres (Francia)

U.C.B., Gant (Belgio)

Telex: lg. 01 - 02 - 026 - 05 - 5 - 10

Caratteristiche

DACONIL 75 WG è un fungicida a largo spettro di azione che consente di combattere contemporaneamente diverse malattie delle piante.

Indicazioni e dosi di impiego

MELO, PERO
- Eficacia: marciumi, cancro del ramo, alternaria 0,8-1,2 Kg/ettaro.
- Effettuare 4 trattamenti, 4 trattamenti, impiegando il prodotto in miscela con fungicidi sistemiche.

PESCO, SUSINO

- Botte, cladosporiosi, marciumi, moniliosi 1-1,2 Kg/ettaro. Effettuare al massimo 4 trattamenti, impiegando il prodotto in miscela con fungicidi sistemiche.

ORTICOLE

- peronospora, alternaria, antracnosi septoria, cladosporiosi, muffa grigia, ruggine.

Cultura	Dose ettaro	Nr. trattamenti
cedano	1,5-2,0 Kg	3 in pieno campo
pomodoro	1,5-2,0 Kg	3 in pieno campo e 5 in serra
cocomero, melone, cetriolo	1,5-2,0 Kg	3 in pieno campo e 5 in serra
topinambur, pisello, leguminose	1,5 Kg	2 in pieno campo
cipolla	1,5-2,0 Kg	2 in pieno campo
patata	1,5-2,0 Kg	2 in pieno campo

COLTURE FLOREALI E PIANTE ORNAMENTALI

- peronospora, muffa grigia, ruggine, alternaria, septoria, cladosporio-
- antracnosi: 1,5-2,0 Kg/ettaro

N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Epoca e modalità d'impiego

Usare il prodotto a scopo preventivo. Bagnare bene le colture da proteggere e ripetere i trattamenti ad ogni necessità e cioè a seconda del calendario di fruttificazione delle piante.

DA NON APPUNCIARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polidigita bordolese, polifosfuri). "Avvertenza": in caso di miscela con altri prodotti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

In particolari condizioni può provocare fenomeni di rugginosità su varietà di melo del gruppo Golden e sulle Star e Starking.

Sulle colture da fiore più delicate, eseguire saggi preliminari su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

21 giorni per melo, pero, pesco, susino

24 ore in serra

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nella epoca e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.


DA NON VENDERSI SFUSO

Ridomil® Multi FW

Sospensione concentrata. Fungicida specifico per la lotta contro le peronoscere del pomodoro, della cipolla

Ridomil® Multi FW

Composizione:	g	(= 101,5 g/l)
metilaxil puro	40 g	(= 506 g/l)
clorotalonil puro		
coloranti q. b. a 100 g		



CLASSE II

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Possibilità di effetti irreversibili

NOCIVO

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti e mangimi o da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Sanità n. 4949 del 15.10.82

Il contenitore non può essere riutilizzato

Purità n.

1 lit

MORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Durante il trattamento proteggere la via respiratoria (naso e bocca).
Nelle preparazioni della miscela munirsi di guanti e di fessole filtranti.
Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattati di associazione delle seguenti sostanze attive:
metilaxil 5%
clorotalonil 40%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL: Irritazione cutanea ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha eczematoidi, dispnea, spasmi muscolari.

CLOROTALONIL: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale.

Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atesie.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro antiveleni.

Officine di produzione: CIBA-GEIGY AG., Basilea (Svizzera)

LIGTERMOET CHEMIE B.V.

Roozendaal (Olanda)

S.C.A.M. S.r.l.,

S. Maria di Mignano (Mo)

S.L.P.C.A.M. S.p.A., Salsomaggiore S.L. (Pv)

Société Anonyme CIBA-GEIGY,

Union d'Algues - Yves (Francia)

Taglie II 6.1 - 6.25 - 0.5 - 5 - 10

Caratteristiche

RIDOMIL MULTI FW è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificamente indicato per la lotta contro le peronoscere delle colture sottostanti.

Dosi e modalità d'impiego

Peronospora del pomodoro (= *Phytophthora infestans*)
2-2,5 litro di acqua ad intervalli di 10-12 giorni. Alle cadenze indicate il RIDOMIL MULTI FW esplica un'interessante attività nei confronti di altre importanti malattie del pomodoro quali Alternaria, Septoria e Botrite.

Effettuare al massimo 3 interventi in pieno campo e 5 in serra

Peronospora della epiplole (= *Peronospora schiederei*)

2,5-3,0 litro avendo l'avvertenza di aggiungere un bagnante (Estratto alla dose di 50 ml per 100 lt di acqua), onde favorire il buon assorbimento del prodotto.

RIDOMIL MULTI FW esercita una buona attività di prevenzione anche nei confronti della Botrite e delle ruggini. Effettuare al massimo 2 interventi.

NB Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sporcimento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il prodotto è miscelabile con gli insetticidi ed acaricidi di più comune impiego. "Avvertenza" - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.

Tempo di ritardo: 12 ore in campo

24 ore in serra

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle precedenti istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alla pianta, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO


Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Topas® DAC FW

Sospensione concentrata
 Funghiocida per la lotta contro le ticchiate e l'oidio del mele, la ticchiate del pero e le malattie del preco

Topas® DAC FW

Composizione:		
periconazolo puro	3,2 g	(=1.92 g/l)
clorotalonil puro	46,8 g	(=13.14 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g		



CLASSE II

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
 Possibilità di effetti irreversibili

NOCIVO

Conservare fuori dalla portata dei bambini
 Conservare lontano da alimenti e mangimi o da bevande
 Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
 In caso di malore consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Sanità n. 6943 del 26.1.87

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n.

1 lt

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa.
 Non operare contro vento.
 Non consumare altre culture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
 Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
 Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
 Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
 Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Treatati di associazione delle seguenti sostanze attive:
 periconazolo 3,2%
 clorotalonil 46,8%
 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

PERICONDIZIONE: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, lingua, reni. - Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da contatto) dermatiti eritematose e a dermatiti necrotizzanti. - Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. - Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tachicardie e ritmo irregolare ed epatocrenali sintomatiche (con un marcato aumento di transaminasi).
CLOROTALONIL: sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cutanea, oltre naturalmente a segni del possibile intossicamento epatico ed renale.

Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

CLOROTALONIL: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante cutaneo con possibile opacità corneale.
 Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.
 Terapia sintomatica. - Consultare un Centro antiveleni.

Officina di produzione: S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Magliano (Mo)

S.I.L.L.A. S.p.A., Agrate (Lg)

S.I.P.C.A.M. S.p.A.,
 Salerno S/Lambro (Mi)

CIBA-GEIGY AG, Basiglio (Svizzera)

LISTERHÖET CHEMIE B.V.,
 Rossum (Olanda)

Société Anonyme CIBA-GEIGY,
 Urmé d'Alques - Vivez (Francia)

Taglia: n. 0.5 - 6 - 10 - 15 - 20

Caratteristiche

TOPAS DAC FW è un fungicida ad ampio spettro d'azione che unendo l'attività sistemica del periconazolo e quella di contatto del clorotalonil copre una azione di tipo preventivo, curativo e bloccante.

Dosati e modalità d'impiego

- MELO: Ticchiate (Venturia Inaequalis)
- Treatamenti preventivi:
- 1,5-1,6 litetro alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto rosso.
- Effettuare di massima 4 trattamenti.

1,6 litetro intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infestante

- Treatamenti bloccanti (in presenza di sintomi):

1,6 litetro effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni

Ciclo (Pudopolisera leucosticta)

- Treatamenti preventivi:

Treatamenti primaverili alla dose di 1,5-1,6 litetro alla cadenza di 10 giorni. Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni.

Effettuare al massimo 4 trattamenti.

- Treatamenti bloccanti (in presenza di sintomi):

1,5-1,6 litetro a cadenza settimanale in numero di 3-4 trattamenti

PERO: Ticchiate (Venturia pinna) con attività collaterale contro la maculatura bruna

- Treatamenti preventivi: 1-1,5 litetro alla cadenza di 10-12 giorni.

Effettuare al massimo 4 trattamenti.

- Treatamenti curativi:

1,5 litetro intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infestante

- Treatamenti bloccanti (in presenza di sintomi):

1,5 litetro effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni

PESCO:

- Treatamenti preventivi:

1,5 litetro di TOPAS DAC FW controllando efficacemente oidio, botta, cornio e monilia in fruttifer dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali. Applicare il prodotto allo stadio di bottoni rossi, alla caduta petali, alla scamicatura. Per i trattamenti specifici contro

oidio effettuare 4 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a

bassa pressione di infestazione trattare ogni 14-21 giorni.

N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume

costante. Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente

a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo

spreccamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREO

Compatibilità

Il prodotto è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici di più comu-

ne impiego. "Avvertenza": In caso di miscela con altri formulati deve

essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere

osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della

miscelazione compiuta.

Fitosensibilità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

Tempo di rientro: 12 ore in campo

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e

per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto

è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso

improprio del preparato. Il rispetto delle precise istruzioni è condizione

essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni

alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere gettato nell'ambiente.

Dicuran® M

Soluzione zotosospensiva.
Olerbante per frumento e orzo

Composizione
100 g di prodotto contengono
50 g dicloruron però
5 g liuron però
q.s. di 100 g coloranti
(contiene glicole etilenico)

CLASSE III ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Attenzione al rivello
Sensibilità particolare per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Non operare con il prodotto chiuso e aprire in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare le confezioni ben chiuse.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande e erari d'acqua.

Non operare con il vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Nelle preparazioni della miscela non usare più di 100 g di prodotto in recipienti appositi.

Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati dove vi sono venti adatti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdure, depositi mangimi.

Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il prodotto.

Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Le confezioni della confezione vuote e derivate, non essere utilizzate per altri scopi.

Il prodotto non deve essere impiegato in terreni erbosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)
Officina di produzione: CIBA-GEIGY AG., Basilea (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7037 del 26.3.87
© marchio registrato

Caratteristiche

Il prodotto agisce per assorbimento radicale delle piante delle giovani infestanti. I DICTYAN M controlla sia infestanti graminee da seme quali Alopecurus, Agropyrum, Lolium e Poa, sia malerbe annuali a foglia larga quali Capovilla, Centaurea, Cirsium, Galium, Galium, Chusqueolium, Galeopsis, Lamium, Malva, Malva, Mercurialis, Poligonum, Ranunculus, Ranunculus, Stachys, Papaver sp., Veronica sp.
Esercita un parziale controllo dell'azione erbivora.
Il prodotto non è efficace sulle infestanti perenni e su quelle di rizoma, bulbi, stelo, quali Graminis, Convolvulus, Strophium, Antennaria.

Dosi e modalità d'impiego

Il prodotto si da impiegare in pre-emergenza subito dopo la semina della coltura e rivedi l'etichetta.
La dose normale d'impiego è di 3-4 lt/ha.
Per terreni pesanti/argillosi è di 5 lt/ha in 400-500 g di acqua.
La scelta delle dosi è in funzione del tipo di terreno e dell'infestazione prevista: i dosi più elevate sono da applicare nei terreni più tenaci e più ricchi di sostanza organica e per combattere le infestanti meno sensibili.
Per evitare inquinamenti è importante che al momento del trattamento i semi non si trovino scoperti.

Infestanti specializzate

Qualora fosse necessaria una ritenuta non superiore prima di 5 mesi dall'applicazione del prodotto: frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, bambusce, biacca, biacca e spinoso, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, coccomer, cavolfiori e zucca, insalata, latticello, cipolla, patata, colza e cereali.
Il prodotto non deve essere incorporato nel terreno e non deve essere applicato in terreni torbosi ed organici, in quanto si verificherebbe una notevole perdita di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Sono possibili associazioni con altri erbicidi.

Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri erbicidi "Avvertenza". In caso di miscela con altri erbicidi deve essere rispettato il principio di compatibilità. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Quando si verificassero casi di infestazione ricorrendo al medico della miscelazione completa.

Precauzioni

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
È fitotossico su varietà "Denar 4", "Acid", e "Mirastilla".

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle specie e per gli usi così indicati; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.


DA NON VENDERSI SFUSO

Dualin®

Erbicida selettivo per il mais

Dualin

- Composizioni:
 - metolaclor puro 30 g (-315 g/l)
 - linuron puro 10 g (-105 g/l)
- coformulanti q.b. a 100 g
- contiene inoltre:
 - dimetilmammichio
 - xilene (miscela di isomeri)



CLASSE II

Inflammabile
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
Irritante con la pelle

NOCIVO

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliere di doso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti aderenti
In caso di esposizione consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Sanità n. 7853 del 27.6.89
Il contenitore non può essere ritilizzato

Partita n.

1 lt

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Nella preparazione della miscela murarsi di guanti e di facciale filtrante.

Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.

Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco.
Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.
Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Traffasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

- metolaclor 30%
- linuron 10%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazioni:

LINURON: Dolori dell'orecchio. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, tosse, irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitaneamente ad amputazione.

METOLACLOL: Sintomi: non si conoscono dati affidabili di intossicazione nell'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, eccitamento, iritoma, spasmi muscolari

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro antivenefici

Officina di produzione: S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mugugno (Ilo)

S.I.A.P.A. S.p.A.,

S. Vincenzo di Galliera (Bo)

S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (Lt)

CIBA-GEIGY AG, Basilea (Svizzera)

LIGTERMOET CHEMIE B.V.

Rosendaal (Olanda)

Société Anonyme CIBA-GEIGY,

Union d'Alpages -Vives (Francia)

Caratterizzazione

Il prodotto agisce sulle maggior parte delle infestanti annuali prevenienti da seme e da geminazione quali *Gavone* (*Echinochloa*), *Poa*, *Diglossa*, *Setaria*, *Gliorone* americano (*Panicum dichotomiflorum*), tra dicotiledoni quasi *Amaranto*, *Farnacolo*, *Pericaria*, *Craba*, *Erba percoliana*, *Speltina*, *Borra Pastore*, *Erba monella*, *Gerani*, *Marcoullia*, *Vernaccia*, *Masticaria*.

Sono sensibili anche le infestanti dicotiledoni come *Amaranthus*, *Erba monella* (*Solanum nigrum*) e *Farinaccio* (*Chenopodium album*) appartenenti ad accipi divenuti resistenti alle bischie.

Il prodotto non è efficace sulla miscela perennante murata di rizomi, bulbi, strobili quali *Gramigna*, *Convolvolo*, *Sorgharia*, *Soppione*, *Artemisia*. Il prodotto agisce essenzialmente per asportamento radicale sulle infestanti allo stato di germinazione del seme e allo stadio di piantola.

Dosi e modalità d'impiego

Il prodotto si impiega prevalentemente in pre-emergenza (subito dopo la semina). Eseguire le applicazioni su terreni ben sistemati, preferibilmente ridati, e eventuali ad una profondità non inferiore a 4 cm. In casi particolari può essere anche usato in post-emergenza molto precoce dal mese fino a 2-3 foglie e su infestanti appena spuntate.

Le dosi consigliate sono: 4.7 - 6.7 l/ha impiegando le dosi più elevate nei terreni argillosi.

Eseguire le applicazioni su terreno di preferenza già umido o che verrà bagnato da successive piogge o irrigazioni. La uniformazione del terreno è determinante per l'assorbimento dell'erbicida attraverso le radici delle infestanti per cui, non verificandosi piogge entro le due settimane successive al trattamento, occorre sopprimerli con opportune e tempestive irrigazioni.

Qualora si rendesse necessaria la neomina, eseguire un'irrigazione alla profondità di almeno 25 cm.

Le eventuali sarchiature eseguite dopo il trattamento per rompere la crosta e per arare il terreno devono essere molto superficiali per non portare in superficie il linuron con semi non contenenti l'erbicida.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità

Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri erbicidi.

"Avvertenza" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione ritornare il medico della miscelazione completa.

Fittociclicità

Il prodotto può essere fittociclico per le colture non indicate in etichetta.

In post-emergenza sopprimere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta.

Attenzioni: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è proibito.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alla pianta, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Dualin® S

Erbicida selettivo per il mais

Dualin® S

Composizione:	35 g	(=367,5 g/l)
metolachlor	10 g	(=105 g/l)
linuron puro		
contenuto q.b. a 100 g		
contiene inoltre:		
dimetilformamide		
xilene (miscela di isomeri)		



CLASSE II

Inflamabile
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle

NOCIVO

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Sanità n. 7868 del 24.7.1989
Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n.

1 lt

Caratteristiche

Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali provenienti da seme sia graminacee quali Giavone (Echinochloa), Poa, Digitaria, Setaria, Giavone americano (Panicum dichotomiflorum), Sorgo da seme (Sorghum halepense) sia dicotiledoni quali Amaranzo, Fainacco, Pasticcaia, Ortica, Erba porcicella, Stellaria, Borra Pastore, Erba morella, Gerani, Mercurella, Veroniche, Marcaria. Sono sensibili anche le infestanti dicotiledoni come Amarantiflora, Erba morella (Solanum nigrum) e Fainacco (Chenopodium album) appartenenti ad ecotipi diversi resistenti alle erbicidi.

Il prodotto non è efficace sulla malerba perennante ma di rizomi tubi scolori quasi Gramigna, Cornovello, Sorghetto, Stoppione, Artemisia. Il prodotto agisce essenzialmente per assorbimento radicale sulla infestante allo stadio di germinazione del seme e alto stadio di piantula.

Dosi e modalità d'impiego

Il prodotto si impiega prevalentemente in pre-emergenza (subito dopo la semina). Eseguire le applicazioni su terreni ben siltati, preferibilmente ruvidi, e seminati ad una profondità non inferiore a 4 cm. In casi particolari può essere anche usato in post-emergenza molto precoce del mais fino a 2-3 foglie e su infestanti appena spuntate.

Le dosi consigliate sono: 4,5-5 litra impregnando le dosi più elevate nei terreni argillosi

Eseguire le applicazioni su terreno di preferenza già umido e che verrà bagnato da successive piogge o irrigazioni. La uniformazione del terreno è determinante per l'assorbimento dell'erbicida attraverso le radici della infestante per cui, non verificandosi pioggia entro le due settimane successive al trattamento, occorre sopprimere con opportune e tempestive irrigazioni.

Qualora si rendesse necessaria la risemina, eseguire un'irrigazione alla profondità di almeno 25 cm.

Le eventuali sarchiature eseguite dopo il trattamento per rompere la crosta o per arare il terreno devono essere molto superficiali per non portare in superficie il terreno con semi non contenente l'erbicida.

Da non applicarsi con mezzi aerei

Compatibilità
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri erpicidi resistenti.

"Avvertenze" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

In post-emergenza sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è proibito.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle precise istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante

Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.

Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco.

Non impregnare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

metolachlor	35%
linuron	10%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.

LINURON: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subituro ed emetico.

METOLACHLOR: sintomi: non si conoscono dai clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, diapnea, ecotattimo, entesa, spasmi muscolari

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro antiveleni.

Officine di produzione: S.C.A.M. S.r.l.,
S. Meris di Magnano (Mo)

S.I.A.P.A. S.p.A.,
S. Vincenzo di Galliera (Bo)

S.I.L.L.A. S.p.A., Aprilia (Lr)

S.L.P.C.A.M. S.p.A., Salsomaggiore (Mi)

CIBA-GEIGY AG., Basiglio (Svizzera)

LIGTIWOCET CHEMIE B.V.
Roccandul (Olanda)

Société Anonyme CIBA-GEIGY,
Usine d'Algues-Vives (Francia)

Taglia: N 5 - 10 - 15 - 20

PRIMAGRAM TL

Erbicida selettivo per il mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
20 g di metolaclor puro
10 g di terbutilazina pura
6 g di linuron puro
q.b. e 100 g coformulanti
(contiene etilenglicolo)

CLASSE MI
Attenzione: manipolare con prudenza

Infrazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti
sostanze attive:
metolaclor 20%
terbutilazina 10%
linuron 6%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MEVOLACLORE
sintomi: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispepsia, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari.

TERBUTILAZINA
sintomi: non specifici e rilevati su animali, con superdosaggi: apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.

LINURON
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitro ed enturia.

Terapia sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

Matera del rischio
Bastare pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o carni d'acqua.

Non operare contro vento
Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavare accuratamente con acqua e sapone.

Nella preparazione della miscela metterli di questi e di fecce filtrate.
Preparare la miscela in recipienti appositi possibilmente all'aperto o in locali ariati di venti da questi adatti ad altre operazioni agricole, quali depositi di fieno e verdura, depositi mangimi.

Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il Modarmaco.

Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e del rimanente prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
Il prodotto non deve essere impiegato in terreni erbosi, con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione:

. CIBA-GEIGY AG., Basilea (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7756 del 27.4.89
e marchio registrato

LT 1-5-10-15-20

Caratteristiche
Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali provenienti da seme sia graminee (Gleba) (Echinochloa), Poa, Digitaria, Setaria, Gleba americana (Panicum dichotomiflorum), Sorghum da seme (Sorghum sativum) sia dicotiledoni (Amaranthus, Falloppia, Pteris, Erba polca, Erba perca, Erba pastore, Erba marzola, Gerani, Marourella, Veronica, Nasticaria).
Sono sensibili anche le infestanti dicotiledoni come Amaranthus, Erba marzola (Sorghum nigricum) e Falloppia (Chenopodium album) appartenenti ad ecotipi diversi resistenti alle triazine.

Il prodotto non è efficace sulle malerbe perenni (riseni, bubi, stoloni quali Giunone, Cornicello, Borghella, Scoppione, Artemisia). Il prodotto agisce essenzialmente per assorbimento radicale sulle infestanti allo stadio di germinazione del seme e allo stadio di piantina.

Dati e modalità d'impiego
Il prodotto si impiega prevalentemente in pre-emergenza (subito dopo la semina) e successivamente su terreni ben drenati, preferibilmente ruvidi, e seminati ad una profondità non inferiore a 4 cm. In casi particolari può essere anche usato in post-emergenza molto precoce del mais (da 2-3 foglie e ad infestanti appena spuntate).

Le dosi consigliate sono: 7-9 l/ha impiegando le dosi più elevate nei terreni più pesanti o/o in presenza di Sorghum nativum da seme o/o di miscele miste di dicotiledoni resistenti.

Eseguire le applicazioni su terreno di preferenza già umido e che verrà bagnato da successiva pioggia o irrigazione. La umidità del terreno è determinante per l'assorbimento dell'erbicida attraverso le radici delle infestanti per cui, non verificandosi pioggia entro le due settimane successive al trattamento, occorre sopprimerlo con opportuno e tempestivo irrigazione.

Qualora si rendesse necessaria la rimediazione, eseguire un'eratura alla profondità di almeno 25 cm.

Le eventuali scabbie eseguite dopo il trattamento per rompere la crosta o per atterrire il terreno devono essere molto superficiali per non portare in superficie il terreno con cui non contengono l'erbicida.

Lavorare il terreno con aratura profonda dopo il raccolto del mais, prima di seminare le successive colture.

Impiegare il prodotto solo su colture specializzate e in assenza di sottocultura.

Avvertenze
Dal trattamento alla semina di eventuali sottoculture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

Lavorare il terreno con aratura profonda dopo il raccolto del mais, prima di seminare le successive colture.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Sono possibili associazioni con altri erbicidi.

Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri antiparassitari. Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Deve essere osservato lo stesso precauzionale prescritto per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di infestazione informare il medico della miscelazione completa.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

In post-emergenza sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle norme precauzionali è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Ditta: C Y A N A M I D

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:


PANTER
TRITIFEN

PANTER®

DISERBANTE LIQUIDO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI

PANTER® - Diserbante liquido concentrato emulsionabile.
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
 - Pendimetalin puro g 16 (160 g/l)
 - Linuron puro g 9 (90 g/l)
 - Coformulanti (emulsionanti e solventi) c.l.a. g 100
 (Contiene etilene e cicloesossone)

CLASSE TOSSICOLOGICA: III



IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO - Irritabile - Irritante per la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori e gli aerosol - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CYANAMID ITALIA S.p.A. - Zona Industriale XV Stadio - CATANIA
 Divisione Agricoltura - Roma
 Succursale dell'AMERICAN CYANAMID COMPANY, WAYNE, New Jersey (USA)

Procedimento Sanitario - Registrazione Min. Sanità n. 4434 del 08.10.1981

Officina di produzione: (come da elenco autorizzato)

L'IMBALLAGGIO NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenitore nautico: (come da elenco tagli autorizzati)
 Codice Lotto

*Marchio registrato AMERICAN CYANAMID COMPANY, Wayne, N.J. (USA)

ATTENZIONE. MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME PRECAUZIONALI - Preparare la miscela in recipienti appositi possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, depositi mangimi - Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di taccuole lavanti - Non contaminare altre colture - Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua - Non operare contro vento - Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco - Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore - Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive PENDIMETALIN 16% e LINURON 9% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione PENDIMETALIN - Sintomi nell'animale da esperimento si osservano depressione SNC, dispnea, duresi, convulsioni LINURON (derivato dell'urea) - Sintomi durante l'impiego può causare congiuntivite, nite, nonché irritazione della gola e della cute L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea Sono citati subaltero ed emoluna Terapia sintomatica Avvertenza Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E GAMMA D'AZIONE - Il PANTER è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germogli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee che dicotiledoni. Le infestanti sono anche controllate in fase di pianta e condizione che le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere. **GRAMINACEE:** Alopecurus, Apera, Diglossis, Echinochloa, Poa, Setaria. **DICOTILEDONI:** Amaranthus, Anagallis, Anthriscus, Cirsium, Cerastium, Chenopodium, Fumaria, Galinsoga, Lamium, Malvastrum, Mercurialis, Myrsine, Papaver, Polygonum, Portulaca, Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Solanum, Stachys, Thlaspi, Veronica, Vicia.

DOSE E MODALITA' D'IMPIEGO - Il PANTER è idoneo per il diserbo preventivo delle seguenti colture: **CAROTA:** 5-6 l/ha pre-emergenza; **BRASOLE:** 5-6 l/ha pre-emergenza; **GRANO e ORZO:** 5-5,5 l/ha pre-emergenza; **MAIS:** 5-5,5 l/ha pre-emergenza; **PATATA:** 5-6 l/ha pre-emergenza oppure dopo la rincalzatura; **SOLA:** 4-5 l/ha pre-emergenza. Su terreni torbosi ed argillosi nel caso del MAIS la dose può essere elevata fino a 6 l/ha, mentre per le altre colture si consiglia di usare la dose più alta, che dovrà essere adottata anche su terreni notoriamente soggetti a forti infestazioni di graminacee. Si consiglia l'impiego del prodotto su terreni molto sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1% e su terreni calcarei.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER L'USO - Al fine di permettere al PANTER di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua stabilità è consigliabile attenersi alle seguenti modalità operative: - effettuare una buona preparazione del letto di semina in modo da operare su terreno perfettamente livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta; - effettuare le semine in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno cm 3 per cereale e di almeno cm 4 per grano ed orzo, avendo altresì cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra; - stampare in poca acqua la necessaria dose di prodotto e poi, continuando ad agitare la miscela, aggiungere il quantitativo di acqua sufficiente ad ottenere una completa bagnatura del terreno senza lacune e senza sovrapposizioni; - provvedere alla distribuzione senza inceppamenti; - dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua e sapone attrezzature, utensili e recipienti adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto. **Avvertenza:** Dal trattamento etichetta alla semina di colture successive devono trascorrere almeno 6 mesi - In caso di forzate semine su terreni già trattati evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante rimandando alla profondità suggerita senza rismovere il terreno oppure effettuando una aratura profonda almeno cm 20.

MA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Non si consiglia miscela di PANTER con altri prodotti. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della composizione completa.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto svolge la sua azione a carico di semi e germogli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, al fine della massima attività verso le colture sagginate, è indispensabile attenersi alle consigliate modalità e profondità di semina. In caso di semine superficiali ed irregolari la sensibilità può essere ridotta specialmente se forti piogge sopravverranno dopo il trattamento. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per ottenere l'efficacia del trattamento e per evitare danni alla pianta, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CYANAMID (logo)

Officina di produzione autorizzata:
CYANAMID ITALIA S.p.A. - Zona Industriale - Catania;
DOW-ELANCO ITALIA S.r.l. - Ozzano Emilia (BO);
SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO);
SILIA S.p.A. - Aprilia (LT).

Taglie delle confezioni autorizzate: litri 1 - litri 5 - litri 20.

Distributori: gli eventuali Distributori, diversi dalla titolare della registrazione, verranno notificati dopo il perfezionamento dei relativi accordi commerciali.

TRITIFEN *


DISERBANTE LIQUIDO EMULSIONABILE PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANIMALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI

TRITIFEN* - Diserbante liquido concentrato emulsionabile.
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

- Fenidimetalin puro	g 17 (p/170)
- Linuron puro	g 8 (p/ 80)
- Coloranti (emulsionanti e colorati) c.b.a.	g 100

(Contiene olii e saponificanti)

CLASSE TOSSICOLOGICA III



IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO - Irritabile - Irritante per la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori e gli aerosol - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CYANAMID ITALIA S.p.A. - Zona Industriale XIV Strada - CATANIA
 Divisione Agricoltura - Roma
 Succursale di AMERICAN CYANAMID COMPANY, WAYNE, New Jersey (USA)

Procedura Sanitaria - Registrazione Min. Sanità n. 7104 del 3.7.1987

Distribuito da: (nome da elenco redattore)
 Officina di produzione: (nome da elenco redattore)

L'IMBALLAGGIO NON PUO' ESSERE RUTILIZZATO

Contenuto netto: (nome da elenco redattore)
 Codice: | Lotto:

*Marchio registrato AMERICAN CYANAMID COMPANY, Wayne, N.J. (USA)

ATTENZIONE. MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME PRECAUZIONALI - Preparare la miscela in recipienti appositi possibilmente all'aperto o in locali ariati diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, depositi mangimi - Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di fessole filtranti - Non contaminare altre colture - Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua - Non operare contro vento - Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco - Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore - Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive FENIDIMETALIN 17% e LINURON 8% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione FENIDIMETALIN - Sintomi nell'animale da esperimento si osservano depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni LINURON (derivato dell'urea) - Sintomi durante l'impiego può causare congiuntivite, mite, nonché irritazione della gola e della cute L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea Sono casi subletali ed emolenti Terapia sintomatica Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE - Il TRITIFEN va usato in pre-emergenza delle colture ed è attivo sulle più comuni infestanti di cui inibisce la germinazione dei semi e impedisce lo sviluppo anche se si trovano nelle primissime fasi di crescita (non oltre 1 foglio per le graminacee e 2-3 foglie vere per le dicotiledoni). Le principali specie di erbe controllate dal TRITIFEN sono Alopecurus, Avena, Diglossis, Echinochloa, Poa, Setaria fra le graminacee, ed Amaranthus, Aragalla, Artemisia, Capsella, Cirsium, Chenopodium, Fumaria, Galinsoga, Lamium, Malva, Malvastrum, Mercurialis, Myosotis, Papaver, Polygonum, Portulaca, Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Salsola, Stellaria, Thlaspi, Veronica e Viola fra le dicotiledoni.

ISTRUZIONI PER L'USO - Il TRITIFEN può essere impiegato alle dosi e nelle epoche indicate per il diserbante erbivoro delle seguenti colture: - CAROTA, GIRASOLE, GRANO, ORZO: 5-6 l/ha pre-emergenza; - PATATA: 5-6 l/ha pre-emergenza o dopo la semina; - MAIS: 5-6 l/ha pre-emergenza; - SOIA: 4-5 l/ha pre-emergenza. Le dosi più alte in genere sono consigliate su terreni poveri e sabbiosi oppure dove si prevedono forti infestazioni di graminacee. Si consiglia l'impiego del prodotto su terreni molto sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1% o su terreni calcarei.

MODALITA' D'IMPIEGO - Perché il TRITIFEN svolga nel migliore dei modi la propria azione si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti: - preparare accuratamente il terreno per la semina in modo che sia ben livellato e omogeneo; - seminare le colture in maniera regolare avendo cura che i semi siano posti ad una profondità di almeno cm 3 per cereali e di almeno cm 4 per girasole, grano, orzo, mais e soia; - evitare che alcuni semi rimangano scoperti e non siano sufficientemente inumiditi; - diluire il prodotto in un volume d'acqua sufficiente ad assicurare una uniforme distribuzione su tutta la superficie da trattare, evitando le sovrapposizioni; - non incorporare; - dopo il trattamento lavare accuratamente e separatamente con acqua e sapone i recipienti e le attrezzature usati per la diluizione e la distribuzione del prodotto. Colture successive e successive - dal trattamento alla semina di colture successive devono trascorrere almeno 5 mesi; - nel caso occorresse ripulire su terreni già trattati evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante mantenendo alle profondità suggerite senza smuovere il terreno oppure effettuando con aratro una lavorazione profonda almeno cm 20 prima della semina.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Non si consiglia miscela di TRITIFEN con altri prodotti. Avvertenza: in caso di miscela con altri prodotti deve essere rispettato il periodo di carenza di legge. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione ritenere il medico della miscelazione completa.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto svolge la sua azione a carico di semi e gemme localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, al fine della massima efficacia verso le colture saggiate è indispensabile attenersi alle caratteristiche modalità e profondità di semina. In caso di semina superficiale ed irregolare la sensibilità può essere ridotta specialmente se forti piogge sopravverranno dopo il trattamento. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per ottenere l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SPURGO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CYANAMID (logo)

Officina di produzione autorizzata:
CYANAMID ITALIA S.p.A. - Zona Industriale - Catania;
DOMELANCO ITALIA S.r.l. - Ozzano Emilia (BO);
SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO);
SIUA S.p.A. - Aprilia (LT).

Teglie delle confezioni autorizzate: litri 1 - litri 5 - litri 20.

Distributori (oltre le titolari della registrazione):
SANDOZ AGRO S.p.A. - Milano.
 Ogni altro eventuale distributore sarà notificato dopo perfezionamento dei relativi accordi commerciali.

Ditta: DOW ELANCO***Principio attivo:*****CLOROTALOMIL****LINURON*****Presidio sanitario:*****BANVINIL
BLOC BLEND
NOTAR
NOTAR FLOWABLE
POLTIL D
RUBICLOR****SCIANDOR
SONALEN COMBI
TRINULAN**

BANVINIL

Anticrittogamico ad azione
preventiva e curativa

Sospensione concentrata (flowable)

BANVINIL


Composizione:

CLOTOTALONIL puro g 36 (= 450 g/l)

CARBENDAZIM puro g 10 (= 125 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE



NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per contatto con

la pelle e per ingestione.

Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata
dei bambini. Conservare lontano
da alimenti o mangimi e da bevande.

Non mangiare, né bere, né fumare
durante l'impiego. Evitare il

contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con
gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con
acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e
guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se
possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco Italia S.r.l.

Via della Chimica 3

40064 OZZANO EMILIA (Bologna)

Officina di produzione:

Registrazione N.3690 dell'1/12/1980 del Ministero della
Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

.... litri

Partita n° ...

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi
d'acqua. Non operare contro vento.

Avvertenza: Nella preparazione della miscela munirsi di
guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti
apposti, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da
quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta
e verdura, deposito mangimi. Lo smaltimento delle confezioni
vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire
secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in
prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CLOTOTALONIL puro 36%; CARBENDAZIM puro 10%, le
quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Clototaloni: Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato
respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Carbendazim: Sintomi: Non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una
sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbamato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE: anticrittogamico ad azione preventiva e
curativa.

Colture, parassiti combattibili, dosi, epoche e modalità
d'impiego: l'impiego è consentito solo in campo. Per melo, pero,
pesco e susino non superare le dosi di 2,2 l/ha per trattamento e con
un massimo di 4 trattamenti all'anno.

Tempo di rientro in campo: 12 ore dopo ogni trattamento.

MELO: contro cancro ramoso (Nectria): trattamenti al bruno a 200
ml/ha; contro ticchiolatura e oidio: trattamenti sulla vegetazione a 150 -
180 ml/ha, con cadenza settimanale nel periodo primaverile e ad
intervalli più lunghi nei periodi successivi.

PERO: contro cancro ramoso (Nectria): trattamenti al bruno a 200
ml/ha; contro ticchiolatura e alternaria: trattamenti sulla vegetazione
a 150-180 ml/ha, con cadenza settimanale nel periodo primaverile e ad
intervalli più ampi nei periodi successivi.

PESCO e SUSINO: contro boia, corineo e cancro ramoso (Fusicocum
e Cytospora): trattamenti al bruno a 220 ml/ha; contro boia,
corineo e monilia: trattamenti sulla vegetazione a 180-200 ml/ha;
effettuare almeno un trattamento all'inizio e uno a fine fioritura.

GLADIOLI, TULIPANI ED ALTRE BULBOSE DA FIORE:
contro fusarium e sclerotinia a 500 ml/ha per immersione dei bulbi per
circa 30 minuti.

ROSE ED ALTRE PIANTE DA FIORE ED ORNAMENTALI:
contro oidio, ruggine, septoriosi, antracnosi 150-200 ml/ha. Trattare
ogni 7-14 giorni.

GAROFANO: contro phialophora: 350 ml/ha in pre-trapianto, per
immersione delle talee per 8-12 ore; 2 ml/m² in post-trapianto, con 2-
10 litri d'acqua/m² ogni 20-30 giorni per l'intero ciclo vegetativo.

COLTURE DA FIORE: contro fusariosi, sclerotinia e marciumi radicali
causati da Pythium: 2 ml/m² prima della semina o del trapianto.

Preparazione e distribuzione della miscela: agitare bene
la confezione prima di versare la quantità consigliata nel serbatoio
dell'irroratrice riempito a metà; mescolare bene durante il
completamento del riempimento. Irrigare uniformemente le superfici
vegetali da proteggere per ottenere una perfetta copertura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari
ad eccezione di quelli a reazione alcalina e con gli oli minerali.
Le miscele con insetticidi dovranno essere eseguite subito prima
dell'impiego. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati
deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre
essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più
tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il
medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: per melo e pero attenersi scrupolosamente alle dosi
consigliate: concentrazioni superiori possono provocare rugginosità
sulle varietà Golden ed altre a buccia rossa. **AVVERTENZA:** deve
essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli
oli minerali.

Sospendere i trattamenti 21 GIORNI prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura
nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è
pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali
danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per
assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante,
alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie: 200ml - 250ml - 1l - 5l

Officina di produzione: DowElanco Italia S.r.l. - Ozzano Emilia (BO)

SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)

SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)


Rhone-Poulenc Agro S.p.A. - Paganica (AQ)

S.B.A. CHEME - Ougree (Belgium)

BLOC BLEND

COMBINAZIONE DI FUNGICIDI
A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER LA LOTTA
ALLA TICCHIOLATURA DEL MELO E DEL PERO E
ALL'OIDIO DEL MELO

Sospensione concentrata (flowable)

<p>BLOC BLEND</p> <p>Composizione: NUARIMOL puro g 2 (= 23 g/l) CLOROTALONIL puro g 32 (= 360 g/l) Coformulanti q.b. a g 100</p> <p>FRASI DI RISCHIO Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.</p> <p>CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).</p> <p>DowElanco Italia S.r.l. Via della Chimica 3 40064 OZZANO EMILIA (Bologna)</p> <p>Stabilimento produttore:</p> <p>Registrazione N.7407 del 2/2/1988 del Ministero della Sanità</p> <p>IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO</p> <p>.... litri Parità n° ...</p>	<p>II CLASSE</p>  <p>NOCIVO</p>
--	--

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

Avvertenze: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Non conservare sotto 0°C.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattati di associazione delle seguenti sostanze attive: NUARIMOL puro 2%; CLOROTALONIL puro 32%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Clorotalonil: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

Nuarimol: Irritante.

Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE ED ISTRUZIONI PER L'USO

Culture, malattie combattute, dosi ed epoche d'impiego:

melo (ticchiolatura e oidio) pero (ticchiolatura): 130-170 ml per 100 litri di acqua ogni 7-8 giorni fino alla fase fenologica di frutto noce, successivamente, applicare il prodotto ogni 9-12 giorni. Usare la dose più alta in periodi, zone e varietà a più alto rischio. Impiegare solo in campo. Non superare la dose di 2,750 litri di prodotto/ha per trattamento e con un massimo di 4 trattamenti all'anno. Tempo di rientro in campo: 12 ore dopo ogni trattamento.

Modalità d'impiego: il prodotto può essere distribuito con qualsiasi irroratrice in buona efficienza e che assicuri una distribuzione uniforme della soluzione fungicida sulla vegetazione da proteggere.

Preparazione della miscela: miscelare la quantità necessaria di prodotto in una quantità limitata di acqua, versare la miscela in una botte riempita a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i principali fungicidi, insetticidi ed acaricidi usati sulle colture in etichetta, eccetto oli minerali e prodotti a reazione alcalina. Nel caso si debba effettuare un trattamento con olio minerale impiegare il prodotto ad un intervallo di almeno due settimane. Comunque poiché non sono state provate tutte le possibili combinazioni con i vari formulati commerciali, si suggerisce di provare la compatibilità fisica di ciascuna miscela estemporanea preparandone una piccola quantità prima dell'impiego. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 GIORNI prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: 250 - 500 ml / 1 - 5 litri

Stabilimenti autorizzati: DowElanco Italia S.r.l. - Ozzano Emilia (Bologna) SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina)
DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (Bergamo) SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (Bologna)
SIPCAM S.p.A. - Salerano S. Lambro (Milano)

NOTAR

Anticrittogamico

Granuli idrodispersibili (WDG)

NOTAR

Composizione:
CLOROTALONIL puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100,00

FRASI DI RISCHIO:

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowEianco Italia S.r.l.
Via della Chimica 3
40064 OZZANO EMILIA (Bologna)


Stabilimento produttore:

Registrazione N. 4594 del 11/2/1982 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

.... **Kg** Partita n° ...

II CLASSE



NOCIVO

CARATTERISTICHE: fungicida a largo spettro d'azione.
CAMPI D'IMPIEGO, MALATTIE COMBATTUTE, EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO:

MELO E PERO (solo in campo. Non superare le dose di 1,3 kg/ha per trattamento e non eseguire più di 4 interventi all'anno).

- **Cancri ramosi (Nectria):** 150-200 g/ha in associazione a un fungicida benzimidazolico alla normale dose d'impiego. Eseguire almeno 2 trattamenti: il primo alla caduta delle foglie ed il secondo all'ingrossamento delle gemme.

- **Ticchiolatura ed Alternaria:** 60-80 g/ha in associazione a fungicidi sterofinibitori alla normale dose d'impiego. Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire a seconda del calendario d'incubazione delle malattie.

PESCO E SUSINO (solo in campo. Non superare le dose di 1,3 kg/ha per trattamento e non eseguire più di 4 interventi all'anno). **Bolla, Corineo, Cancri ramosi e Monilia:** 130-150 g/ha in associazione ad un fungicida benzimidazolico alla normale dose d'impiego. Eseguire i trattamenti alle seguenti fasi fenologiche: caduta foglie, ingrossamento gemme, sfioritura, frutti in accrescimento.

COLTURE ORTICOLE (impiegare a scopo preventivo, a seconda del calendario d'incubazione delle malattie):

- **Pomodoro e patata:** contro peronospora, alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi non vascolari, muffa grigia e bianca, septoria, rizoclonia.

65-65 g/ha nei trattamenti in serra

150-200 g/ha = 1,5-2 kg/ha nei trattamenti in pieno campo ed in serra

Per pomodoro non eseguire più di 3 interventi all'anno per la coltura di pieno campo e di 5 per la coltura sotto serra. Per patata massimo di 2 trattamenti all'anno.

- **Cipolla (in pieno campo):** contro peronospora, muffa grigia e bianca, alternaria 200-230 g/ha con un massimo di 2 kg di prodotto/ha per trattamento e di due interventi all'anno (aggiungere adesivante).

- **Cocomero, melone, cetriolo:** contro alternaria, peronospora, antracnosi, vaiolatura, cladosporiosi, rizoclonia, fusariosi non vascolari. 160-200 g/ha (con un massimo di 2 kg di prodotto/ha per trattamento e di 3 interventi all'anno).

- **Sedano:** contro septoria, rizoclonia, cercospora e sclerotinia 200-270 g/ha (massimo di 2 kg di prodotto/ha e di 3 interventi all'anno).

- **Fagiolo e fagiolino (in pieno campo):** contro vaiolatura, muffa grigia. 160-200 g/ha (massimo di 1,9 kg di prodotto/ha per trattamento e di 2 interventi all'anno).

COLTURE FLOREALI: contro ticchiolatura, botrytis, ruggine, antracnosi, septoriosi, fusariosi non vascolari, alternaria. 130-200 g/ha.

Tempo di rientro (per tutte le colture)

- in campo: 12 ore dopo ogni trattamento

- in serra: 24 ore dopo ogni trattamento

Preparazione e distribuzione della miscela: versare la quantità consigliata di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà e mescolare bene durante il completamento del riempimento. Bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e con oli minerali. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: per melo e pero attenersi scrupolosamente alle dosi consigliate; concentrazioni superiori possono provocare rugginosità sulla varietà Golden ed altre a buccia rossa. Sulle colture da fiore più delicate eseguire saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali.

Sospendere i trattamenti 21 GIORNI prima della raccolta per melo, pero, pesco e susino e 14 GIORNI prima della raccolta per le altre colture.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: 500 g - 1 Kg - 5 Kg

Stabilimenti autorizzati: DowEianco Italia S.r.l. - Ozzano Emilia (BO)

UCB - Gent (Belgio)

NOTAR FLOWABLE

Anticrittogamico
Sospensione concentrata (flowable)


NOTAR FLOWABLE

Composizione:
CLOROTALONIL puro g 40,76 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100,00

II CLASSE

FRASI DI RISCHIO:

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.



NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco Italia S.r.l.
Via della Chimica 3 - 40084 OZZANO EMLIA (Bologna)
Stabilimento produttore:

Registrazione N. 6211 del 31/1/1985 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

.... litri Partita n° ...

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

Avvertenze:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto e in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed astessia.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

GARATTERISTICHE: fungicida a largo spettro d'azione.

CAMPI D'IMPIEGO, MALATTIE COMBATTUTE, EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO:

MELO E PERO (solo in campo. Non superare la dose di 2 litri/ha per trattamento e non eseguire più di 4 interventi all'anno).

Cancro rameale (Nectria): 250-300 ml/ha in associazione a un fungicida benzimidazolico alla normale dose d'impiego. Eseguire almeno 2 trattamenti: il primo alla caduta delle foglie ed il secondo all'ingrossamento delle gemme.

Ticchiolatura ed Alternaria: 80-120 ml/ha in associazione a fungicidi stercoinibitori alla normale dose d'impiego. Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire a seconda del calendario d'incubazione delle malattie.

PESCO E SUSINO (solo in campo. Non superare la dose di 2 litri/ha per trattamento e non eseguire più di 4 interventi all'anno).

Bolle, Corineo, Cancro rameale e Monilia: 200-250 ml/ha in

associazione ad un fungicida benzimidazolico alla normale dose d'impiego. Eseguire i trattamenti alle seguenti fasi fenologiche: caduta foglie, ingrossamento gemme, sfioritura, frutti in accrescimento.

COLTURE ORTICOLE (impiegare a scopo preventivo, a seconda del calendario d'incubazione delle malattie):

Pomodoro e patata: contro peronospora, alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi non vascolari, muffa grigia e bianca, septoria, rizoctonia. 100-130 ml/ha nei trattamenti in semenzale, 250-300 ml/ha = 2,5-3 litri/ha nei trattamenti in pieno campo ed in serra.

Per pomodoro non eseguire più di 3 interventi all'anno per la coltura di pieno campo e di 5 per la coltura sotto serra. Per patata massimo di 2 trattamenti all'anno.

Cipolla (in pieno campo): contro peronospora, muffa grigia e bianca, alternaria 300-350 ml/ha con un massimo di 3 litri di prodotto/ha per trattamento e di due interventi all'anno (aggiungere adesivante).

Cocomero, melone, ostrione: contro alternaria, peronospora, antracnosi, ticchiolatura, cladosporiosi, rizoctonia, fusariosi non vascolari. 250-300 ml/ha (con un massimo di 3 l di prodotto/ha per trattamento e di 3 interventi all'anno).

Sedano: contro septoria, rizoctonia, cercospora e sclerotinia 300-400 ml/ha (massimo di 3 l di prodotto/ha e di 3 interventi all'anno).

Fagiolo e fagioline (in pieno campo): contro peronospora, antracnosi, ruggine. 250-300 ml/ha (massimo di 2,4 l di prodotto/ha per trattamento e di 2 interventi all'anno).

COLTURE FLOREALI: contro ticchiolatura, botrytis, ruggine, antracnosi, septoriosi, fusariosi non vascolari, alternaria. 200-300 ml/ha.

Tempo di rientro (per tutte le colture)

- in campo: 12 ore dopo ogni trattamento
- in serra: 24 ore dopo ogni trattamento

Preparazione e distribuzione della miscela: agitare bene la confezione prima di versare la quantità consigliata di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà e mescolare bene durante il completamento del riempimento. Begnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e con oli minerali. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: per melo e pero atenersi scrupolosamente alle dosi consigliate; concentrazioni superiori possono provocare rugginosità sulla varietà Golden ed altre a buccia rossa. Sulle colture da fiore più delicate eseguire saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali.

Sospendere i trattamenti 21 GIORNI prima della raccolta per melo, pero, pesco e susino e 14 GIORNI prima della raccolta per le altre colture.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: 1 - 5 litri

Stabilimenti autorizzati: DowElanco Italia S.r.l. - Ozzano Emilia (Bologna) SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina)
S.B.A. CHEMIE - OUGREE (Belgium) LIGTERMOET CHEMIE B.V. - ROSENDAAL (Netherlands)

POLTIL D

Anticrittogamico cuproorganico
Sospensione concentrata (flowable)

POLTIL D

Composizione:

Clorotaloni puro g 10 (= 145g/l)
Rame metallo (sottoforma di ossicloruro) g 20 (= 290 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco Italia S.r.l.

Via della Chimica 3 40064 OZZANO EMILIA (Bologna)

Stabilimento produttore:


DowElanco Italia S.r.l. OZZANO EMILIA (Bologna)

Registrazione N.4885 del 3/8/1982 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

.... litri Partita n° ...

II CLASSE



NOCIVO

Impieghi ammessi, malattie combattute, doel ed epoche d'applicazione:

Solo in pieno campo, a scopo preventivo a seconda del calendario d'incubazione delle malattie. Per melo, pero, pesco e susino: massimo 4 interventi all'anno. Per pomodoro: massimo 3 interventi all'anno. Per patata e cipolla: massimo 2 interventi all'anno. Tempo di rientro in campo: 12 ore dopo ogni trattamento. Melo e pero: contro ticchiolatura e cancri rameali (Nectria) in trattamenti invernali a 500 - 600 ml/l in miscela a fungicidi sistemici.

Pesco e susino: contro bolla, corineo, monilia, cancri rameali (Fusicoccum e Cytospora) in trattamenti invernali a 500 - 600 ml/l in associazione a fungicidi sistemici. Pomodoro, patata, cipolla: contro peronospora, alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi non vascolari, muffa bianca e grigia, septoria, rizoctonia a 400 - 600 ml/l solo in post-fioritura (o ad allegazione avvenuta).

Preparazione e distribuzione della miscela: agitare bene la confezione prima di versare la quantità consigliata nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà; mescolare bene durante il completamento del riempimento. Irrorare uniformemente le superfici vegetali da proteggere per ottenere una perfetta copertura. Se necessario aggiungere anche un bagnante.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina ed oli minerali. **AVVERTENZE:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia pertanto l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. **Cultivars di melo:** Abbondanza Belfort, Black Ben Davis, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Renetta del Canada, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, King Davis, Rosa Mantovana. **Cultivars di pero:** Abate Fetel, Buona Luigia d'Avanches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Kaiser, B.C. William, Dr; Jules Guyot, Favorita di Klapp, Butirra Giffard. Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di melo e di pero, prima dell'applicazione in pieno campo, saggiare la selettività del formulato su alcune piante. Deve essere irrorato a distanza di almeno 21 giorni dall'impiego degli oli minerali.

Nochività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 21 GIORNI prima della raccolta delle mele, pere, pesche e susine e 20 GIORNI per le altre colture.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Taglia: 1 - 10 litri

RUBICLOR

Fungicida ad azione preventiva e curativa
contro oidio e ticchiolatura del melo e del
pero

Sospensione concentrata (flowable)

RUBICLOR

Composizione:

Fenarimol puro g 2 (= 22 g/l)
Clorotalonil puro g 23 (= 253 g/l)
Colorimulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle
e per ingestione.
Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei
bambini. Conservare lontano da
alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il
contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con
gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con
acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e
guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se
possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco Italia S.r.l.

Via della Chimica 3 - 40064 OZZANO EMILIA (Bologna)

Stabilimento produttore:


DowElanco Italia S.r.l. - OZZANO EMILIA (Bologna)

Registrazione n. 7207 del 3/7/1987 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

.... litri Partita N°...

II CLASSE



NOCIVO

Caratteristiche: combinazione di fungicidi ad azione pre-
ventiva e curativa.

Culture e malattie combattute: melo (ticchiolatura ed
oidio), pero (ticchiolatura).

Dosi, epoche e modalità d'impiego: 150-200 ml/l ad
intervalli di 7-12 giorni. Usare le dosi più alte e gli intervalli più
corti durante le fasi di sviluppo della coltura in cui la suscet-
tibilità alle malattie combattute è maggiore. Bagnare abbon-
dantemente ed uniformemente tutta la vegetazione da pro-
teggere. Impiegare solo in campo. Non superare la dose di
3,9 litri di prodotto/ha per trattamento e con un massimo di 4
trattamenti all'anno.

Tempo di rientro in campo: 12 ore dopo ogni trattamento.

Preparazione e distribuzione della miscela: agita-
re bene la confezione prima di versare la quantità consi-
gliata nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà; mescolare
bene durante il completamento del riempimento. Irrorare uni-
formemente le superfici vegetali da proteggere per ottenere
una perfetta copertura.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: RUBICLOR è compatibile con i più comuni
antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e
con gli olii minerali. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con
altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più
lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzio-
nali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificas-
sero casi di intossicazione, informare il medico della miscela-
zione compiuta.

Fotossicità: RUBICLOR va usato con cautela su varia-
tà soggette a rugginosità e non deve essere irrorato prima
che siano passati 14 giorni da un eventuale trattamento con
oli minerali.

Sospendere i trattamenti 21 GIORNI prima della
raccolta.

**Attenzione ad impiegare esclusivamente in agri-
coltura nella epoche e per gli usi consentiti: ogni
altro uso è pericoloso.**

**Chi impiega il prodotto è responsabile degli even-
tuali danni derivanti da uso improprio del pre-
parato.**

**Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale
per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni
alle piante, alle persone ed agli animali.**

DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi
d'acqua. Non operare contro vento.

Avvertenze:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di
facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi,
possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli
adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e
verdura, deposito mangimi. Lo smaltimento delle confezioni
vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire
secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in
prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FENARIMOL puro 2%; CLOROTALONIL puro 23%; le quali,
separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossica-
zione:

Clorotalonil: Sintomi: Irritante per la cute e le mucose
dell'apparato respiratorio.

Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibiliz-
zante. Può provocare danni renali ed stasia.

Fenarimol: -----

Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni.

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 litri

SCIANDOR

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO IN PRE-EMERGENZA DI INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI IN COLTURE DI FRUMENTO, ORZO E SEGALE, GIRASOLE, CAROTA, SEDANO, FINOCCHIO

Liquido emulsionabile

SCIANDOR

Composizione:
TRIFLURALIN puro g 23,50 (=240 g/l)
LINURON puro g 11,75 (= 120 g/l)
Coformulanti q.b. ag 100,00
Contiene xilene

III CLASSE

ATTENZIONE:

manipolare con prudenza

FRASI DI RISCHIO

Inflammabile

Irritante per gli occhi e la pelle.

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco Italia S.r.l.


Via della Chimica 3 - 40064 OZZANO EMILIA (Bologna)

Stabilimento produttore:

Registrazione n° 1653 del 21/5/1974 del Ministero della Sanità

..... litri

Partita N°



IRRITANTE

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

Avvertenze:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: TRIFLURALIN puro 23,50%; LINURON puro 11,75%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Linuron: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono casi subletali ed ematuria.

Trifluralin: —

Il prodotto contiene anche ISOFORONE che ha un'azione narcotica, irritante per le mucose, con la possibilità di danno cumulativo epatorrenale.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 litri

Stabilimenti autorizzati: DowElanco Italia S.r.l. - Ozzano Emilia (BO)
SIAPA S.p.A. - S.Vincenzo di Galliera (BO)

ISTRUZIONI PER L'USO DI SCIANDOR

Infestanti controllate:

Graminacee annuali: Alopecurus agrestis, Alopecurus myosuroides, Alopecurus pratensis, Apera spica-venti, Briza minor, Lolium multiflorum, Poa spp., Poa annua.

Dicotiledoni annuali: Alchemilla arvensis, Anagallis arvensis, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Fumaria officinalis, Juncus bufonius, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Lithospermum arvense, Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Myosotis arvensis, Myosurus minimum, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Ranunculus spp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sonchus asper, Specularia perfoliata, Stellaria media, Thlaspi arvense, Valerianella auricula, Veronica spp.

SCIANDOR non controlla: Avena fatua, A. ludoviciana e A. sterilis, Agropyron repens, Cirsium spp. e Tussilago farfara.

Coltura: frumento duro e tenero, orzo e semina invernale, segale a semina invernale, girasole, carota, sedano, finocchio.

Epoca d'impiego: lo SCIANDOR deve essere usato dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura da trattare.

Sistema di distribuzione: SCIANDOR deve essere distribuito per irrorazione e non deve essere incorporato nel terreno.

Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati, il letto di semina deve essere ben preparato (eliminando le zolle grosse) e tutti i semi devono essere ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme.

ISTRUZIONI SPECIALI:

- Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi tra l'applicazione di SCIANDOR e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio.

- Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.

- La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

- Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

Dose d'impiego: sui cereali distribuire 3-3,8 litri per ha di prodotto per ogni tipo di terreno.

Girasole, carota, sedano, finocchio: applicare in pre-emergenza della coltura alla dose di 3,8 litri/ha.

Volume di irrorazione: applicare SCIANDOR in 200-800 litri di acqua per ha; SCIANDOR deve essere aggiunto nella botte riempita a metà di acqua ed agitato bene durante il completamento del riempimento. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare una qualsiasi attrezzatura irrorante a bassa pressione (1,5 - 5,0 Atm) provvista di barra e di ugelli per erbicidi e di una pompa di capacità adeguata ad assicurare una buona agitazione durante l'irroramento. Si raccomanda di montare un'efficiente valvola di chiusura per impedire la eccessiva fuoriuscita del prodotto nelle fasi di partenza, di svolta e di fermata.

Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto venga distribuito uniformemente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: miscela con altri prodotti antiparassitari non sono raccomandate. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

LILLY FRANCE S.A. - Fegersheim (France)

SONALEN COMBI

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO IN PRE-EMERGENZA DI INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI IN COLTURE DI MAIS

Liquido emulsionabile

SONALEN COMBI

Composizione:

ETALFLURALIN puro g 21,3 (= 240 g/l)

LINURON puro g 10,7 (= 120 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100,0

Contiene monodocrotoluene-orto

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile.

Nocivo per inalazione e ingestione.

Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

DowElanco Italia S.r.l.

Via della Chimica 3

40064 OZZANO EMILIA (Bologna)

Stabilimento produttore:


Registrazione n° 7418 del 25/2/1988 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

... litri

Partita N° ...

II CLASSE



NOCIVO

ISTRUZIONI PER L'USO

Infestanti controllate:

• **Graminacee annuali:** Alopecurus spp., Apera spica-venti, Digitaria sp., Echinochloa crus-galli, Lolium multiflorum, Panicum dichotomiflorum, Poa spp., Setaria, Sorghum hapelense da seme (mediamente sensibile).

• **Dicotiledoni annuali:** Alchemilla arvensis, Amaranthus spp., Anagallis arvensis, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Chenopodium spp., Fumaria officinalis, Juncus bulbosus, Lamium spp., Lithospermum arvense, Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Myosotis arvensis, Myosurus minimum, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Portulaca sp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Solanum sp., Specularia perfoliata, Stellaria media, Thlaspi arvense, Valerianella auricula, Veronica spp.

Epoca d'impiego: SONALEN COMBI deve essere usato dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.

Sistema di distribuzione: SONALEN COMBI deve essere distribuito per irrorazione e non deve essere incorporato nel terreno.

Preparazione del terreno: per ottenere migliori risultati, il letto di semina deve essere ben preparato (eliminando le zolle grosse) e tutti i semi devono essere ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme.

ISTRUZIONI SPECIALI

• Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del prodotto e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone e cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio.

• La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti più del 5% di sostanza organica.

• Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

Dose d'impiego: 3,5-4 litri/ha nei terreni di medio impasto e 4,5 litri/ha nei terreni argillosi.

Volume di irrorazione: applicare SONALEN COMBI in 200-300 litri d'acqua/ha; il preparato deve essere aggiunto nella botte riempita a metà di acqua ed agitato bene durante il completamento del riempimento. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare un'attrezzatura munita di agitazione ed operante a bassa pressione (1,5-5,0 Atm). Si raccomanda la distribuzione uniforme su tutta la superficie con attrezzature efficienti ed opportunamente tarate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: miscela con altri prodotti antiparassitari non sono raccomandate. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

Avvertenze:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.

Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

Conservare il prodotto in locali a temperatura oltre i 5°C.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Traitati di associazione delle seguenti sostanze attive: ETALFLURALIN puro 21,3%; LINURON puro 10,7%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Linuron: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.

L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subito ed ematuria.

Etalfluralin: —

Il prodotto contiene anche ISOFORONE che ha un'azione narcotica, irritante per la mucosa, con possibilità di danno cumulativo epatorrenale.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveletali.

Taglie autorizzate: 1 - 5 litri

Stabilimenti autorizzati: DowElanco Italia S.r.l. - Ozzano Emilia (BO)

ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S.Colombano al Lambro (MI)

LILLY FRANCE S.A. - Fegersheim (France)

SIPCAM S.p.A. - Salerano S.Lambro (MI)

TRINULAN

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO IN PRE-EMERGENZA DI INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI IN COLTURE DI FRUMENTO, ORZO E SEGALE, CAROTA, SEDANO, FINOCCHIO, FAGIOLINO

Liquido emulsionabile

TRINULAN

Composizione:

TRIFLURALIN puro g 23,7 (= 240 g/l)

LINURON puro g 8,9 (= 90 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100,0

Contiene xilene

IN CLASSE

ATTENZIONE:


manipolare con prudenza

FRASI DI RISCHIO

Inflammabile

Irritante per gli occhi e la pelle.

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.



IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco Italia S.r.l.

Via della Chimica 3

40064 OZZANO EMILIA (Bologna)

Stabilimento produttore:

Registrazione n° 7000 del 4/3/1987 del Ministero della Sanità

.... litri

Partita N°

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

Avvertenza:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtranti. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.

Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco.

Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: TRIFLURALIN puro 23,7%; LINURON puro 8,9%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Linuron: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitaneamente ed ematuria.

Trifluralin: —

Il prodotto contiene anche ISOFORONE che ha un'azione narcotica, irritante per le mucose, con la possibilità di danno cumulativo epatorenale.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL TRINULAN INFESTANTI CONTROLLATE

Graminacee annuali: Alopecurus agrestis, Alopecurus myosuroides, Alopecurus pratensis, Apera spica-venti, Echinochloa crus-galli, Lolium multiflorum, Poa annua, Poa spp., Lolium spp.

Dicotiledoni annuali: Alchemilla arvensis, Amaranthus spp., Anagallis arvensis, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Chenopodium album, Fumaria officinalis, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Lithospermum arvense, Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Myosotis arvensis, Myosotis minimum, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Ranunculus spp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sonchus asper, Spoutularia Speculum, Stellaria media, Thlaspi arvense, Valerianella auricula, Veronica spp.

TRINULAN non controllato: Avena fatua, A. ludoviciana e A. sterilis, Agropyron repens, Cirsium sp., Tussilago farfara, Convolvulus a.

Colture: frumento duro e tenero a semina invernale, orzo a semina invernale, segale a semina invernale, carota, sedano, finocchio, fagiolo, fagiolino.

Epoca d'impiego: TRINULAN deve essere usato dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura da trattare.

Sistema di distribuzione: TRINULAN deve essere distribuito per irrorazione e non deve essere incorporato nel terreno.

Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati, il letto di semina deve essere ben preparato (eliminando le zolle grosse) e tutti i semi devono essere ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme.

ISTRUZIONI SPECIALI

• Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del formulato e la seguente semina di qualsiasi coltura in rotazione.

• Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.

• La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

• Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

DOSE D'IMPIEGO:

Cereali: distribuire 3,8 litri/ha per ogni tipo di terreno

Fagiolo, fagiolino: applicare in pre-emergenza della coltura alla dose di 3,8 litri/ha

Carota, sedano, finocchio: applicare in pre-emergenza della coltura alla dose di 3-3,8 litri/ha. Impiegare la dose più bassa su terreni leggeri e su colture irrigate.

Volume di irrorazione: applicare TRINULAN in 200-800 litri d'acqua/ha; il preparato deve essere aggiunto nella botte riempita a metà di acqua ed agitato bene durante il completamento del riempimento. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare una qualsiasi attrezzatura irrorante a bassa pressione (1,5-5,0 Atm) provvista di barra e di ugelli per erbicidi e di una pompa di capacità adeguata ad assicurare una buona agitazione durante l'irroramento. Si raccomanda di montare una efficiente valvola di chiusura per impedire la eccessiva fuoriuscita del prodotto nelle fasi di partenza, si ferma. Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto venga distribuito uniformemente. Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: miscela con altri prodotti antiparassitari non sono raccomandate. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 60 GIORNI prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 litri

Stabilimenti autorizzati: DowElanco Italia S.r.l. - Ozzano Emilia (BO)
BASUNI S.p.A. - Treviglio (BG)

SILA S.p.A. - Aprilia (LT)

DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)

Ditta: DU PONT CONID*Principio attivo:*

AMITRAZ
CLOROTALONIL

LINURON

Presidio sanitario:

FLUMITRAZ
CLORTAN L
DANCEL
SANORTO

INEX
INEX M
LOROX 50 DF
LOROX L
TRINET L

FLUMITRAZ

**CLASSE III
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA**

Polvere bagnabile - Insetticida polivalente per contatto e per ingestione per la lotta contro i parassiti dei meli e dei peri.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Diflubenzuron p.a. puro g 3,8
Amitraz p.a. puro g 15,4
Bagnanti, disperdenti ed inertii quanto basta a 100 grammi

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. - Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. - Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. - Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: diflubenzuron p.a. puro 3,8%, amitraz p.a. puro 15,4% per cui possono determinarsi effetti sommatori per l'uomo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE

AMITRAZ: Sintomi: irritante per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, ipereccitabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile iperglicemia. Terapia: sintomatica, monitoraggio cardiorespiratorio per il rischio della bradicardia.

CARATTERISTICHE

FLUMITRAZ è efficace contro i principali parassiti del melo e del pero, controllando la popolazione di acari resistenti e tutti gli stadi del ragno rosso e particolarmente le uova estive e le neanidi, come pure la psilla del pero, i fillo-minatori ed altri lepidotteri. Esso ha anche una certa azione contro gli afidi, cicaline e cocciniglie. FLUMITRAZ è sufficientemente persistente per proteggere le piante trattate per molto tempo.

MODALITA' D'IMPIEGO

Dosi per 100 litri d'acqua (massimo 2 trattamenti per anno)

MELO E PERO

Contro i microlepidotteri minatori (*Lithocolletis*, *Cemiosoma*): alla dose di 200 - 250 g, effettuando il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza della ovideposizione.

Contro la Psilla del pero: effettuare il trattamento ai primi sintomi di infestazione, alla dose di 200 - 250 g, ripetendolo se necessario.

Contro la Carpocapsa: trattare dopo la caduta dei petali, alla dose di 200 - 250 g, ripetendo il trattamento se necessario.

Contro Capua e *Cacoecia*: trattare all'ovideposizione, alla dose di 200 - 250 g, con un trattamento in pre- o post- fioritura contro le larve svernanti ed un secondo trattamento nella prima metà di giugno, contro la prima generazione estiva.

Contro gli Acari: trattare alla schiusura delle uova, oppure alla prima comparsa di attacco alla dose di 200 - 250 g, e ripetere se necessario.

Contro gli Afidi: ai primi sintomi di attacco, alla dose di 200 - 250 g, ripetendo il trattamento se necessario.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

FLUMITRAZ è compatibile con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

In caso di dubbio o di varietà poco diffuse o di recente acclimattazione si consiglia di eseguire preventivamente prove parcellari.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

DU PONT CONID S.P.A. - BOLZANO, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE

DU PONT CONID S.P.A. - Stabilimento di Bolzano - Via Sienens 12

Registrazione N. 7336 del 16.12.1987 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto kg 1 - 5



DU PONT CONID S.P.A.

DANCEL

SOSPENSIONE CONCENTRATA - Fungicida a largo spettro d'azione contro le malattie fungine in frutticoltura (melo, pero, pesco), orticoltura (sedano, patata, pomodoro, fagioli, pisello, cetriolo, melone, cocomero, cipolla), piante ornamentali e floricole (rosa, garofano, ortantermo, geranio, iris, zinnia) in pieno campo.

DANCEL

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Clorotaloni puro g 40 (= 500 g/l)
Coadiuvanti e inerti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione e contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare lontano da alimenti e mangimi e bevande.- Non distarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.- In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrare l'etichetta).- Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE DU PONT CONID SPA - Bolzano, Via Pieve 2
OFFICINE DI PRODUZIONE DU PONT DE NEMOURS (France) S.A. - Stabilimento di Carnay (Francia)

Registrazione N. 5735 del 27.01.1984 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.: vedere a ...

CLASSE II



NOCIVO

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare la confezione ben chiusa.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.- Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofar-

maco.- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

Il DANCEL è un fungicida a largo spettro d'azione che consente di prevenire e combattere diverse malattie delle piante coltivate come Peronospora, Muffa grigia, Ticholietura, Cercospora, Ruggine, Marciume bruno, Alternaria, Nectria, Septorio, Cladosporio, Botte, Valetaria, Antracnosi, Marciume dei fusti, Fusariosi, Meriziosi, Cancro dei rami delle drupacee, Ricettorio. E' dotato di azione residua e resistente al dilavamento, assicurando la protezione delle colture anche in condizioni difficili.

Deel - Epacche - Modaltà d'impiego

Melo e pero: 1,2-2 l/ha. Contro Ticholietura e Alternaria intervenire sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, al massimo 4 volte per stagione.

Pesce: 1,6-2 l/ha. Contro Botrytis, Sclerotinia, Phizopus, Gloeosporium, Penicillium intervenire sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, al massimo 4 volte per stagione.

Sedano: 2-3 l/ha. Contro Septoria, Cercospora, Alternaria, Sclerotinia intervenire prima della comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento altre 2 volte in caso di necessità.

Patata: 2-3 l/ha. Contro Peronospora e Alternaria intervenire effettuando il trattamento prima della comparsa dei sintomi e ripetendolo in caso di necessità.

Pomodoro: 2-3 l/ha. Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporio e Septoria intervenire effettuando 3 trattamenti a intervalli regolari nel corso della stagione iniziandoli prima della comparsa dei sintomi della malattia. Per i trattamenti in serra contro le stesse malattie sono consigliati 5 trattamenti.

Fagioli e pisello: 2-2,4 l/ha. Contro Antracnosi, Septoria, Botte intervenire prima della comparsa dei sintomi. Ripetere il trattamento in caso di necessità.

Casertitea (fagioli), melone, cocomero: 2-3 l/ha. Contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporio effettuare 3 trattamenti sia in serra sia in pieno campo ad intervalli regolari iniziandoli prima della comparsa dei sintomi.

Cipolla: 2-3 l/ha. Contro Peronospora e Botte intervenire tempestivamente prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità.

Piante ornamentali e floricole in pieno campo (rosa, garofano, ortantermo, geranio, iris, zinnia): 200-250 ml/ml. Contro Peronospora, Septoria, Ruggine, Alternaria, Antracnosi, Cla-

dosporio e Ticholietura intervenire prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità. Si consiglia di effettuare saggi preliminari di sensibilità varietale prima di trattare tutta la superficie, soprattutto nel caso di colture in serra. Sulle piante di difficile bagnabilità è consigliabile l'aggiunta di ml 30 per 100 litri d'acqua di BAGRANTE AMORIN alla poltiglia.

Avvertenza: Osservare, dopo il trattamento i seguenti tempi di rientro: in campo 12 ore, in serra 24 ore.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura. Agitare energicamente la confezione prima dell'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AERII

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, poltiglia).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può provocare fenomeni di rugginosità su alcune varietà di melo Golden Delicious e su altre a buccia rossa. Su alcune colture da fiore più delicate è consigliabile eseguire saggi preliminari prima di trattare l'intera coltura.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta su colture orticole e patate, 21 giorni prima della raccolta su pomaceo e su drupacee.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epacche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SPURGO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Altra Officina:
SBA - Stabilimento di Ougrée (Belgio)
Altre taglie: litri 5 - 10



DU PONT CONID SPA

DANCEL 50

SOSPENSIONE CONCENTRATA - Fungicida a largo spettro d'azione contro le malattie fungine in frutticoltura (melo, pero, pesco), orticoltura (sedano, patata, pomodoro, fagioli, piselli, cetrioli, melone, cocomero, cipolla), piante ornamentali e floricole (rosa, garofano, crisantemo, geranio, iris, zinnia) in pieno campo.

DANCEL 50

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Clorotaloni puro g 50 (= 625 g/l)

Coadiuvanti e inerti quanto basta a 100 grammi

Contiene GLICOL ELENICO

FRASI DI RISCHIO

Tossico per ingestione e contatto con la pelle. Possibilita' di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande - Togliersi di doso immediatamente gli indumenti contaminati - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT CONID SPA - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT DE NEMOURS (FRANCE) S.A. - Stabilimento di Cernay (Francia)

Registrazione N. 6732 del 04.06.1986 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.: vedere a ...

CLASSE I



TOSSICO

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare la confezione ben chiusa. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. - Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura,

deposito mangimi. - Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. - Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. - Non utilizzare il prodotto in prossimita' di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacita' corneale. Sensibilizzante. Puo' provocare danni renali ed atassia. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antivenefeni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

DANCEL 50 e' un fungicida a largo spettro d'azione che consente di prevenire e combattere diverse malattie delle piante coltivate come Peronospora, Muffa grigia, Tichotolatura, Cercospora, Ruggine, Marciume bruno, Alternaria, Septoriosi, Cladosporiosi, Botte, Vaioletture, Antracnosi, Marciume dei frutti, Fusariosi, Moniliosi, Cancro dei rami delle drupacee, Fibrottoniosi. E' dotato di azione residua e resistente al dilavamento, assicurando la protezione delle colture anche in condizioni difficili.

Dozi - Epochen - Modalita' d'impiego

Melo e pero: 1-1,8 litri/ha. Contro Tichotolatura e Alternaria del pero intervenire sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, al massimo 4 volte per stagione.

Pesce: 1,5-1,8 litri/ha. Contro Botrytis, Sclerotinia, Rhizopus, Gloeosporium, Penicillium intervenire sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, al massimo 4 volte per stagione.

Sedano: 1,8-2,4 litri/ha. Contro Septoria, Cercospora, Alternaria, Sclerotinia intervenire prima della comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento altre 2 volte in caso di necessita'.

Patata: 1,5-2,4 litri/ha. Contro Peronospora e Alternaria intervenire effettuando il trattamento prima della comparsa dei sintomi e ripetendolo in caso di necessita'.

Pomodoro: 1,8-2,4 litri/ha. Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi e Septoria intervenire effettuando 3 trattamenti a intervalli regolari nel corso della stagione iniziando prima della comparsa dei sintomi della malattia. Per i trattamenti in serra contro le stesse malattie sono consigliati 5 trattamenti.

Fagioli e piselli: 1,8-1,9 litri/ha. Contro Antracnosi, Septoria, Botte intervenire prima della comparsa dei sintomi. Ripetere il trattamento in caso di necessita'.

Cucurbitacee (pepelli, melone, cocomero): 1,8-2,4 litri/ha. Contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi effettuare 3 trattamenti sia in serra sia in pieno campo ad intervalli regolari iniziando prima della comparsa dei sintomi.

Cipolla: 1,8-2,4 litri/ha. Contro Peronospora e Botte intervenire tempestivamente prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessita'.

Piante ornamentali e floricole in pieno campo (rosa, garofano, crisantemo, geranio, iris, zinnia): 125-200 ml/ml. Contro Peronospora, Septoria, Ruggini, Alternaria, Antracnosi,

Cladosporiosi e Tichotolatura intervenire prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessita'. Si consiglia di effettuare saggi preliminari di sensibilita' venetale prima di trattare tutta la superficie, soprattutto nel caso di colture in serra. Sulle piante di difficile bagnabilita' e' consigliabile l'aggiunta di ml 30 per 100 litri d'acqua di BAGNANTE AMONN alla poltiglia.

Avvertenze: Osservare, dopo il trattamento i seguenti tempi di rientro: in campo 12 ore, in serra 24 ore.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura. Agitare energicamente la confezione prima dell'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordeaux, potassio).

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto puo' provocare fenomeni di rugginosita' su alcune varietà di melo Golden Delicious e su altre a buccia rossa. Su alcune colture da fiore puo' delicate e' consigliabile eseguire saggi preliminari prima di trattare l'intera coltura.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta su colture orticole e patata, 21 giorni prima della raccolta su pomacee e su drupacee.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi essenziali - ogni altro uso e' vietato.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non vendersi alveo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Altre taglie autorizzate: litri 5 - 10

SANORTO

SOSPENSIONE CONCENTRATA - Fungicida cupro-organico per la lotta a varie crittogame delle colture orticole e industriali.

SANORTO

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Clorotalonil puro g 20 (= 276 g/l)
Rame metallo (da ossicloruro tetramico) g 20 (= 276 g/l)
Coformulanti e solventi quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione e contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. - Non respirare il nebulizzato. - Non difarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT CONID SPA - Bolzano, Via Fieve 2


OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT DE NEMOURS (FRANCE) S.A. - Stabilimento di Cernay (Francia)

Registrazione N. 6733 del 04.06.1986 del Ministero della Sanità

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: litri 1

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.: vedere a ...



NORME PRECAUZIONALI

- Conservare la confezione ben chiusa. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. - Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdure, deposito mangimi. - Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. - Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. - Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Treatati di associazione delle seguenti sostanze attive: CLOROTALONIL 20% e RAME METALLO 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOROTALONIL

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici. Terapia: sintomatica.

RAME METALLO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antifolanti.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche

Il SANORTO è un fungicida composto da due principi attivi che assieme combattono con efficacia le sottoindicate crittogame delle colture orticole. Esso è indicato per la lotta preventiva ed è dotato di lunga persistenza.

Dosi - Epochen - Modalità d'impiego

Impiegare il prodotto per combattere la Peronospora, Alternaria, Septoria, Ruggine, Antracnosi, Ascochita, Ramulariosi e Cladosporiosi delle colture orticole alle dosi indicate:

Fagiolo e pisello: 2-2,5 l/ha per un massimo di 2 trattamenti.

Sedano: 3 l/ha per un massimo di 3 trattamenti.

Cetriolo, melone, cocomero: 2,5-3 l/ha per un massimo di 3 trattamenti.

Patata: 2,5-3 l/ha per un massimo di 2 trattamenti.

Pomodoro: 2,5-3 l/ha per un massimo di 3 trattamenti in campo e 5 trattamenti in terra.

Cipolla: 2,5-3 l/ha per un massimo di 2 trattamenti.

Avvertenze: Osservare, dopo il trattamento i seguenti tempi di rientro: in campo 12-ore, in terra 24 ore.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire il prodotto nel totale quantitativo d'acqua, rimescolando con cura. Agitare energicamente la confezione prima dell'uso.

Altre taglie autorizzate: litri 5 - 10 - 20



DU PONT CONID SPA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordeaux, polisolfuri). Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

INEX®

Diserbante liquido per il controllo di infestanti annuali graminacee e dicotiledoni.

INEX®

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
 Linuron puro g 9 (= 87,7 g/l)
 Pendimetalin puro g 16 (= 156 g/l)
 Coformulanti (emulsionanti e solventi) quanto basta a g 100
 Contiene CICLOESANOLO e XILENE

FRASI DI RISCHIO

Irritante le pelle. Infiammabile.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini.- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.- In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.- Non respirare i vapori.- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.- In caso di incendio usare estintori schiumogeni, polvere chimica, anidride carbonica, acqua nebulizzata.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT CONID S.p.A. - Via Piave 2 - BOLZANO (BZ)


OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT CONID SPA - Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione n. 4820 del 3/6/1982 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1

PARTITA N.: vedere a ...

CLASSE III



IRRITANTE

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare di respirarne i vapori, il nebulizzato e le polveri.- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.- Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco.- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

INEX® è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinefi infestanti annuali sia graminacei che dicotiledoni. Le infestanti sono anche controllate in fase di piante a condizione che le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1 - 1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2 - 3 foglie vere.

Graminacee: Alopecurus, Apera, Digitaris, Echinochloa, Poa, Setaria;
Dicotiledoni: Amarantus, Anagallis, Antirrhinum, Capsella, Cerasium, Chenopodium, Parnassia, Galinsoga, Lamium, Matricaria, Mercurialis, Myosotis, Papaver, Polygonum, Portulaca, Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Solanum, Stelleria, Thlaspi, Veronica, Viola.

Beet - Epopeche - Modalità d'impiego

INEX® è idoneo per il diserbo selettivo delle seguenti colture:

Carota	- 2 5 - 6/ha pre-emergenza
Citrusole	- 2 5 - 6/ha pre-emergenza
Grano e Orzo	- 2 4,5 - 5,5/ha pre-emergenza
Mais	- 2 5 - 5,5/ha pre-emergenza
Patata	- 2 5 - 5/ha pre-emergenza
Sola	- 2 4 - 5/ha pre-emergenza

Su terreni pesanti ed argillosi oppure notoriamente soggetti a forti infestazioni di graminacee è consigliabile adottare le dosi più alte.

Avvertenze: Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

Preparazione della miscela e istruzioni per l'uso

Al fine di permettere a INEX® di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività è consigliabile attenersi alle seguenti modalità operative:

• effettuare una buona preparazione del letto di semina in modo da operare su terreno perfettamente livellato e privo di zolle tale da formare una massa uniforme e compatta; • effettuare la semina in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno 2 cm per carote e di almeno 4 cm per grano e orzo, avendo altresì cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra; • riempire in poca acqua la necessaria dose di prodotto e poi, continuando ad agitare la miscela, aggiungere il quantitativo d'acqua sufficiente ad ottenere una completa bagnatura del terreno senza lacune e senza sovrapposizioni; • provvedere alla distribuzione senza inasprimenti; • dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua e sapone attrezzature, utensili e recipienti adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

Altra officina autorizzata:

CYANAMID ITALIA SPA - Catania, Zona Industriale

Altre taglie autorizzate: litri 5 - 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattati di associazione delle seguenti sostanze attive LINURON 9% e PENDIMETALIN 16% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

LINURON

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitro ed ematuria. Terapia: sintomatica.

PENDIMETALIN

Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, diapnea, diuresi, convulsioni. Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni

AVVERTENZE : • al trattamento erbicida alla semina di colture successive devono trascorrere almeno 6 mesi; • in caso di forzate risemie su terreni già trattati evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante rimanendo alle profondità suggerite senza riuverire il terreno oppure effettuando un'aratura profonda almeno 20 cm.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non si consigliano miscele di INEX® con altri prodotti.

Avvertenze: In caso di miscela con altri erbicidi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto svolge un'azione a carico dei semi e germinefi localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, ai fini della selettività verso le colture suggerite, è indispensabile attenersi alle consigliate modalità e profondità di semina. In caso di semine superficiali ed irregolari la selettività può essere ridotta specialmente se forti piogge sopravvengono dopo il trattamento. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Tra il trattamento e la raccolta devono intercorrere almeno 60 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è proibito.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SPURD

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

• Marchio depositato AMERICAN CYANAMID Co., Wayne, N.J. (U.S.A.)

INEX[®] M

Liquido emulsionabile - Diserbante a vasto spettro per il maie e per alcune colture erbacee.

INEX[®] M

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
 Linuron puro g 8 (= 80 g/l)
 Pendimetalin puro g 25 (= 250 g/l)
 Coformulanti quanto basta a g 100
 Contiene CICLOESANONE e XILENE

FRASI DI RISCHIO

Inflammabile.- Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.- In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.- In caso di incendio usare estintori schiumogeni, polvere chimica, anidride carbonica, acqua nebulizzata.- Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.


TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT CONID S.p.A. - Via Piave 2 - BOLZANO (BZ)
 OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT CONID SPA - Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione n. 7744 del 27/4/1989 del Ministero della Sanità'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1

PARTITA N.: vedere a ...

CLASSE III



IRRITANTE

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici.- Conservare la confezione ben chiusa.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corai d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare di respirarne i vapori, il nebulizzato e le polveri.- Evitare il contatto con gli indumenti.- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.- Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco.- Non impiegare il prodotto in prossimità di corai d'acqua.- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

MODALITA' D'IMPiego

Caratteristiche
 INEX[®] M è un diserbante selettivo che consente un efficace controllo di numerose infestanti graminacee e dicotiledoni. Si impiega in pre-emergenza mediante una distribuzione omogenea sul terreno senza incorporamento. INEX[®] M blocca lo sviluppo dei gemmini.
Sono sensibili a INEX[®] M:
 monocotiledoni: Alopecurus, Apera, Digitaria, Echinochloa, Lolium, Panicum, Poa, Setaria, Sorghum halepense da seme;
 dicotiledoni: Amaranthus, Aragallo, Arthemia, Capsella, Chenopodium, Chrysanthemum, Fumaria, Matricaria, Papaver, Polygonum, Portulaca, Ranunculus, Raphanus, Rapistrum, Rumex da seme, Stellaria, Solanum, Sonchus, Veronica, Viola.
Da cui - Specie - Modaltà d'impiego

INEX[®] M è idoneo per il diserbo selettivo delle seguenti colture:

Mais	pre-emergenza 4 - 5/ha
Grano e orzo	pre-emergenza 4 - 5/ha
Sola	pre-emergenza 4/ha
Citrullato	pre-emergenza 4 - 5/ha
Pastura	pre-emergenza 4 - 5/ha
Fagioli, Carote	pre-emergenza 4 - 5/ha

Su terreni poveri ed erigati oppure notoriamente soggetti a forti infestazioni di graminacee è consigliabile adottare le dosi più alte.
Avvertenza: il prodotto non deve essere impiegato su terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

Al fine di permettere a INEX[®] M di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività è consigliabile attenersi alle seguenti modalità operative:
 • effettuare una buona preparazione del letto di semina in modo da operare su terreno perfettamente livellato e privo di zolle tale da formare una massa uniforme e compatta; e effettuare la semina in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno 3 cm per eretta e di almeno 1 cm per grano e orzo, avendo altresì cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra; e stemperare in poca acqua la necessaria dose di prodotto e poi, continuando ad agitare la miscela, aggiungere il quantitativo d'acqua, 500-600 litri per ettaro, sufficiente ad assicurare una completa bagnatura del terreno senza lacune e senza sovrapposizioni; e provvedere alla distribuzione esatta mediante; e dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua e sapone attrezzature, utensili e recipienti adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Treatati di associazione delle seguenti sostanze attive: LINURON 8% e PENDIMETALIN 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

LINURON

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitolo ed ematuria. Terapia: sintomatica.

PENDIMETALIN

Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, diapnea, diuresi, convulsioni. Terapia: sintomatica.
 Consultare un Centro Antiveneni

AVVERTENZE : • Dal trattamento erbicida alla semina di colture suscettive devono trascorrere almeno 6 mesi; e in caso di forte diserbante su terreni già trattati evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante rimanendo alle profondità suggerite senza rinnovare il terreno oppure attuando un'erose profonda almeno 20 cm.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non si consigliano miscele con altri prodotti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri erbicidi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto svolge un'azione a carico dei semi e gemmini localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, al fine della selettività verso le colture suggerite, è indispensabile attenersi alle consigliate modalità e profondità di semina. In caso di semina superficiali ed irregolari la selettività può essere ridotta specialmente se forti piogge sopravvengono dopo il trattamento. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: De impiegare esclusivamente in agricoltura nelle specie e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
 Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere deposto nell'ambiente.

® Marchio depositato AMERICAN CYANAMID Co., Wayne, N.J. (U.S.A.)

Altre taglie autorizzate: litri 5 - 10 - 20



DU PONT CONID SPA

LOROX 50 DF

Granuli idrodispersibili - Diserbante selettivo per le colture di frumento, orzo, segale, mais, patata, carota, sedano, finocchio, rapa, fagiolo e fagiolino.

LOROX 50 DF

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Linuron puro g 80

Coformulanti quanto basta a g 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Usare guanti adatti. - In caso di incidenti o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT CONID S.p.A. - Via Pieve 2 - BOLZANO (BZ)


OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT DE NEMOURS (FRANCE) S.A. - Stabilimento di Cernay (Francia)

Registrazione n. 5675 del 28/12/1983 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RUTILIZZATO

PARTITA N.: vedere a ...



NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. - Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura,

deposito mangimi. - Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. - Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. - Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dell'urea.

Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

Il LOROX 50 DF è un diserbante selettivo per la distruzione delle specie erbacee annuali infestanti le colture di frumento, orzo, segale, mais, soia, girasole, patata, carota, sedano, finocchio, rapa, fagiolo e fagiolino ed applica la sua azione sia per via fogliare che per via radicale. Le infestanti controllate sono: *Amaranthus retrofractus*, *Anagallis*, *Capella bursa-pastoris*, *Chenopodium* spp., *Gallinago pavlovii*, *Digitalis sanguinalis*, *Echinochloa crus-galli*, *Euphorbia* spp., *Matricaria chamomilla*, *Mercurialis annua*, *Papaver*, *Plantago major*, *Polygonum convolvulus* e persicaria, *Portulaca oleracea*, *Ranunculus*, *Senecio*, *Setaria* spp., *Stirapia arvensis*, *Solanum nigrum*, *Stachys media*, *Veronica* spp.

Il LOROX 50 DF non controlla le erbe perenni con apparato radicale bulboso, profondo e rizomatoso come *Cynodon dactylon*, *Cirsium arvense*, *Convolvulus arvensis*, *Equisetum arvense*, *Scirpus maritimus*, *Sorghum halapense*, *Taraxacum officinale*.

La persistenza del LOROX 50 DF è relativamente breve (2-3 mesi) alle normali dosi d'impiego e non vi sono pertanto pericoli di effetti residui per le colture che seguono la rotazione.

Modalità d'impiego

Dosi per ettaro da distribuire in 400-600 litri d'acqua.

Frumento, orzo, segale: applicare solo in pre-emergenza, durante o subito dopo la semina (2-3 giorni) alla dose di 0,8 - 1 kg/ha.

Mais: applicare solo in pre-emergenza, durante o subito dopo la semina (2-3 giorni) alla dose di 0,75 - 0,9 kg/ha in terreni argillosi e con elevato contenuto di sostanza organica. Usare 0,8 - 0,75 kg/ha nei terreni di medio impasto. In ogni caso impiegare in miscela con altri principi attivi per completare lo spettro d'azione. Non usare il LINURON 50 AMONN su terreni sabbiosi o sabbioso limosi.

Seminare il mais a profondità non inferiore a 5 cm e provvedere che sia ben ricoperto.

Soia: trattare in pre-semine o in pre-emergenza, alla dose di 0,8-1 kg/ha, a seconda del tipo di terreno che deve essere ben preparato e livellato e privo di zolle. Impiegare almeno 700-800 litri di acqua per ettaro. Ove particolari situazioni di infestazione richiedessero l'opportunità di miscela con altri diserbanti selettivi, ricorrere alle dosi inferiori.

Girasole: trattare in pre-semine e pre-emergenza alla dose di 0,8-1,2 kg/ha, a seconda del tipo di terreno che deve essere ben preparato e livellato e privo di zolle. Impiegare almeno 800-1000 litri di acqua per ettaro. Ove particolari situazioni di infestazione richiedessero l'opportunità di miscela con altri diserbanti selettivi, ricorrere alle dosi inferiori.

Patata: intervenire in pre-emergenza tra la semina e l'emergenza impiegando il prodotto in miscela con altri principi attivi alla dose di 1,5 kg/ha. In terreni pesanti aumentare la dose a 2 kg/ha.

Carote: in pre-emergenza della coltura e prima della germinazione dei semi che devono essere ben esposti dal terreno, applicare, secondo il tipo di terreno, la dose di 0,75 - 1,5 kg/ha. In post-emergenza intervenire quando le carote hanno differenziato il secondo paio foglie (4 foglie vere) con 1,2 - 1,5 kg/ha.

Altre officine:

DU PONT CONID S.p.A. - Stabilimento di Bolzano, via Pieve 2

(solo confezionamento)

Altre taglie: kg 5 - 10



DU PONT CONID SPA

Sedano: in pre-emergenza per terreni di medio impasto, subito dopo la semina alla dose di 1,5-2 kg/ha, oppure in post-trapianto dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto alla dose di 1 - 1,5 kg/ha.

Finocchio: in pre-emergenza per terreni di medio impasto, subito dopo la semina oppure in post-emergenza dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto alla dose di 0,8 - 0,9 kg/ha.

Rapa: a partire da 8 - 10 giorni dal trapianto in pieno campo impiegare la dose di 1 - 2 kg/ha.

Fagiolo, fagiolino: in pre-emergenza o subito dopo la semina della coltura impiegare secondo il tipo di terreno la dose di 0,8 - 1,2 kg/ha.

AVVERTENZE

• Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. • Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1% e in quelli ricchi di scheletro. • Eseguire il diserbo in giornate poco ventose. • Preparare accuratamente il letto di semina. • Seminare uniformemente e il più profondo possibile in relazione alla specie coltivata. • Negli impieghi di pre-emergenza non irrorare su terreno secco nello strato superficiale. • E' necessario che i serbatoi delle irroratrici siano muniti di agitatore affinché, durante l'esecuzione del trattamento, la poltiglia sia costantemente agitata per evitare sedimentazione di prodotto nel serbatoio della irroratrice. • Lavare accuratamente l'apparecchiatura usata per la distribuzione prima di destinarla ad altri usi. • Evitare di contaminare i generi alimentari e di tenere il prodotto in vicinanza di insetticidi, anticrittogamici, concimi e sementi. • Conservare in luogo asciutto.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare il prodotto in poca acqua aggiungendo poi la quantità d'acqua necessaria al trattamento, agitando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il LOROX 50 DF non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e concimi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nella specie e per gli usi indicati - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SPURGO

LOROX* L

Pasta fluida - Diserbante selettivo per le colture di mais, soia, girasole, patata e carota.

COMPOSIZIONE

	p/p	g/litro
Linuroa puro	40,76	407,6
Coformulanti quanto basta a 100 grammi		

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare la confezione ben chiusa.- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito di mangimi.- Non utilizzare involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco.- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato, deve avvenire secondo le norme vigenti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dell'urea. **Sintomi:** Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitaneamente ed ematuria. **Terapie:** sintomatiche.

CARATTERISTICHE

Il LOROX* L è un diserbante selettivo per il controllo delle specie erbacee annuali infestanti le colture di mais, soia, girasole, patata e carota ed esplica la sua azione sia per via fogliare che per via radicale.

Le infestanti controllate sono: *Amaranthus retroflexus*, *Anagallis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Chenopodium* spp., *Galinsoga parviflora*, *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa crus-galli*, *Euphorbia* spp., *Matricaria chamomilla*, *Mercurialis annua*, *Papaver*, *Plantago major*, *Polygonum convolvulus* e *persicaria*, *Portulaca oleracea*, *Ranunculus*, *Senecio*, *Setaria* spp., *Sinapis arvensis*, *Solanum nigrum*, *Stellaria media*, *Veronica* spp.

Il LOROX* L non controlla le erbe perennanti con apparato radicale bulboso, profondo e rizomatoso come *Cynodon dactylon*, *Cirsium arvense*, *Convolvulus arvensis*, *Equisetum arvense*, *Scirpus maritimus*, *Sorghum halepense*, *Taraxacum officinale*.

La persistenza del LOROX* L è relativamente breve (2-3 mesi) alle normali dosi d'impiego e non vi sono pertanto pericoli di effetti residui per le colture che seguono la rotazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

Dosi per ettaro da distribuire in 400-600 litri d'acqua.

Maie: applicare solo in pre-emergenza, durante o subito dopo la semina (2-3 giorni) alla dose di 0,9-1,1 l/ha in terreni argillosi e con elevato contenuto di sostanza organica. Usare 0,75-0,9 l/ha nei terreni di medio impasto. In ogni caso in miscela con altri principi attivi per completare lo spettro di azione. Non usare il LOROX* L su terreni sabbiosi o sabbioso limosi.

Soie: trattare in pre-semine o in pre-emergenza alla dose di 0,75-1,2 l/ha, a seconda del tipo di terreno che deve essere ben preparato e livellato e privo di zolle. Impiegare almeno 700-800 litri di acqua per ettaro. Ove particolari situazioni di infestazione richiedessero l'opportunità di miscela con altri diserbanti selettivi, ricorrere alla dose inferiore.

Girasole: trattare in pre-semine o in pre-emergenza alla dose di 1-1,4 l/ha, a seconda del tipo di terreno che deve essere ben preparato e livellato e privo di zolle. Impiegare almeno 600-1000 litri di acqua per ettaro. Ove particolari situazioni di infestazione richiedessero l'opportunità di miscela con altri diserbanti selettivi, ricorrere alla dose inferiore.

Patate: intervenire in pre-emergenza fra la semina e l'emergenza impiegando il prodotto in miscela con altri principi attivi alla dose di 1,8 l/ha. In terreni

CLASSE III ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

pesanti aumentare la dose a 2,4 l/ha.

Carote: in pre-emergenza della coltura e prima della germinazione dei semi che devono essere ben coperti dal terreno, applicare, secondo il tipo di terreno, la dose di 0,9-1,8 l/ha. In post-emergenza, quando le carote hanno differenziato il secondo palco fogliare (4 foglie vere) 1,5-1,8 l/ha.

AVVERTENZE: Non impiegare in prossimità di corsi d'acqua. - Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1% e in quelli ricchi di scheletro. - Eseguire il diserbo in giornate poco ventilate. - Preparare accuratamente il letto di semina. - Seminare uniformemente e il più profondo possibile in relazione alla specie coltivata. - Negli impieghi di pre-emergenza non irrorare su terreno secco nello stato superficiale. - E' necessario che i serbatoi delle irroratrici siano muniti di agitatore affinché durante l'esecuzione del trattamento la poltiglia sia costantemente agitata per evitare sedimentazioni di prodotto nel serbatoio della irroratrice. - Lavare accuratamente l'apparecchiatura usata per la distribuzione prima di destinarla ad altri usi. - Evitare di contaminare i generi alimentari e di tenere il prodotto in vicinanza di insetticidi, anticrittogamici, concimi e sementi.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare il prodotto in poca acqua aggiungendo poi la quantità d'acqua necessaria al trattamento, agitando bene. Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito di mangimi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il LOROX* L non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e concimi. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

DU PONT CONID S.P.A. - BOLZANO, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE

E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.) - La Porte - Houston - Texas (U.S.A.)

Registrazione N. 2040 dell' 11.11.1975 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto litri 1

Il contenitore completamente frustato non deve essere disperso nell'ambiente.

Altra officina:

DU PONT DE NEMOURS (France) S.A. - Stabilimento di Cernay (Francia)

Altre taglie: litri 5 - 10

TRINET® L

Liquido emulsionabile - Diserbante selettivo di pre-emergenza per colture di cereali a semina invernale.

TRINET® L

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
 Linuron puro g 9 (= 94,5 g/l)
 Trifluralin puro g 19 (= 200 g/l)
 Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a g 100
 Contiene XILENE e solventi irritanti

FRASI DI RISCHIO

Inflammabile. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori. Non distarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incendio usare estintori schiumogeni, polvere chimica, anidride carbonica, acqua nebulizzata. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT CONID S.p.A. - Via Piave 2 - BOLZANO (BZ)

OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT CONID SPA - Bolzano, Via Siemens 12


Registrazione n. 4906 del 7/9/1982 del Ministero della Sanità

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: litri 0,5

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.: vedere a ...

CLASSE II



NOCIVO

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare di respirare i vapori, il nebulizzato e le polveri. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e

dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: LINURON 9% e TRIFLURALIN 19%.

Il LINURON, separatamente, provoca i seguenti sintomi di intossicazione: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveletali

MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche

TRINET® L è un erbicida specifico per il diserbo del frumento in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. TRINET® L garantisce una rapida distruzione delle infestanti graminacee e dicotiledoni quali Alopecurus, Apera spica-venti, Bromus, Lolium, Poa, Echinochloa, Amaranthus, Atriplex, Anagallis, Matricaria chamomilla, Cerastium, Capsella, Chenopodium, Fumaria, Papaver, Polygonum, Portulaca, Raphanus, Sinapis, Sonchus, Spargula, Stellaria, Veronica, Galium, Lamium, mantenendo una perfetta selettività.

TRINET® L non controlla Avena spp., Agropyron repens, Cirsium spp.

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego

Frumento autunnale duro e tenero, orzo e segale a semina invernale: dose media litri 3-4 per ettaro distribuiti con almeno 500 litri d'acqua per ettaro. Il trattamento con TRINET® L va effettuato dopo la semina del frumento, prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti. L'efficacia erbicida è migliore su terreno ben lavorato, privo di zolle, con elevato grado di umidità del suolo al momento del trattamento e dopo la sua esecuzione. Avvertenza: il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

ISTRUZIONI SPECIALI

Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del trifluralin in miscela con linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalate, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio o da orto) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere

applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde efficacia.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

TRINET® L non deve essere miscelato con altri prodotti.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Avvertenze

• Conservare il prodotto in locali a temperatura superiore a 5°C.

• Non conservare presso sorgenti di calore o fuoco.

• Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per l'impiego del prodotto.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non vendersi sfuse

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Altre taglie autorizzate: litri 1 - 5



DU PONT CONID SPA

Ditta: ENICHEM AGRICOLTURA

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:

TRILURON

CARATTERISTICHE

Il TRILURON è un diserbante selettivo del frangente d'oro e tenero, dell'orzo e delle spighe, costituito da due principi attivi, il trifluralina ed il linuron; applicato prima dell'emersione, impedisce la nascita delle infestanti. Il trifluralina svolge la sua attività impedendo i processi enzimatici che precedono alla germinazione dei semi. Il linuron interviene nell'attività fotosintetica e blocca i processi di divisione cellulare. Il TRILURON è efficace contro infestanti graminee ed a foglia larga come: Lolium spp. (da seme), Setaria spp., Apera spica-veali, Poa annua, Alopecurus spp., Echinochloa crusgali, Polypogon monspeliensis, Paspalum paspalodes, Setaria verticillata, Veronica spp., Capsella bursa-pastoris, Cirsium vulgare spp., Amaranthus spp., Papaver spp., Sonchus asper, Matricaria spp.

DOSE E MODALITA' D'IMPIEGO

Frangente - Orzo - Segale: Il trattamento con TRILURON va effettuato su terreni accuratamente preparati in modo che si presentino ben livellati e senza zolle e deve essere assicurata una perfetta copertura del seme. Dov'è possibile, è consigliabile praticare la rullatura dopo la semina e prima del trattamento.

Il TRILURON deve essere impiegato alla dose di 2,5-3,7 litri/ha in 400-600 litri di acqua per ettaro. La dose più alta è consigliata quando il registratore temporale e livello d'innaffiatura elevati o quando si prevedono forti infestazioni di gramacee. La miscela diserbante deve essere preparata al momento stesso dell'utilizzazione al fine di evitare la degradazione del prodotto. Non impiegare il TRILURON su colture con semi, anche interrati, su terreni sabbiosi e su quelli dove si possono formare ristagni di acqua, al fine di evitare l'assoggerimento di fitofossidati. Si consiglia inoltre, come per tutti i diserbanti applicati in pre-emergenza - di trattare su terreni ricchi di sostanza organica che, per le loro caratteristiche chimico-coloidali, riducono l'efficacia erbicida.

ISTRUZIONI SPECIALI

Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 anni fra l'applicazione del TRILURON e la semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole gramacee foraggere, pomodoro, crasi spicata e trifoglio, melone, cucurbitacee, estratto e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cereali, spinacio. Non scolare bestioli (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. La miscela non deve essere incorporata nel terreno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AERII

Associazioni

Il TRILURON è compatibile con la generalità dei diserbanti

Avvertenze

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante

Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, questi dotati di franta e ventola, depurato maggesi.

Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

Il formulato non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all' 1%.

Precauzioni: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta

Allergizante: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle colture e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SINGOLI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Suddelegati di produzione autorizzati: INVALLEN ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI)

BARBI MURRIE COMPANY S.p.A. Tregno (BG)

CHIEFFI S.p.A. S. Arcangelo (FE)

SARPI S.p.A. Ferrara (RA)

SAVA S.p.A. S. Vincenzo di Gallura (CO)

Ughe autorizzate: 1 - 9 - 20 (MI)

TRILURON

DISERBANTE SELETTIVO PER CEREALI

COMPOSIZIONE

TRILURON puro 9,20 (= 241,99)

LINURON puro 11,04 (= 118,64)

Solventi, emulsionanti q.b. a g 100

(Contiene etilene)

FRASI DI RICHIEDO:

Infiammabile

Pericolo per l'ambiente

Medico per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PREVIDENZA:

Conservare fuori della portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non respirare i vapori

Evitare contatto con gli occhi e con la pelle


Usare il prodotto per lo meno 14 giorni prima di usare il terreno o di mettere orticole immediatamente il medesimo (se possibile, recintare i contorni)

EtiChem Agricoltura

Via Reggese Settimo, 55 - PALERMO

Registrazione Ministero della Sanità n. 4119 del 25.7.1981

CLASSE II



MOCCO

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento

Non contaminare disseccatori e capi d'acqua

Dopo la manipolazione è in stato di contaminazione innanzi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Tossici di assorbizione delle seguenti sostanze attive:

TRIFLURALINA 23% e LINURON 11,04%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

TRIFLURALINA:

LINURON: è un derivato dell'urea. Sintomi: dolore l'impiego può causare congiuntivite, reattive mucche irritazione della gola e della cute.

L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito, diarrea. Sono chiari subito ed esauriti.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antidoti

Ditta: ICI SOLPLANT

Principio attivo:

CLOROTALONIL

LINURON

Presidio sanitario:

SCHERMO FL

LINURON SC
RACELIN




SCHERMO FL

Anticrittogamico in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

- Carboclorini puro g 20 (= 280 g/l)
- Fiamme puro g 20 (= 280 g/l)
- (sotto forma di Ossicloruro tetraminico)
- Coformulanti g. b. a g 100



CLASSE II

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7468 del 14.04.88

Non riutilizzare il contenitore
Parita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 lit

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Tattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cloridroniti 20%
 le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di Intossicazione:
 Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzabile. Può provocare danni renali ed epatici.
 Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello della mucosa, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
 Terapia: sintomatica.
 Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
 Non operare contro vento.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonatan, Rome Beauty, Merpenduit, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, Renetta del Canada, Rosa Marone) e di pero (Abate Fétel, Buona Luisa di Vercobona, Bufera Chiaruzzi, Passacrazziana, E.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Fairport di Ciappo, Kaiser, Bufera Grifari) cupresensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne consiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci
 Intervallo di sicurezza:
 melo e pero = 21 giorni
 patata, pomodoro, sedano, carciofo, melone, cipolla, fagiolo e fagiolo = 20 giorni
 Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
 Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Proteggere dal freddo.
 Agitare bene prima dell'uso

MODALITA' D'IMPIEGO

Lo SCHERMO FL è un fungicida di contatto e si usa preventivamente per il controllo di:
 anello, pero (trattamenti pre-fiorali in pieno campo, esclusivamente in miscela con fungicidi sistemici): 200 ml/ha contro la "scioltura" (per il melo solo i primi due interventi; per il pero solo il primo), utilizzando volumi d'acqua compresi tra 11 e 17,5 l/ha.
 Nel caso si usino oli minerali bianchi, distanziarli di almeno 20 giorni dai trattamenti effettuati con SCHERMO FL.

patata: 4-5 l/ha contro peronospora, alternaria, botrite e rizoctonia.
 ortaggi (pomodoro, sedano, carciofo, melone, cipolla, fagiolo e fagiolo): 3,6 - 4,3 l di prodotto formulato per ettaro contro le seguenti malattie:
 pomodoro = peronospora, antracnosi, cladosporiosi, septoriosi, rizoctonia e botrite.
 sedano = asporia, alternaria, cercospora, sclerotinia e rizoctonia.
 carciofo, melone = peronospora, antracnosi, alternaria e cladosporiosi.

sporcici.
 cipolla = peronospora, ruggine e botrite.
 fagiolo, fagiolo = antracnosi e ruggine.
 fioribolura (garciano, giacinto, citranterno e rose): 350 ml/ha contro alternaria, peronospora, septoria e scioltura.
 Impiegare i volumi d'acqua ritenuti più opportuni in relazione alla massa ed alla densità delle piante.

NUMERO MASSIMO DI APPLICAZIONI ANNUE

- melo e pero (pieno campo): 4
- sedano (pieno campo/terra): 3
- pomodoro (pieno campo) = 3; terra = 5
- carciofo e melone (pieno campo/terra): 3
- fagiolo e fagiolo (pieno campo): 2
- cipolla (pieno campo): 2
- patata (pieno campo): 2

AVVERTENZE

- evitare l'accesso ai terreni trattati prima che siano trascorse almeno 12 ore dall'applicazione in pieno campo e 24 ore dall'applicazione in terra.
- nella preparazione della miscela munirsi di guanti e fasciata filtrante
- preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangiatoie.
- lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
- non utilizzare SCHERMO FL in prossimità di corsi d'acqua

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

SCHERMO FL è compatibile con fungicidi sterolo-inibitori, con antibiotici dicarbossimici, con antiperonosporici sistemici, oltrociplici e translaminari, con benzimidazolici e con zolfo.
 Non è compatibile con prodotti a reazione alcalina e con oli minerali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

OFFICINE: ICI Solplant, S.p.A. (S. Vincenzo di Galliera - BO)
 TAFITE: n. 250, n. 1500, n. 1.125




LINURON SC

Erbicida selettivo per il diserbo di mais, carota, patata e ortaggi (sospensione concentrata)

COMPOSIZIONE

Linuron puro g 43 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b.s g 100



CLASSE II

irritante per la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crepellano (BO)

Stabilimento di produzione:

ICI Solplant S.p.A. - Crepellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 0541 dell'11.03.72

Non riutilizzare il contenitore

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta

1 lit

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dall'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rivite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono indicati sintomati ed ematologici.

Terapia: sintomatica.

Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

COMPATIBILITÀ

Nei casi in cui l'esperienza e le esigenze tecniche lo rendano necessario e salvo specifiche controindicazioni, LINURON SC si può impiegare in miscela con alcuni erbicidi, insetticidi, acaricidi, fungicidi, fitonutrienti e prodotti di difesa. Tuttavia, in considerazione del diverso comportamento dei prodotti ed in assenza di specifica esperienza, effettuare piccole prove di campo preliminari.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri fitofarmaci deve essere rispettato l'intervallo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Tollerante di un erbicida, impiegato solo per le colture specificate. Evitare che vengano colpite le colture inalterate o comunque sensibili; per lo stesso motivo programmare la sospensione lontano da piante coltivate o dalle zone della loro espansione radicale. Se il trattamento viene fatto solo sulle file di semina, controllare che l'erbicida non sia applicato in modo uniforme ed omogeneo su tutta la larghezza della fascia trattata, onde evitare particolari accumuli di prodotto.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Può essere nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

Sospensione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è proibito.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

NOTA BENE

Come buona pratica, appena utilizzato il trattamento, lavare accuratamente con acqua e ACQUA (alla dose di 5 ml ogni 10 litri d'acqua) attrezzature, contenitori e recipienti adoperati per la diluizione e la distribuzione del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

Proteggere dal frodo

Agitare bene prima dell'uso

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE

LINURON SC è un erbicida selettivo "a carica residua", indicato per il diserbo in pre-emergenza o in post-emergenza di colture industriali, quali il mais, le carote, le patate e piante colture orive.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

MAIS (da impiegare sempre in miscela con altri principi attivi):
Trattamenti in pre-emergenza: terreni di medio impasto II 1; terreni pesanti II 1,2.
Il mais deve essere seminato ad una profondità superiore a 4 cm onde evitare l'azione ad colture una buona azione erbicida in profondità senza che al verticillato danni alla coltura.

CAROTA:

Trattamenti in pre-emergenza: terreni scolti II 1,2-1,5; terreni di medio impasto o pesanti II 2.

Trattamenti in post-emergenza: terreni scolti II 1,5; terreni di medio impasto o pesanti II 2.

SEDANO:

Trattamenti in pre-emergenza: terreni scolti II 1,2-1,5; terreni di medio impasto o pesanti II 2.

Trattamenti in post-emergenza: terreni scolti II 1,2; terreni di medio impasto o pesanti II 2.

FINOCCHIO:

Trattamenti in pre-emergenza: terreni scolti II 1; terreni di medio impasto o pesanti II 1, esclusivamente in miscela con altri principi attivi.

Trattamenti in post-emergenza (facoltativamente in miscela con altri principi attivi): II 1, dopo la quarta foglia vera.

FAGIOLINO:

Trattamenti in pre-emergenza: terreni scolti II 0,8-1; terreni di medio impasto o pesanti II 1,2.

Trattamenti in post-emergenza: terreni scolti II 1; terreni di medio impasto o pesanti II 2.

Trattamenti in pre-emergenza: terreni scolti II 1,2; terreni di medio impasto o pesanti II 2.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Le applicazioni possono essere fatte su tutta la superficie oppure soltanto sulle file di semina; in quest'ultimo caso la dose d'impiego dev'essere calcolata in base all'effettiva superficie da trattare. Il trattamento del mais va eseguito contemporaneamente alla semina o subito dopo, usando una macchina in grado di distribuire con buona uniformità il prodotto, impiegando da 400 a 600 litri di soluzione per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei.

IMPORTANTE

È indispensabile osservare scrupolosamente le dosi di impiego, per cui occorre:

- accertarsi del perfetto funzionamento delle attrezzature;
- determinare esattamente la quantità di sospensione distribuita per unità di superficie, effettuando una prova preliminare con sola acqua;
- mantenere costante la velocità di esecuzione del trattamento.

PRECAUZIONI NELL'IMPIEGO

- non impiegare LINURON SC in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%;
- non impiegare LINURON SC in prossimità di corsi d'acqua;
- evitare, nei limiti del possibile, l'applicazione su terreni eccessivamente umidi;
- per l'applicazione usare attrezzature dotate di agitatore onde mantenere omogenea la sospensione;
- nella preparazione della miscela mantenga di guanti e facciale filtrante;
- proteggere la miscela dal prodotto con acqua in recipienti appositi, possibilmente alligato o in locali aerei dove non ci siano animali ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, depositi mangimi;
- non riutilizzare gli imbuti che hanno contenuto LINURON SC;
- lo smaltimento delle confezioni usate e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

UFFICINE: ICI Solplant, Chiesla (It 1)




RACELIN

Diserbante selettivo per la patata e il girasole (liquido emulsionabile)

COMPOSIZIONE

- Fluoridione puro 9 25,3 (= 300 g/l)
- Linuron puro 9 25,3 (= 300 g/l)
- Coformulanti q.b.a.g 100,0
(contiene o-tossano e N-metil-2-pirrolidone)



CLASSE II

**Inflammabile,
Nocivo per inalazione,
Irritante per gli occhi e la
pelle.**

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi a guanti stabi.
In caso di incendio o esplosione non respirare i fumi.
In caso di materiale consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità
n. 7680 del 02.02.89

**Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.**

1 lit

OFFICINE: ICI Solplant, Scaap, Sitta, Stauffer Chemical Belgium (Belgio), Serpiol

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dell'urea. Svincolti durante l'impiego può causare congiuntivite, irrita nonché irritazione della gola e della cute. L'impiego può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono indicati subito ed ematituri.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

PRECAUZIONI NELL'IMPIEGO

- non impiegare RACELIN in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.
- non impiegare RACELIN in prossimità di corsi d'acqua
- nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di idonee filtranti
- preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
- non utilizzare gli involucri che hanno contenuto RACELIN
- lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

COMPATIBILITA'

Si impiega da solo oppure in miscela con altri diserbanti. Si impieghi comunque la dose piena consigliata.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione completa.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di dubbio ed in presenza di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di eseguire prove parcellari preliminari.
PERIODO DI CARENZA: impiegare solo in pre-emergenza della coltura.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE

RACELIN è la combinazione di due principi attivi fluoridione e linuron, ad azione complementare tra loro, il che consente di ottenere risultati più completi per l'azione su monocotiledoni e dicotiledoni annuali con assenza di residui per le colture sensibili che seguono, in rotazione, girasole e patata.

Graminacee annuali: Avena spica verni, Poi annuo.
Dicotiledoni annuali: Amaranthus retrofractus, Anagallis arvensis, Capsella bursa pastoris, Chenopodium album, Fumaria officinalis, Galium aparine, Matricaria chamomilla, Polygortum aviculare, Polygonum convolvulus, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica hederifolia, Veronica peritosa, Atriplex patula, Mercurialis annua, Papaver spp.
Molteramente sensibili al RACELIN (usare le dosi più alte): Alopeurus myosuroides, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Viola arvensis. RACELIN ha azione persistente sufficiente ad evitare infestazioni tardive.

Scatoli di impiego: RACELIN si impiega per il diserbo della patata e girasole.
Epoca e modalità d'impiego: RACELIN si impiega esclusivamente in pre-emergenza delle colture secondo le seguenti modalità:
girasole: il trattamento deve essere eseguito dopo la semina o, al massimo, entro i due giorni successivi su terreno ben preparato, livellato e privo di zolle grossolane. Il seme deve essere ben coperto dal terreno.

patata: la distribuzione deve essere effettuata alcuni giorni dopo la semina in terreno con porche ben preparate ed ormai essiccate e, comunque, dieci giorni prima dell'emergenza.
Dopo l'applicazione del diserbante si consiglia di effettuare ulteriori lavorazioni del terreno o, quanto meno, vanno eseguite al più tardi possibili. RACELIN può essere applicato su tutte le varietà di patata, escluse quelle precoci.

ATTENZIONE: in caso di forti precipitazioni subito dopo il trattamento, è possibile il manifestarsi di leggere decolorazioni sulle foglie della coltura che però sono transitorie e di nessuna influenza sulla produzione.
Dosi di impiego: si impiega diluito in non meno di 200 litri d'acqua per ettaro, alle seguenti dosi:
patata: 2 l/ha
girasole: 1,5-2 l/ha

ATTENZIONE si consiglia di:
- diluire la dose occorrente di RACELIN in poca acqua in un secchio a parte e poi versarlo nell'acqua, tenuta in agitazione, contenuta nel serbatoio della pompa;
- utilizzare la peltiglia diserbante immediatamente dopo la sua preparazione. Al termine del trattamento non lasciare anche piccole quantità di soluzione nel serbatoio;

- lavare immediatamente ed accuratamente l'attrezzatura e tutti i suoi componenti per due volte con acqua addizionata ad un buon detersivo; successivamente risciacquare con abbondante acqua;
- non eseguire il trattamento in giornate eccessivamente calde e/o umide e con vento. Utilizzare antipompe a mezza e bassa pressione (1-2,5 atmosfere) con ugelli a ventaglio per ridurre fenomeni di deriva su colture sensibili quali barbabietole, crucifere, vigneti;
- si possono seminare crucifere non prima di dodici mesi dal trattamento e dopo una buona aratura;
- in caso di non riuscita della coltura trattata, si potrà seminare girasole, mais, patata, carota sedano dopo una aratura di almeno 20 cm.

Da non applicare con mezzi aerei

1992: 21 1, 1 5, 11 20

Ditta: I.P.I.CI.

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:

LINURON I.P.I.CI. LIQUIDO

LINURON I.Pi.Ci. LIQUIDO

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISECCO DEL MAIS, DELLE CAROTE, DELLE

PATATE E DEGLI ORTAGGI-LIQUIDO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA.


LINURON I.Pi.Ci. LIQUIDO

COMPOSIZIONE

- Linuron puro 9 35 (=385 g/l)
- Coadiuvanti q.b.a 9 166

C L A S S E III

Attenzione manipolare
con prudenza



I R R I T A N T E

Irritante per la pelle.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Conservare lontano da alimenti e mangimi e bevande.
In caso di malessere consultare un medico (se possibile
mostrargli l'etichetta).

I.Pi.Ci. S.p.A. via F.lli Beltrami, 11 - Novate Milanese (MI)
Officina di produzioni: DIACREN S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA' n° 6221 del 7.2.1995

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n° Contenuto netto

NOTE PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non contattare alimenti e bevande e corpi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

ALTRE AVVERTENZE: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corpi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il P.A. non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, secche irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito, diarrea. Se so citati subitaneamente ed ematuria.
Terapia: sintomatica

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleno.

MODALITA DI IMPIEGO: LINURON I.Pi.Ci. LIQUIDO e' un erbicida selettivo a carica residua indicata per il diserbo in pre-emergenza di colture industriali quali il mais le carote, le patate e alcune colture ortive.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO: LINURON I.Pi.Ci. LIQUIDO combatte i graminacei, erba secca, amaranto, digitaria, farinaccio, peralocasia, araba porcellana, canovilla, veronica, senape, mercuriale, galinboga, borsa del pastore, erba papavero, piantaggine, falso convolvolo, euforbia.

MAIS: trattare in pre-emergenza nei terreni leggeri e 1,2 l/ha in miscela con altri principi attivi; nei terreni torbosi o argillosi a 1,5 l/ha. Il mais deve essere seminato a profondità non inferiore ai 5 cm. e deve essere ben ricoperto.

CAROTA: trattare in pre-emergenza 1,5-2,5 l/ha.
SEDANO: in pre-emergenza 1,5-2,5 l/ha; in post-emergenza: 1,5 l/ha.
PINOCCHIO: in pre-emergenza 0,5-1,2 litri/ha
PATATE: trattare in pre-emergenza: 0,8-1,5 l/ha.
FRAGOLE: trattare in pre-emergenza: 1,5-2,5 l/ha; da usare sempre in miscela con altri erbicidi selettivi per la coltura.

Le dosi di impiego minori si riferiscono ai terreni leggeri, quelle più elevate ai terreni torbosi e argillosi. Impiegare quantitativi di acqua di 400-500 l/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AERZI

COMPATIBILITA': il prodotto può essere impiegato in miscela con altri erbicidi selettivi.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto può essere nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti negli altri usi e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPESO NELL'AMBIENTE.

DA NON VERDENSI SFUGO.

Taglie litri 1 - 5

Ditta: ISK BIOTECH

Principio attivo:

CLOROTALONIL


Presidio sanitario:

DACONIL 2787

DACONIL 2787

Anticrittogamico

Granuli idrodispersibili (WDG)

<p>DACONIL 2787</p> <p>Composizione: CLOROTALONIL puro g 75 Coloranti q.b. a g 100,00</p> <p>FRASI DI RISCHIO: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.</p> <p>CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).</p> <p>ISK BIOTECH S.r.l. Via Vincenzo Monti, 8 20123 MILANO</p> <p>Stabilimento produttore: UCB - Gent (Belgio)</p> <p>Registrazione N. 0368 del 22/11/1971 del Ministero della Sanità</p> <p>IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO</p> <p>**** kg Partita n° ...</p>	<p>II CLASSE</p>  <p>NOCIVO</p>
---	--

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

Avvertenze:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE: fungicida a largo spettro d'azione. **CAMPI D'IMPIEGO, MALATTIE COMBATTUTE, EPOCHE E DOSE D'IMPIEGO:**

MELO E PERO (solo in campo. Non superare le dosi di 1,3 kg/ha per trattamento e non eseguire più di 4 interventi all'anno).

- **Cancri ramosi (Nectria):** 150-200 g/ha in associazione a un fungicida benzimidazolico alla normale dose d'impiego. Eseguire almeno 2 trattamenti: il primo alla caduta delle foglie ed il secondo all'ingrossamento delle gemme.

- **Ticchiolatura ed Alternaria:** 50-80 g/ha in associazione e fungicidi stercolizzatori alla normale dose d'impiego. Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire a seconda del calendario d'incubazione delle malattie.

PESCO E SUSINO (solo in campo. Non superare le dosi di 1,3 kg/ha per trattamento e non eseguire più di 4 interventi all'anno). **Bolla, Corineo, Cancri ramosi e Monilia:** 130-150 g/ha in associazione ad un fungicida benzimidazolico alla normale dose d'impiego. Eseguire i trattamenti alle seguenti fasi fenologiche: caduta foglie, ingrossamento gemme, fioritura, frutti in accrescimento.

COLTURE ORTICOLE (impiegare a scopo preventivo, a seconda del calendario d'incubazione delle malattie):

- **Pomodoro e patata:** contro peronospora, alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi non vascolari, muffa grigia e bianca, septoria, rizotonia.

65-85 g/ha nei trattamenti in serra

Per pomodoro non eseguire più di 3 interventi all'anno per la coltura di pieno campo e di 5 per la coltura sotto serra. Per patata massimo di 2 trattamenti all'anno.

- **Cipolla** (in pieno campo): contro peronospora, muffa grigia e bianca, alternaria 200-230 g/ha con un massimo di 2 kg di prodotto/ha per trattamento e di due interventi all'anno (aggiungere adesivante).

- **Cocomero, melone, cetriolo:** contro alternaria, peronospora, antracnosi, valcoltura, cladosporiosi, rizotonia, fusariosi non vascolari. 150-200 g/ha (con un massimo di 2 kg di prodotto/ha per trattamento e di 3 interventi all'anno).

- **Sedano:** contro septoria, rizotonia, oospora e sclerotinia 200-270 g/ha (massimo di 2 kg di prodotto/ha e di 3 interventi all'anno).

- **Fagiolo e fagiolino** (in pieno campo): contro valcoltura, muffa grigia. 150-200 g/ha (massimo di 1,9 kg di prodotto/ha per trattamento e di 2 interventi all'anno).

COLTURE FLOREALI: contro ticchiolatura, botrytis, ruggine, antracnosi, septoriosi, fusariosi non vascolari, alternaria. 130-200 g/ha.

Tempo di rientro (per tutte le colture)

- in campo: 12 ore dopo ogni trattamento
- in serra: 24 ore dopo ogni trattamento

Preparazione e distribuzione della miscela: versare la quantità consigliata di prodotto nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà e mescolare bene durante il completamento del riempimento. Segnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e con oli minerali. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: per melo e pero attenersi scrupolosamente alle dosi consigliate; concentrazioni superiori possono provocare rugginosità sulle varietà Golden ed altre a buccia rossa. Sulle colture da fiore più delicate eseguire saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali.

Sospendere i trattamenti 21 GIORNI prima della raccolta per melo, pero, pesco e susino e 14 GIORNI prima della raccolta per le altre colture.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: 500 g - 1 Kg - 5 Kg

Ditta: P A C

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:

LINUREX

LINUREX

Erbicida selettivo in pasta fluida

LINUREX

Composizione :
LINURON puro gr. 35,6 (- 428 g/l)
coformulanti q.l.a. a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - evitare il contatto con gli occhi, e con la pelle.

PAC srl
via G.M. Scotti n. 8
BERGAMO


Stabilimento produttore :

SILIA spa Aprilia (L-T)

Registrazione n. 1080 del 13-12-72 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

litri 8 Parità n. :



IRRITANTE

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

AVVERTENZE: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante - preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, depositi mangimi - non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco - non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua - lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve

avvenire secondo le norme in vigore - il p.a. non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, irrite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitaneamente ed ematuria. Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE, APPLICAZIONI E DOSI

Il LINUREX è un erbicida in pasta fluida, che distribuito uniformemente sul terreno, agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in fase di germinazione e per assorbimento fogliare sulle infestanti nelle primissime fasi di sviluppo.

L'azione erbicida del LINUREX può persistere fino a 3 mesi dal trattamento in condizioni favorevoli di stagione e di terreno. Viene successivamente degradato nel suolo e non lascia quindi residui tossici per le colture successive.

Erbe combattute: condizioni pedo-climatiche normali (terreno di medio impasto, sufficientemente umido, ben lavorato e sminzato allo strato superficiale, in ambiente mediamente piovoso) il LINUREX combatte: Giavone, Sasaria, Amaraniti, Digitaria, Farinello, Pericaria, Erba Ponceletta, Camomilla, Veronica, Serapè, Merconella, Galinoglia, Coda di Volpe, Borsa pastore, Morella, Erba peperina, Pianteagone, Falco convolvolo, Euforbia.

Il LINUREX, alle dosi selettive per le colture, non combatte le erbe perenni ad apparato radicale bulboso, profondo e rizomatoso tipo: convolvolo, Sorghum halapense, gramigna, cipollino, cardo campestre, equisetolo, soffione.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

CAROTA: PRE-EMERGENZA: dalla semina fino a 2-3 giorni prima della nascita della coltura da kg 1,6 (liri 1,4) a kg 2,650 (liri 2,250) con dose inferiore nei terreni scolti.

POST-EMERGENZA: da quando la coltura ha 2-4 foglie e le infestazioni sono allo stato di piantule: kg 1,6 (liri 1,4) a kg 2,650 (liri 2,250)

SEDANO: PRE-EMERGENZA: dalla semina fino a 2-3 giorni prima della nascita della coltura kg 1,6 (liri 1,4) a kg 2,650 (liri 2,250) con dose inferiore nei terreni scolti.

POST-TRAPIANTO: dopo che la coltura ha superato la crisi del trapianto: kg 1,6 (liri 1,4) a kg 2,650 (liri 2,250) con dose inferiore nei terreni scolti.

FINOCCHIO: PRE-EMERGENZA: dalla semina fino a 2-3 giorni prima della nascita della coltura kg 0,500 (liri 0,430) a kg 1,300 (liri 1,100) con dose inferiore nei terreni scolti.

POST-TRAPIANTO: dopo che la coltura ha superato la crisi del trapianto: kg 0,500 (liri 0,430) a kg 1,300 (liri 1,100) con dose inferiore nei terreni scolti.

PATATA: impiego sempre in miscela con altri principi attivi e non oltre la dose di kg 2,600 (liri 2,250)

PRE-EMERGENZA: subito dopo il collocamento a dimora dei tuberi o successivamente, ma prima della nascita della patata: kg 1,550 (liri 1,350)

MAIS: in PRE-EMERGENZA della coltura e delle infestanti (mais 40/50 cm di altezza, infestanti cm. 15 di altezza) nei terreni di

medio impasto kg 1,300 (liri 1,125) per Ha in miscela con altri principi attivi, nei terreni torbosi e argillosi kg 1,550 (liri 1,350) per ettaro. Per evitare danni alla coltura di piante infestanti, soprattutto il getto dell'erogazione sulle piante infestanti, evitando di colpire le piante di mais, applicando alla barra irroratrice opportuni schermi protettivi. Per raggiungere questi stadi di sviluppo del mais e delle infestanti indicati per il trattamento, potrebbe presentarsi la necessità di distruggere, mediante un'epitatura o fresatura, le nascite precoci di infestanti. Tale tecnica favorirebbe contemporaneamente la nascita del mais.

SOMA: in PRE-EMERGENZA, da kg 1,050 (liri 0,900) a kg 1,575 (liri 1,350)

CARCIOFO: eseguire il trattamento prima della ripresa dei carciofi, alla dose di kg 1,800 (liri 1,550) per ettaro. Occorre che il trattamento venga effettuato su terreno lavorato, ben sminzato e ripulito da erbe, facendo seguire immediatamente dopo un'irrigazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Associazioni possibili con altri erbicidi

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di irrobustimento informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare superdosaggi e sovrapposizioni durante i trattamenti. Nei terreni trattati con LINUREX, si consiglia di non seminare altre colture (al di fuori di quelle per le quali è congegnato il trattamento) se non sono passati, a seconda delle dosi, da due a tre mesi dall'applicazione del prodotto.

Nei corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER LE COLTURE DI CARCIOFO, SEDANO, FINOCCHIO, CAROTA, PATATA, MAIS.

Avvertenze eseguire il diserbo in giornate poco ventilate - preparare accuratamente il letto di semina - seminare uniformemente e il più profondo possibile in relazione alla specie coltivata - negli impieghi di pre-emergenza non irrorare su terreno secco nello strato superficiale - irrorare unicamente colture adulte e ad investimento e sviluppo regolare - è necessario che i serbatoi delle irroratrici siano muniti di agitate affinché, durante l'esecuzione del trattamento, la poltiglia sia costantemente agitata per evitare sedimentazione di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice - evitare di effettuare trattamenti in terreni decisamente sabbiosi e in quelli ricchi di scheletro.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Ditta: PAVONI

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:

LINURON PAVONI

LINURON PAVONI

erbicida selettivo a carica residua
In pasta fluida


LINURON PAVONI

Composizione:
LINURON puro gr. 35,5 (= 410g/l)
coformulanti q. b. a 100

CLASSE III
Attenzione: manipolare
con prudenza

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.



IRRITANTE

PAVONI & C. S.p.a.

Corso Italia 207
CATANIA

Stabilimento produttore:
SCAM srl - Modena

Registrazione n. 6340 del 24-4-1985 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

It. 1 - 5 - 10

Partita n. :

Norme precauzionali
non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

Avvertenze: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante - preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi - non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco - non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua - lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore - il p.a. non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE
LINURON PAVONI è un erbicida in pasta fluida adatto per il diserbo di diverse colture sia in pre che in post emergenza della coltura stessa.

DOSI E CAMPI D'IMPIEGO
MAIS: pre-emergenza: terreni leggeri o di medio impasto litri 1,200 per ettaro e litri 1,450 nei terreni pesanti.
CAROTA: pre-emergenza: terreni leggeri litri 1,450, litri 1,950 nei terreni di medio impasto; litri 2,350 nei terreni pesanti.
Post-emergenza: litri 2,350/ha.

PATATA: in pre-emergenza, con impiego sempre in miscela con altri prodotti e non oltre la dose di litri 2,400. Nei terreni leggeri litri 1,500, nei terreni di medio impasto litri 2, nei terreni pesanti litri 2,400

SEDANO: pre-emergenza: nei terreni leggeri litri 1,500, nei terreni di medio impasto litri 2, nei terreni pesanti litri 2,400.
Post-emergenza: litri da 1 a 2,4 a seconda del tipo di terreno

FINOCCHIO: pre-emergenza: litri 1,100 per ettaro. Post-emergenza: (dopo la sesta foglia) litri 1,100 per ettaro
FAGIOLINO-FAGIOLINO: pre-emergenza: litri 700-1,400 a seconda del tipo di terreno
CARCIOFO: trattare prima della ripresa vegetativa a litri 1,600 per ettaro
SOIA: in pre-emergenza, da litri 1 a litri 1,650 per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Associazioni: possibili con altri erbicidi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: trattandosi di un erbicida, impiegare solo sulle colture e con le macchine consigliate. Evitare di colpire le colture limitrofe o comunque sensibili. Preparare le diluizioni lontano da piante coltivate o dalle zone della loro espansione radicale. Assicurarsi del perfetto funzionamento delle attrezzature per una uniforme e regolare distribuzione.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER LE COLTURE DI CARCIOFO, SEDANO, FINOCCHIO, CAROTA, PATATA, MAIS.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Ditta: RHONE POULENC AGRO

Principio attivo:

CLOROTALONIL

LINURON

Presidio sanitario:

DACONIL 75
DACOSTAR
R6 ERRESEI DAC 60-8

ISOLIN

DACONIL 75

Fungicida organico per frutteti, vite, grandi colture, colture ortive, colture ornamentali
Granuli idrodispersibili (WDG)

Composizione:

Clorotalonil g 75
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Frazi di Rischio:


Nocivo a contatto con la pelle
Nocivo per ingestione
Possibilità di effetti irreversibili

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Norme Precauzionali :

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.



NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

 **RHÔNE-POULENC**

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Officina di Produzione:

U.C.B. , Gent (Belgio)

Officina di Confezionamento :

Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 2618 Ministero della Sanità del 2/7/1977

Contenuto netto: Kg 1 - 5

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio.
Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante.
Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni

DACONIL 75

CARATTERISTICHE

Il **DACONIL 75** è un efficace fungicida organico ad ampio campo d'azione, dotato di resistenza al dilavamento ed attività residua.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO (per ettaro)

* Melo e pero: contro *Ticchiolatura* e *Oidio*: g 80 per 100 litri di acqua (numero applicazioni massime annue: 4).

* Pesco: contro *Ticchiolatura* e *Oidio*: g 100 per 100 litri d'acqua (numero applicazioni massime annue: 4).

Sedano: contro *Septoria*, *Ceroaspera*, *Rizootonia*: Kg 1,3-2 (numero applicazioni massime annue: 5 in pieno campo ed in serra).

Pomodoro: contro *Stemphitium*, *Alternaria*, *Peronospora*, *Antracnosi*: Kg 1,3-2 - contro *Septoria*, *Rizootonia*, *Botrytis*: Kg 1,5-2 (numero applicazioni massime annue: 3 in pieno campo, 5 in serra).

Melone e ostricolo: contro *Antracnosi* e *Peronospora*: Kg 1,3-2 (numero applicazioni massime annue: 3 in pieno campo ed in serra).

Patata: contro *Alternaria*, *Septoria*, *Botrytis*: Kg 1,3-2 (numero applicazioni massime annue: 2).

Culture ornamentali: contro *Ruggini*, *Black spot* della rosa, *Botrytis*: g 200 per 100 litri d'acqua; contro *Oidio* g 300 per 100 litri d'acqua

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE

Aggiungere al prodotto un volume doppio o triplo di acqua mescolando sino ad ottenere una pasta omogenea. Aggiungere acqua sino a rendere abbastanza fluida tale sospensione: versarla nel serbatoio dell'irroratrice e, continuando a mescolare, portare a volume.

AVVERTENZE

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco.
- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.
- Intervallo tra il momento del trattamento ed il successivo rientro: in campo, 12 ore; in serra, 24 ore.
- * N.B. : per le colture di Melo, Pero e Pesco l'impiego è previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è associabile con:

- sterolo-inibitori fungicidi;
- antiperonosporici sistemici, citotropici e translaminari;
- dicarbosimidici (antibiotici);
- benzimidazolici;
- rame;
- zolfo.

Non si consiglia l'impiego di bagnanti adesivanti.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per varietà di melo del gruppo Golden e per alcune altre a buccia rossa (*Stark Delicious*, *Red Delicious*, *Imperatore*) sulle quali può produrre rugginosità.

Non trattare le colture floreali durante la fioritura: su quelle più delicate, eseguire saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 21 giorni su pomacee e drupacee; 14 giorni sulle altre colture.

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO



Rhône-Poulenc Agro S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA - Viale degli Armiragli, 91 - Tel. 06/32.69.21

SERVIZI TECNICI: 40136 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 -

Tel. 051/53.32.68


PERMANENZA TELEFONICA: (0562) 44.31

DACOSTAR

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione:

Clorotalonil	g 19,5 (= 257,01 g/l)
Rame Ossicloruro	g 19 (= 250,42 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA**NOCIVO****Frazi di Rischio:**

Possibilita' di effetti irreversibili
 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
 Irritante per gli occhi
 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori dalla portata dei bambini
 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
 Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
 Non respirare le polveri
 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
 Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggergli gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

OFFICINE DI PRODUZIONE

Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione: n. 2582 del 07. 05. 1977

Contenuto netto: ml 100 - 200 - 500 | 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**Norme Precauzionali :**

Non operare contro vento
 Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

CLOTOTALONIL 19,5 %
 RAME OSSICLORURO 19 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOTOTALONIL

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacita' corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

RAME OSSICLORURO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso.
 Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
 Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

DACOSTAR

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il DACOSTAR è un fungicida cupro-organico indicato per la lotta contro le malattie crittogamiche delle piante, in sostituzione dei tradizionali sali e potiglie rameiche (ossicloruro di rame, potiglia bordellese).

Pomodoro : contro *Peronospora*, *Alternaria*, *Septoria* e *Cladosporiosi* : 300 - 350 ml/ha ;
 Patata : contro *Peronospora* e *Alternaria*, 300 - 320 ml/ha ;
 Sedano : contro *Septoria*, *Peronospora*, *Alternaria*, 250 - 280 ml/ha ;
 Cipolla : contro *Peronospora*, *Ruggine*, *Alternaria*, 250 - 280 ml/ha ;
 Cocomero, Melone, Ostrione : contro *Antraconosi* e *Cladosporiosi*, 250 - 280 ml/ha ;
 Pisello, Fagiolo, Fagiolino :
 contro *Antraconosi*, *Ruggine*, *Peronospora*, 200 ml/ha

Non superare la quantità di 5,2 litri di prodotto per ettaro e per trattamento e, complessivamente, la quantità di 10,4 litri di prodotto per ettaro, per i vari trattamenti nel corso della stagione ;

Su cetriolo, melone, cocomero, sedano ; in campo e in serra, su pomodoro ; in campo, non superare la quantità di 6,5 l/ha per trattamento, e, complessivamente, la quantità di 19,5 litri di prodotto per i vari trattamenti nel corso della stagione.

Per il pomodoro in serra non superare complessivamente la quantità di 32,5 litri di prodotto per ettaro, per i vari trattamenti nel corso della stagione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZE

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di tacciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofungicida.
- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corpi d'acqua.
- Intervallo tra il momento del trattamento ed il successivo rientro in campo : 12 ore ; in serra 24 ore.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è associabile con :

- sterolo-inibitori fungicidi
- antiperonosporici sistemici, citotropici e transaminari
- dicarbossimidici (antibiotici)
- benzimidazolici
- rame
- zolfi

Non si consiglia l'impiego di bagnanti adesivi

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta : 20 giorni

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO



Rhône-Poulenc Agre S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 81
 - Tel. 06/32.09.21
 DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 -
 Tel. 051/53.32.88
 PERMANENZA TELEFONICA: (082) 44.31


R6 ERRESEI DAC 60-8

Fungicida cupro-organico per la vite, fruttiferi, olivo, colture industriali ortive e floreali
Granuli idrodispersibili (WDG)

Composizione:

Clorotaloni g 25
Rame Ossicloruro g 42
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA



NOCIVO

Frasi di Rischio:

Possibilità di effetti irreversibili
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Nocivo a contatto con la pelle
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

 **RHÔNE-POULENC**

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 - TORINO

Officina di Produzione:
U.C.B. , Gent (Belgio)

Registrazione n. 2584 Ministero della Sanità del 22/6/1977

Partita n.: *

Contenuto netto: Kg 1 - 5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

CLOROTALONIL 25 %
RAME OSSICLORURO 42 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOROTALONIL

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio.
Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante.
Può provocare danni renali ed atassia.

RAME OSSICLORURO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso.
Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

R6 ERRESEI DAC 60 - 8

CARATTERISTICHE

L' R6 ERRESEI DAC 60 - 8 è un fungicida cupro-organico indicato per la lotta contro le malattie crittogamiche delle piante, in sostituzione dei tradizionali sali e poltiglia rameiche (ossicloruro di rame, poltiglia bordolese).
Dozi d'impiego : g 300 - 400 per 100 litri d'acqua contro i seguenti parassiti : ticchiolatura del melo e del pero; botta e veccio del pesco; peronospora, alternaria e septoria del pomodoro ; peronospora e alternaria delle patate ; septoria del sedano, ramulariosi e ruggine del garofano.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZE

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante ;
Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi ;
- Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco ;
Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore ;
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.
Intervallo tra il momento del trattamento ed il successivo rientro in campo : 12 ore ; in sera 24 ore.
N.B. : per il melo, pero e pesco l'impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con :

- sterolo-inibitori fungicidi
- antiperonosporici sistemici, citotropici e translaminari
- dicarbossimidoli (antibiotici)
- rame
- zolfo

Non si consiglia l'impiego di bagnanti adesivi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

Se pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza "Bedford" - Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winocap - Black Davis - Renetta del Canad - Rosa Mantovana - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan) e di pero (Abate Petal - Buona Luigia d'Avranche - Butira Clergeau - Passarossa - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clepp - Kaiser - Butira Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione : in tali casi se ne consiglia l'impiego dopo piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta : 21 giorni su pomacee e drupacee ; 20 giorni sulle altre colture

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO




Rhône-Poulenc Agri S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91
- Tel. 32.66.21
SERVIZI TECNICI: 40136 BOLOGNA Via B. Provegla, 3 - Tel. 53.32.66
PERMANENZA TELEFONICA: (0662) 44.31

ISOLIN

Erbicida selettivo di pre-emergenza del frumento tenero
contro monocotiledoni e dicotiledoni annuali
Emulsione

IL CLASSE
TOSSICOLOGICA



NOCIVO

Partita n. *

Composizione:

Isoproturon 931,4 (= 351,86g/l)
Linosin 7,6 (= 87,36 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

Pericoli di Rischio:

Nocivo per l'ambiente
Possibilità di effetti irreversibili
irritante per la pelle

Consigli di Previdenza:

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliarsi di mano immediatamente gli strumenti contaminati
In caso di malore consultare il medico
(se possibile, accertare gli effetti)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggere
gli occhi e la faccia

Titolare dell'Autorizzazione:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Fod, 65 - TORINO

Officine di Produzione:

Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Pagnaux (AQ)

Registrazione n. 4963 Ministero della Sanità del 25/10/1982

Contenuto netto: 1 l - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Treatati di associazione delle seguenti sostanze attive :

Isoproturon 31,4 %
Linosin 7,6 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di
intossicazione :

Isoproturon e Linosin :

Derivati dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiun-
tive, rinite nasale, irritazione della gola e della cute. L'ingestione può
causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati soltanto
ed emetici.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveletti

CARATTERISTICHE

L'ISOLIN è un erbicida selettivo di pre-emergenza del frumento tenero.
L'azione dei due principi attivi (Isoproturon + Linosin) fa-
vorisce il controllo delle principali infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali.

Infestanti sensibili

a) Graminacee: Agrostis, Alopecurus, Avena ludoviciana, Avena sativa
fasciata autunnale, Phalaris, Lolium (fasciata autunnale), Poa annua,
Poa trivialis.

b) Dicotiledoni: Adonis, Mentha, Peperoni, Polygonum (fasciata pre-
coce), Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Stellaria, Veronica.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato subito dopo la semina del frumento tenero,
prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.
Il terreno, al momento del trattamento deve essere ben sistemato, il-
velato, privo di zolle, di infestanti e di avvallamenti.

Si raccomanda una profondità di seme regolare, avendo cura di evi-
tare che parte dei semi dei cereali rimangano scoperti, perché po-
trebbero essere danneggiati dal diserbante.

Dose: Dose normale: 1,45/ha distribuiti con almeno 500 litri d'acqua.
La dose deve essere portata a 1,5/ha se si vuole combattere la Phala-
ris, l'Avena a nascita autunnale o il Lolium a nascita tardiva.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Diluire la dose di prodotto in un volume doppio d'acqua, indi versare
la pozzinga nell'irroratore in corso di riempimento.

Da non applicare con mezzi aerei.

AVVERTENZE

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di
scarpe filtranti
Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o
in locali areati diversi da quelli adatti ad altre
operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura,
deposito mangimi.

Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto
il fitofarmaco.

Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.
Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto
non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
Il P.A. non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con
contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo
Avvertenza: Non trattare su terreni sabbiosi, scisti e filitici

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in eli-
cetto.

NOCCITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone
non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche
e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è proibito.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti
da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per
assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle
piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO



Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA -
Viale degli Armerci, 61 - Tel. 06/52.00.21
SERVIZIO TECNICO: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3 -
Tel. 051/53.32.08
PERMANENZA TELEFONICA: (0662) 44.31

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

Ditta: ROUSSEL HOECHST

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:

**AFALON DS
ARESIN S
EMELDOR
LINURON DS 210
LINURON EC**

DOSE E MODALITA' D'IMPIEGO

PRELIEVO: ARESIN S si impiega in pre-emergenza prima che le piantine della patata tornino a straripare il terreno, alla dose di 2,5 litri per ettaro in 100-100 litri d'acqua. Per evitare l'incalzatura deve essere effettuata prima che le piantine siano emerse o al più tardi quando il 10-20% delle stesse siano fuoriuscite dal terreno. Mediante tale incalzatura le patate emergeranno nuovamente ricoperte con il terreno e subito dopo, quando queste si ancora il fusto, si effettua il diserbo. L'azione di biocida di ARESIN S è più persistente in terreni dove non si eseguono lavorazioni al terreno dopo il trattamento. La raccolta meccanica è di molto facilitata su colture diserbate con ARESIN S.

Aspettarsi il trattamento si effettua sul terreno già diserbato prima della fuoriuscita dei turioni. La dose d'impiego è di 1-2 litri per ettaro in 100-100 litri d'acqua.

Carota (impiego in pre-emergenza): la dose non deve superare i 2 litri per ettaro in 100-100 litri d'acqua, effettuando il trattamento prima della germinazione del seme che deve essere ben coperto dal terreno.

Le dosi d'impiego per ettaro variano con la composizione del terreno: quella minima è valida per terreni leggeri, sabbiosi o moderatamente dotati di sostanza organica, quella massima per terreni pesanti o ricchi di sostanza organica. L'effetto di biocida è sempre in stretta relazione al perfetto livellamento e aminuzzamento della superficie del terreno e allo stato di umidità di quest'ultimo.

Una leggera pioggia dopo il trattamento favorisce l'azione del diserbante. Evitare però eccessivi apporti di acqua che, come la violenta evaporazione dopo il trattamento, possono arrecare danni alla coltura. Riparare accuratamente il letto di semina. Seminare uniformemente ed il più presto possibile in relazione alla specie coltivata.

Avvertenza: è forbidden non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore al 1%.

CARATTERISTICHE

ARESIN S possiede una efficacia iniziale e un effetto sulle graminacee, anche a dieci infestanti, migliore del Linuron da solo. Inoltre l'azione residua è superiore a quella del Monolinuron.

ARESIN S agisce per via fogliare ma principalmente per via radicale. Le infestanti inizialmente erbacee per cui non risultano del trattamento, ma vengono diserbate dopo circa 15 giorni.

ARESIN S è efficace contro meno e dicotiledoni da seme quali

- Amaranthus - Anthemis - Azoollis - Atriplex - Capsella - Chenopodium - Euphorbia - Galinsoga - Galinsoga - Lamium - Mercurialis - Matricaria - Myosotis - Papaver - Polygonum - Rhabarbar - Senecio - Sinapis - Solanum nigrum - Spargano - Spargano - Stellaria - Thlaspi - Urtica - Veronica - Viola - Viola - Aloucurus - Echinoschola - Pot - Salsola.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREO

COMPATIBILITA'

ARESIN S non è miscibile con altri antiparassitari.

FITOTOSSICITA'

Non trattare in giornate eccessivamente calde e soleggiate. Eseguire il diserbo in giornate poco ventilate. Evitare superdosaggi e sovrapposizioni durante i trattamenti.

SOSPENSIONE I TRATTAMENTI DA GIORNE PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato

IL RISCHIO DELLE GRADITE IRRAZIONI E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLA PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

© Marchio registrato Hoechst Antiegesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1-981


Stabilimenti di produzione autorizzati, HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - S.r.l.A. S.p.A., Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 0.25 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 20 L

**● ARESIN S
DISERBANTE SELETTIVO
DISPERSIONE ACQUOSA**

● **ARESIN S**
Composizione: Linuron puro 19,6% p/p (-0,35 g/l) Monolinuron puro 19,6% p/p (-0,35 g/l). Coricorimulanti quanto basta a 100.

CLASSE II



NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

il contenitore non può essere riutilizzato

CONTENUTO

PARTITA N°



ROUSSEL-HOECHST AGGROVET S.p.A.
20149 MILANO - P.le S. Türr, 5

Registrazione n. 5075 del 1977/1984 del Ministero della Sanità

nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
- irritante per la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande - non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - usare guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrarci l'etichetta).

NOTE PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- nella preparazione della miscela muraria di quanti e di facciata filtrante
- evitare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto in locali ariati
- diversi da quelli previsti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi
- non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco
- non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua
- lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Linuron 19,6% e Monolinuron 19,6% le quali provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Linuron e Monolinuron (derivati dell'urea): durante l'impiego possono causare congiuntivite, irritazione nasale, irritazione della gola e della cute. L'intossicazione può essere gastroenterica, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subito ed ematuria.
Terapia sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni.

EMELDOR

DISERBANTE SELETTIVO DI PRE-EMERGENZA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

EMELDOR
Composizione: Trifluralin puro 23,5% p/p (-240 g/l), Linuron puro 11,75% p/p (-120 g/l). Contiene Xilene

CLASSE II

ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA



IRRITANTE

PARTITA N°



ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.
20149 MILANO - p.le S. Turr, 5

Registrazione n. 3473 del 6/2/1980 del Ministero della Sanità

OFFICINA DI PRODUZIONE

CONTENUTO

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggere gli occhi/la faccia - in caso di incidente o di malesser consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrare l'etichetta)

FORME PRECAUZIONALI

- non contaminare corai d'acqua
- nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante
- spruzzare la miscela in recipienti apposti, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdure, deposito mangimi
- non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco
- non impiegare il prodotto in prossimità di corai d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trifluralin è un'associazione delle seguenti sostanze attive: Trifluralin puro 23,5%, Linuron puro 11,75%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Linuron (derivato dell'urea): dur ante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, non che irritazione della gola e della cute. L'impiego può causare gastrite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitro ed encefaliti.
Trifluralin: non è noto se sia un'azione narcotica, irritante per le mucose, o se possa indurre di danno cumulativo epatrenale.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni.

DOSE E MODALITA' D'IMPIEGO

Framento d'orto e tenero, erzo e segale a semina levernale: si impiega EMELDOR alla dose di 3-3,7 l/ha per qualsiasi tipo di terreno, in 400-800 litri di acqua EMELDOR deve essere impiegato dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura da trattare e deve essere distribuito per irrorazione e non incorporato nel terreno. I migliori risultati si ottengono preparando bene il letto di semina, eliminando le zolle d'erba e ricorrendo a concimazione tutti i semi così da escludere una germinazione irregolare. Qualora fosse necessaria una l'attivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin in miscela con Linuron e la semina di semina di frumento, grano, segale, mais, orzo e pisello di semina per soia, pomodoro, erba medica e trifoglio mediano, coccomer, cetriolo e zucca, insalate, tabacco, cipolla, patata, cazza e cavoli, spinaci.

Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.

La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Avvertenza: il formulato non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

CARATTERISTICHE

EMELDOR è un diserbante selettivo per il controllo in pre-emergenza di infestanti gramineacei e dicotiledoni in colture di orti e di semina invernale. Le principali infestanti controllate sono:

- gramineacee annuali: Alopecurus agr. seta, Alopecurus myosuroides, Alopecurus pratensis, Apera spica-venti, Briza minor, Lolium multiflorum, Poa spp.;
- dicotiledoni annuali: Alchemilla arvensis, Anagallis arvensis, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Fumaria officinalis, Juncus bulbosus, Lemnium purpureum, Lanthium amplexicaule, Lathyrus pratensis, Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Myosotis arvensis, Myosotis minimum, Sinapis rhomboides, Polygoum aviculare, Ranunculus spp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sarcocolla asper, Specularia perfoliata, Stellaria media, Thlaspi arvense, Valerianella rotundifolia, Veronica spp.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non sono raccomandate miscele con altri prodotti antiparassitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere indici osservate le norme per occupazioni previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzioni: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Avvertenza: conservare il prodotto in locali a temperatura oltre i 5°C. Non conservare presso sorgenti di calore e fiamme. Al termine delle operazioni, lavare accuratamente con acqua e soda tutta l'attrezzatura usata per la diluizione e l'impiego del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SPUGO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Il Marchio registrato Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della

Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

1.991

Stabilimenti di produzione autorizzati HOECHST A.G. Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania) - PRODA S.p.A. Saint Maron, 13367 Marsiglia (Francia) - S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (L.T) - DOW ELANCO ITALIA s.r.l., Orzano Emilia (BO)

Taglie autorizzate 1 - 2 - 5 - 10 L

LINURON DS 210

ERBICIDA SELETTIVO
DISPERSIONE ACQUOSA

Composizione: Linuron puro 18,5 g (= 210 g/l) coformulanti quanto basta a 100 g

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- conservare il prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante
- preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi
- non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco
- non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua
- lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati sibilero ed ematuria.

Terapia sintomatica

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleeni

Officine di produzione
HOECHST AG, Hoechst, Francoforte sul Meno (Germania)
PROCIDA S.A., Saint Marcel - 13357 Marsiglia (Francia)
S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)



ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.A.

20100 MILANO - Casella postale 1847
Registrazione n. 2784 del 8/6/1978 del Ministero della Sanità



I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte sul Meno

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- Asparago: il trattamento si effettua sul terreno già sistemato prima della fuoriuscita dei turioni. La dose di impiego è di 2-4 l/ha in 400-600 litri d'acqua.
 - Carciofo di nuovo impianto: 1,6-2,8 l/ha in 600-800 litri d'acqua dopo la messa a dimora degli ovuli e prima della fuoriuscita dei germogli dal terreno.
 - Carciofo di nuovo impianto riprodotto per carciocci (pollenti): 2-3 l/ha in 600-800 litri d'acqua, 15-25 giorni dopo la messa a dimora dei carciocci.
 - Carciofo di vecchio impianto: 2-4 l/ha in 600-800 litri d'acqua, alla ripresa vegetativa prima che i germogli raggiungano la lunghezza di 15-20 cm.
 - Carota: impiego in pre-emergenza: la dose non deve superare 4 l/ha in 400-600 litri d'acqua, effettuando il trattamento prima della germinazione del seme che deve essere ben coperto dal terreno. Impiego in post-emergenza: la dose varia da 3 a 4 l/ha in 400-600 litri d'acqua ed il trattamento si effettua a partire da quando le carote hanno completamente formato il secondo paio di foglie (4 foglie vere), scegliendo il momento e la dose idonei in funzione dello sviluppo delle infestanti. Impiego misto in pre e post-emergenza: si consiglia la dose di 3 l/ha e prima semina, in pre-emergenza ed una seconda applicazione alla stessa dose quando le piante hanno differenziato le 4 foglie vere (dopo circa un mese dalla nascita delle piante).
 - Fagiolo, fagiolino: solo in pre-emergenza subito dopo la semina, alla dose di 2-2,5 l/ha in 400-600 litri d'acqua; per terreni di medio impasto; in terreni leggeri ridurre la dose a 1,6 l/ha.
 - Fipocchilo: si impiega LINURON DS 210 in post-emergenza a partire da quando la coltura ha differenziato la quarta foglia vera, alla dose di 1-2 l/ha in 400-600 litri d'acqua.
 - Girasole: solo in pre-emergenza della coltura, subito dopo la semina, alla dose di 2-2,5 l/ha in 400-600 litri d'acqua.
 - Mais: LINURON DS 210 si impiega solo in pre-emergenza, subito dopo la semina, su colture di primo e secondo raccolto, alle seguenti dosi in 400-600 l d'acqua/ha:
2,8 l/ha nei terreni argillosi o torbosi
2,4 l/ha nei terreni di medio impasto, in miscela con altri erbicidi
2,4 l/ha nei terreni di pre-emergenza della coltura, subito dopo la semina, alla dose media di 4 l/ha in 400-600 litri d'acqua; in terreni leggeri ridurre la dose a 3 l/ha; impiegare sempre in miscela con altri erbicidi selettivi.
 - Sedano: il trattamento si effettua a partire da 8-10 giorni dal impianto in pieno campo. La dose di impiego è di 3-4 l/ha in 400-600 litri d'acqua.
 - Soia: in pre-emergenza della coltura alla dose di 2-3 l/ha in 400-600 litri d'acqua
- Le dosi di impiego per ettaro variano con la composizione del terreno: quella minima è valida per terreni leggeri, sabbiosi e moderatamente dotati di sostanza organica, quella massima per terreni pesanti o ricchi di sostanza organica.
- Avvertenza: il formulato non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

LINURON DS 210 è generalmente miscibile con i principali diserbanti. Nel caso dubbi è comunque opportuno verificare la compatibilità, fuora dei formulati Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Alle normali dosi di impiego la persistenza nel terreno di LINURON DS 210 non supera i 2-3 mesi per cui si ha una buona durata di efficacia, senza pericolo alcuno di inquinamento del suolo. Eseguite il diserbo in rotazione. Non trattare in giornate eccessivamente calde o soleggiate. Evitare il diserbo in giornate poco ventilate.

Evitare sovradosaggi e sovrapposizioni durante i trattamenti.

SOSPENDE IL TRATTAMENTO 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ASPARAGO, CARCIOFO, CAROTA, FAGIOLINO, FAGIOLINO, MAIS, PATATA, SEDANO.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI INDICATI IN OGNI ETICHETTA. IL PRODOTTO E' RESISTENTE AGLI EVENTUALI MANI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il trattamento deve essere istruito e condizionato esclusivamente per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SEUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

16.1190

Ditta: S A N D O Z

Principio attivo:

CLOROTALONIL

Presidio sanitario:


SANDOFAN CL

Taglieri L 1-5-10

SANDOZ A.G. - CH 4133 SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA) - SANDOZ S.A.E.-L'HOSPITALET-BARCELONA (SPAGNA) - PRODUITS SANDOZ S.A.-GAILLON (FRANCIA) - DIACHEM - ALBANO S.ALESSANDRO - DOW ELANCO ITALIA Sd-OZZANO EMILIA (BOLOGNA) - SIPCAM SpA-SALERANO SUL LAMBRO (MILANO)

SANDOFAN-CL

Anticrittogamico in sospensione concentrata che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora del pomodoro, della patata, del melone, della cipolla e delle colture floreali ed ornamentali.



CLASSE II

 **SANDOZ**

Officina di produzione:

Composizione
 Oxiadiazolo 6,8 (= 80 g/l)
 Clorotaloni puro 35 (= 413 g/l)
 Dispersanti e coadiuvanti quanto basta e g 100

SANDOZ AGRO SpA
 MILANO, Via Arconati 1

Contenuto netto:

(*) SANDOZ Ltd, BASELGA

Partita n.:

NOCIVO

Registrazione n. 7863 del 27.6.1989 del Ministero della Sanità

Nocivo a contatto con la pelle - Nocivo per ingestione - Possibilità di effetti irrisolvibili - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile menzionare l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture e corsi d'acqua - Non operare contro vento - È obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Evitare l'innocuo con i mezzi più idonei le confezioni che contengono il prodotto - Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante - Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto e in locali ariati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi - Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore - Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Informazioni per il medico

Treatato di associazione delle seguenti sostanze attive
 Oxiadiazolo 6,8%
 Clorotaloni 35%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.

Oxiadiazolo (acetanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione.

Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.

Possibile discrasia ematica con urina scure.

Clorotaloni - Irritante per la cute e per le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali e stasi.

Terapie - Sintomatica - Consultare un Centro Antiveletici.

Caratteristiche

Le sistemidici, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono al SANDOFAN CL di controllare la Peronospora adottando intervalli fino a 14 giorni, indipendentemente dall'andamento della pioggia.

Modalità, dosi e tempi d'impiego

Pomodoro e patata

Peronospora (*Phytophthora infestans*) ml 250 in 100 litri acqua.

Intervenire ogni 14 giorni dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia (per il pomodoro massimo 3 trattamenti in campo/5 in serra; per la patata massimo 2 trattamenti in campo). SANDOFAN CL, oltre alla Peronospora, è in grado di controllare altre malattie fungine quali Alternaria, Septoria, Antracnosi e Botrytis grigia.

Cipolla

Peronospora (Peronospora destructor) ml 250 in 100 litri acqua.

Intervenire ogni 12-14 giorni con l'eventuale di aggiungere SANDOVT LIQUIDO alla dose di ml 50/100 litri di acqua per favorire l'assorbimento del prodotto. SANDOFAN CL impiegate su cipolla è in grado di controllare anche infezioni di Muffa grigia e Ruggini (massimo 2 trattamenti in campo).

Melone

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) ml 250 in 100 litri acqua.

Intervenire ogni 10-12 giorni. L'impiego di SANDOFAN CL consente di controllare anche eventuali attacchi di Antracnosi (massimo 3 trattamenti in campo/sera).

Fioroni e ornamentali

Peronospora ml 250 in 100 litri acqua

L'impiego è consentito solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici. Prima dell'impiego del prodotto in queste colture effettuare piccoli saggi sulla selettività.

Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati con un consumo di formulato non inferiore a 2,5 litri per ettaro.

N.B. Dopo il trattamento non rientrare in campo prima di 12 ore; in serra 24 ore.

AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi non sensibili alle fenilamidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare mai sui vivali di vite.

Preparazione della poltiglia

Durante le operazioni di riempimento del serbatoio con acqua, versare il quantitativo necessario del prodotto, avendo cura di far funzionare l'agitatore, o di mescolare comunque energicamente la poltiglia.

Da non applicarsi con mezzi aerei.

Compatibilità

Il formulato è compatibile con tutti gli altri antiparassitari SANDOZ a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione completa.

Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Ditta: S A R I A F***Principio attivo:*****CLOROTALONIL****LINURON*****Presidio sanitario:*****DACSAR
SARNIL****ARBAX F
TRIFLURON**

irritante oculare con possibile opacità corneale Sensibilizzante
Può provocare danni renali ed atassia.

Terapia sintomatica.

RAME OSSICLORURO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

IL DACSAR è un fungicida ad azione preventiva, risultante dalla combinazione dei Clorotoni con l'Ossicloruro Tetrammico; è in grado di combattere efficacemente le malattie fungine delle Colture orticole, dei Fiori e delle Colture ornamentali in pieno campo.

IL DACSAR viene impiegato alle seguenti dosi:

PCMOCCORO

Contro Peronospora, Septoria Ticholatura, Alternaria ed Antracnosi

2,5-4 l/ha - applicazioni annue consentite: max 3 in campo, 5 in serra

PATATA

Contro Peronospora ed Alternaria

2,5-4 l/ha - applicazioni annue consentite max 2

SEDANO

Contro Septoria e Alternaria

2,5-4 l/ha - applicazioni annue consentite max 3 sia in campo, sia in serra

GAROFANO, ROSA, GLADIOLIO, CRISANTEMO E COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO

CAMPO

Contro Peronospora, Alternaria, Ticholatura Septoria

2,5-4 l/ha

Intervenire preventivamente secondo i normali calendari dei trattamenti, senza superare il

numero massimo di applicazioni consentite per anno.

Non entrare né lavorare - senza idonea protezione individuale - nell'area trattata entro 12

ore (in campo) o 24 ore (in serra).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il prodotto è compatibile con: sterolo-inibitori fungicidi; antiperonosporici sistemici, citotropici e

translaminari; dicarbossimidi (antibiotici); benzimidazoli; zolli.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza

più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più

tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione

COMPATIBILITA':

Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzioni! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni

altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del

preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del tratta-

mento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

TAGLIE AUTORIZZATE

1 - 10 litri

OFFICINE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE:

S.I.A.P.A. S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (BO)

S.I.L.I.A. S.p.A. - Agrilla (LT)

DA NON VENDERSI SFUSO

DACSAR

Fungicida organico ad ampio spettro d'azione e alta persistenza,

attivo contro le malattie fungine degli Ortaggi,

Colture floreali ed ornamentali in pieno campo

formulazione flowable

COMPOSIZIONE:

CLOROTALONIL puro g 15 (= 237 g/l)

RAME METALLO (solo forma di

Ossicloruro tetrammico) g 30 (= 474 g/l)

Solventi ed emulsionanti q.b. a g 100

CLASSE II

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

Possibilità di effetti irreversibili

Irritante per gli occhi

Può provocare sensibilizzazione per

inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e

consultare il medico

In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)



EniChem S.p.A. - Bologna - Via Clavature, 22

DISTRIBUITO DA: EniChem Agricoltura S.p.A. - Milano

OFFICINA DI PRODUZIONE:

Registrazione n. 6440 del 13/6/1985

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.: Vedere margine inferiore etichetta

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Conservare la confezione ben chiusa.

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.

Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli

adatti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi,

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire

secondo le norme in vigore.

Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:


Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

CLOROTALONIL 15% e RAME OSSICLORURO 30% di Cu metallo

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOROTALONIL

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio.



NOCCIVO

Campi d'impiego

Il SARNIL è un antichitogamico a largo spettro di azione efficace contro diverse malattie fungine delle piante da frutto (melo, pero, pesco e susino), colture orticole (sedano, pomodoro, cucurbitario, melone, cetriolo, fagiolo, pisello, fagiolino, cipolla, patata), piante ornamentali e da fiore.

Per la sua azione residua e la sua resistenza al dilavamento, assicura un'efficace protezione delle colture, anche in condizioni sfavorevoli.

Il SARNIL si usa per combattere: muffa grigia, ticchiolatura, peronospora cercosporiosi, ruggine, nerume, alternariosi, antracnosi, cladosporiosi, septoriosi, bolla, viaiatura, fusariosi, moniliosi, rizzioniosi, cancro dei rami del melo.

Dosi e modalità d'impiego

Il SARNIL deve essere usato a scopo preventivo, alle seguenti dosi

Melo e pero	1,2-2 l/ha - applicazioni annue consentite max 4 in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici
Pesce e susino	1,6-2 l/ha - applicazioni annue consentite max 4 in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici
Sedano	2-3 l/ha - applicazioni annue consentite max 3 sia in campo, sia in serra
Pomodoro	2-3 l/ha - applicazioni annue consentite max 3 in campo, 5 in serra
Cocomero, melone, cetriolo	2-3 l/ha - applicazioni annue consentite max 3 sia in campo, sia in serra
Fagiolo, pisello, fagiolino	2-2,4 l/ha - applicazioni annue consentite max 2 in pieno campo
Cipolla	2-3 l/ha - applicazioni annue consentite max 2 in pieno campo
Patata	2-3 l/ha - applicazioni annue consentite max 2
Fioralisi e ornamentali	2-3 l/ha

Occorre bagnare bene le colture da proteggere e ripetere i trattamenti in base al calendario di incubazione delle malattie, senza superare il numero massimo di applicazioni consentite per anno. Non entrare né levitare - senza idonea protezione individuale - nell'area trattata entro 12 ore (in campo) o 24 ore (in serra).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**Compatibilità**

Il prodotto è compatibile con steroidi-inibitori fungicidi, anipirosporici sistemici, citotropici e trasmanirani; dicarbosammici (antibiotici); benzimidazoli; rame; zolfo.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

In particolari condizioni può provocare fenomeni di rugginosità su alcune varietà di melo (Golden e altre a buccia rossa) e su alcune varietà di rose. Sulle colture da fiore più delicate, effettuare saggi preliminari per stabilire, caso per caso, la dose ottimale.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta, su melo, pero, pesco e susino; 14 giorni prima della raccolta sulle altre colture.

Avvertenze: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

TAGLIE AUTORIZZATE: 0,200 - 1 litro

OFFICINE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE
CAFFARO S.p.A. - ADNA - Cavanella Po (NO)
CHEMA S.p.A. - Sant'Agostino (FE)
S.I.A.P.A. S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (BO)
S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)

DA NON VENDERSI SFUSO

SARNIL

Antichitogamico
 formulazione flowable

COMPOSIZIONE:

CLOROTALONIL puro g 40 (= 500 g/l)
 Solventi ed emulsificanti q.b. a g 100

CLASSE II

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Possibilità di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini
 Non conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico
 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)



S.p.A. - Bologna - Via Clavature, 22


DISTRIBUITO DA: EniChem Agricoltura S.p.A. - Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE:

Registrazione n. 6867 del 11/11/1986

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.: Vedere margine inferiore etichetta



NOCIVO

consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Conservare la confezione ben chiusa.

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante

Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali ariati diversi da quelli usati ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdure, deposito mangimi.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio

Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante.

Può provocare danni renali ed epatici.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

<p>CAROTA</p> <p>pre-emergenza 1,150-2,300 litri/ha post-emergenza 1,4-2,3 litri/ha. in funzione dello sviluppo delle infestanti. pre-emergenza o post-trapianto, 1,4-2,3 litri/ha pre-emergenza o post-trapianto, 0,5-1,150 litri/ha 1,4-2,3 litri/ha</p> <p>SEDANO FINOCCHIO PATATA</p> <p>in terreni pesanti miscelare con altro diserbante selettivo, senza superare la dose massima consigliata pre-emergenza, 0,7-1,4 litri/ha pre-emergenza, 0,9-2,3 litri/ha 0,7-1,6 litri/ha. Si possono eseguire 1 o 2 trattamenti, alla fine dell'estate, e ripetere il secondo dopo 4-5 mesi circa. pre-emergenza.</p> <p>FAGIOLINO ASPARAGO CARCIOFO</p> <p>- nei terreni di medio impasto 1,150 litri/ha in miscela con altri diserbanti selettivi - nei terreni torbosi e argillosi 1,400 litri/ha Effettuare il trattamento subito dopo la semina e comunque prima della germinazione dei semi che devono essere ad una profondità di 4-5 cm</p> <p>MAIS</p> <p>pre-emergenza, 0,9-1,6 litri/ha</p>	<p>SOJA</p> <p>Risipellare rigorosamente le dosi: minime nei terreni scolti, massime nei terreni argillosi o molto ricchi di sostanza organica. Le dosi suddette vanno diluite in 400-600 litri d'acqua Usare normali pompe irroratrici munite di agitatore, con ugelli a getto sottile e uniformi. Eseguire i trattamenti su terreno finemente sminuzzato e livellato, umido e privo di infestanti molto sviluppati. In mancanza di pioggia entro 7-8 giorni dal trattamento, intervenire con una equilibrata irrigazione Evitare di effettuare i trattamenti nei terreni molto sabbiosi, ricchi di scheletro ed estremamente poveri di sostanze organiche. Nei terreni torbosi e molto ricchi di sostanze organiche, effettuare solo trattamenti di post- emergenza. Eseguire i trattamenti in giornate poco ventilate e non molto calde. Dopo il trattamento non lavorare in alcun modo il terreno. Nei terreni trattati con l'ARBAX F si sconsiglia di seminare colture diverse da quelle sopra indicate prima di 3-4 mesi dall'applicazione del prodotto. Diluire in poca acqua la quantità di prodotto necessaria ed aggiungere poi la quantità totale di acqua, sotto agitazione. COMPATIBILITÀ: DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI Il prodotto è miscibile con i seguenti diserbanti: CP 40, DCA 50, D 75 Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di infossicazione informare il medico della miscelazione compilata FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta. Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e condizioni essenziali per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente</p>
---	---


TAGLIE AUTORIZZATE
0,500 - 1 litro

OFFICINE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE
CAFFARO S.p.A. - ADRIA - Cavarela Po - (RO)
CHEMIA S.p.A. - Sant'Agostino (FE)
S.I.A.P.A. S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (BO)
S.I.L.L.A. S.p.A. - Aprilia (LT)

DA NON VENDERSI SFUSO

ARBAX F

Diserbante selettivo su colture orticole, mais e soia
formulazione flowable



IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
LINURON puro 9 37,6 (= 436 g/l)
Solventi ed emulsionanti q.b. a g 100

CLASSE III

Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile
mostrargli l'etichetta)

 **S.p.A.** - Bologna - Via Clavature, 22

DISTRIBUITO DA: EmChem Agricoltura S.p.A. - Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE:

Registrazione n. 0853 del 15/6/1972
QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.: vedere margine inferiore etichetta

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante
Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli
adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdure, deposito mangimi
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua
Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire
secondo le norme in vigore
Il p.a. non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore
all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, irrite nonché irritazione
della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subitaneamente ematuria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveneni

Dosi e modalità d'impiego: L'ARBAX F controlla Amaranzo, Poligono convolvolo, Chenopodio,
Ampelico, Erba morella, Stalida, Portulaca, Papavero, Camomilla, Erba stroma, Senape, Rafano,
Capsella, Fucola, Euforbia, Cicharbia, Senecio, Erba strepiona, Anagallis, Poa.
Mediamente sensibili risultano, nei terreni argillosi e siccitosi: Setaria, Digitaria, Glavone,
P. aviculare, P. persicaria, mentre resistenti sono: Fumaria, Veronica, Avena selvatica e
tutte le perennanti, quali: Stoppione, Vifucchio, Equiset, Gramigna.

LINURON
Derivato dell'urea. Sintomi durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.

L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subitaneamente ed ematuria.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

Modalità e campi d'impiego
Il TRIFLURON è un diserbante selettivo del frumento, orzo, segale a semina autunno-invernale per il controllo delle infestanti graminee annuali quali: Erba codina, Loglio, Posa, Spica Venti e di quelle a foglia larga quali: Anagallide, Caprosella, Centocchia, Cerastio, Correggiolo, Erba ruota, Erba storna, Fumaria, Litospermo, Papavero, Rafano, Ranuncolo, Senape, Spengola, Valerianella, Veronica.

Il TRIFLURON viene impiegato sulle seguenti colture: Frumento a semina autunno-invernale, duro e tenero; Orzo a semina autunno-invernale; Segale a semina autunno-invernale. Il prodotto deve essere impiegato dopo la semina e prima della emergenza della coltura da trattare.

Il TRIFLURON si deve distribuire per irrorazione e non deve essere incorporato nel terreno. Per assicurare i migliori risultati il letto di semina deve essere ben preparato e smiruzzato, eliminando le zolle grosse e facendo in modo che tutti i semi siano ricoperti dal terreno al fine di assicurare una germinazione uniforme.

Dosi

La dose d'impiego è di 3-3,5 litri per ettaro per tutti i tipi di terreno, usando la dose massima in caso di temperatura elevata al momento del trattamento o quando si prevedono forti infestazioni di graminee.

La dose prescelta di TRIFLURON va applicata in 400 - 600 litri di acqua per ettaro; evitare di lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per l'irrorazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AERIEI

Competibilità Si sconsigliano miscele con altri prodotti

Istruzioni speciali

Qualora fosse necessaria una ricottivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Triflurone in miscela con Linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio.

Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.

La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Attenzioni Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

OFFICINE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE
BASILINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. - Treviglio (BG)
CHEMIA S.p.A. - Sant'Agostino (FE)
S.A.R.J.A.F. S.p.A. - Ferrara (RA) - Via San Silvestro, 1
S.I.A.P.A. S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (BO)
S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)
TERRANALISI S.n.c. - Renezzo di Cento (FE)

DA NON VENDERSI SFUSO

TRIFLURON

Diserbante selettivo per colture di frumento, orzo e segale a semina autunno-invernale

COMPOSIZIONE:

LINURON PURO 9 11,75 (= 123 g/l)
TRIFLURON PURO 9 23,50 (= 247 g/l)
Solventi ed emulsionanti q.b. a g 100
Contiene XILENE e CICLOESANONE

CLASSE II

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrare l'etichetta)




S.p.A. - Bologna - Via Clavature, 22

DISTRIBUITO DA: EniChem Agricoltura S.p.A. - Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE:

Registrazione n. 6835 del 29/10/1986

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: 1 litro
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.: vedere margine inferiore etichetta



NOCIVO

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.

Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati, diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.

Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

Il formulato non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanze organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattati di associazione delle seguenti sostanze attive

TRIFLURON 23,50%

LINURON 11,75%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione

TRIFLURON: _____

Ditta: S C A M

Principio attivo:

CLOROTALONIL

LINURON

Presidio sanitario:

TALONIL FL

LURONTIL
PROPILAN
UREON FL

T A L O N I L - F L

Fungicida polivalente in sospensione concentrata

TALONIL - FL

COMPOSIZIONE

- CLOROTALONIL puro g. 40 (= 500 g/l)
- Coformulanti qb a g.100

FRASI DI RIFERIMENTO

Nocivo a contatto con la pelle e per inalazione - Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Conservare fuori della portata dei bambini - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO


registrazione n.6296 del 13/3/85 del Ministero della Sanità
Stabilimento di produzione: SCAM srl - Modena

S C A M srl Via Bellaria 164, - Modena -

litri

Partita n°.....

CLASSE II



NOCIVO

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua -
AVVERTENZE: nella preparazione della miscela evitarsi di quanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofaraco. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: sintomo irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveneni.

MODALITA' D'IMPIEGO: il TALONIL FL è un fungicida con un vasto campo d'azione in grado di controllare numerose specie fungine e con una elevata resistenza al dilavamento e buona attività residuale. Possiede azione preventiva di contatto, ha come effetto collaterale un'azione frenante sullo sviluppo delle popolazioni di acari. Mela-Però: (impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici): contro l'icchiolatura, Oidio, Ruggine e Gloeosporium alla dose di lt. 1,2-2 per ha e per applicazione. Sono consentite quattro applicazioni massivo all'anno. Pesca e Susino: (impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici): contro Bolla, Corineo, Monilia, Nerume, Ruggine, Fusicocco e Citospora alla dose di lt. 1,6-2 per ha e per applicazione. Sono consentite quattro applicazioni massivo all'anno. Cocomero-melone-cetriolo: contro Antracnosi, Peronospora, Vaiolettura, Alternariosi, Cladosporiosi, Botrite e Rizoctonia alla dose di lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite tre applicazioni massivo all'anno sia in campo che in serra. Pomonodoro: contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Botrite, Septoriosi, Rizoctonia e Sclerotinia alla dose di lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di tre applicazioni all'anno in campo e cinque applicazioni all'anno in serra. Patata: contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Septoriosi, Rizoctonia alla dose di lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di due applicazioni all'anno. Colture floreali ed ornamentali: contro l'icchiolatura, Oidio, Botrite, Ruggine, Antracnosi, Septoriosi, Alternariosi alla dose di ml. 200-250 per ettolitro. Sedano: contro Septoria, Cercospora e Sclerotinia alla dose di lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di tre applicazioni all'anno sia in campo che in serra. Fagiolo-Fagiolino-Pisello: contro Peronospora, Alternaria e Ruggine alla dose di lt. 2-2,4 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di due applicazioni all'anno in pieno campo. Cipolla: contro Alternaria, Botrite e Peronospora alla dose di lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di due applicazioni all'anno in pieno campo. Intervenire preventivamente secondo i normali calendari dei trattamenti. Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti con pompe a volume normale. Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose prescelta in poca acqua a parte e versare poi la miscela ottenuta nel totale quantitativo di acqua, agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea. Tempi di rientro: 12 ore dopo l'impiego in campo e 24 ore dopo l'impiego in serra.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile, ad eccezione di quelli a reazione alcalina quali Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, Calce. La miscela con liquidi emulsionabili è sconsigliata nei casi in cui la compatibilità sia accertata preventivamente. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. **FITOTOSSICITA':** il prodotto può provocare rugginosità su alcune varietà di melo a buccia gialla e rossa (Golden). Su colture floreali ed ornamentali prima di trattare eseguire saggi preliminari. Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di sedano, pomodoro, cocomero, melone, cetriolo, fagiolo, fagiolino, pisello, cipolla e patata; e 21 giorni prima della raccolta di melo, pero, pesca e susino. Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

"Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente."

Taglie delle confezioni

litri 0,1/0,2/0,265/0,5/1/5/10/20

L U R O N T I L

Diserbante selettivo per cereali

LURONTIL

COMPOSIZIONE

- Trifluralin puro g. 23,2 (= 240 g/l)
- Linuron puro g. 11,6 (= 120 g/l)
- Coformulanti q.b. a g.100
(contiene xilene)

FRASI DI RIECITO

Infiammabile - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle -

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle -

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

registrazione n.4753 del 10/05/82 del Ministero della Sanità


Stabilimento di produzione :

S C A M srl Via Bellaria 164, - Modena -

litri

Partita n°.....

CLASSE II



NOCIVO

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua -
AVVERTENZE: nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: LINURON 11,6%; TRIFLURALIN 23,2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

LINURON - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed esaturia.

TRIFLURALIN - ==

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO: il LURONTIL è un diserbante selettivo che controlla mono e dicotiledoni in colture cerealicole (frumento, orzo e segale) a semina autunno-invernale. I due p.a., componenti il prodotto, agiscono sia per assorbimento radicale interferendo nei processi fotosintetici, sia impedendo la germinazione dei semi infestanti ed inibendone lo sviluppo radicale. Il LURONTIL controlla le seguenti erbe infestanti mono e dicotiledoni: Agrostis, Alopecurus, Alchemilla, Atriplex, Anagallis, Chenopodium, Cerastium, Capsella, Lolium, Lanius, Matricaria, Myosotis, Foa, Papavero, Polygonum sp., Raphanus, Spergula, Stellaria, Sinapis, Sonchus, Thlaspi, Veronica. Sono inoltre parzialmente controllate l'Avena sp., Galium aparine, Viola, Funaria. Il LURONTIL deve essere impiegato in fase di pre-emergenza della coltura alla dose di lt. 3-3,700 ha, impiegando la dose più alta in previsione di forti infestazioni di graminacee, si consigliamo 300-400 lt. di acqua per ettaro. Il LURONTIL non deve essere interrato, è efficace sia con bassa che alta umidità del terreno e non è consigliabile impiegarlo in terreni ricchi di sostanza organica; nel caso fosse necessaria una risemina non va effettuata prima di 5 mesi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il LURONTIL deve essere impiegato da solo.

ISTRUZIONI SPECIALI: qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin in miscela con Linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocovero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

"Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente"

Taglie delle confezioni
litri 1/5

Stabilimenti di produzione autorizzati
SCAM srl - Modena
SILIA Spa - Aprilia (LT)
DIACHEM Spa - Albano S. Alessandro (BG)

PROPILAN**Diserbante selettivo pre-emergenza liquido emulsionabile****PROPILAN****COMPOSIZIONE**

- Trifluralin puro g. 23,75 (= 245 g/l)
- Linuron puro g. 12,61 (= 130 g/l)
- Coformulanti q.b. a g.100
(contiene xilene e cicloesano)


FRASI DI RISCHIO: Infiammabile - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Non respirare i vapori.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
registrazione n.5382 del 30/5/83 del Ministero della Sanità
Stabilimento di produzione: SCAM srl - Modena

S C A M srl Via Bellaria 164, - Modena -

litri
Partita n°.....

CLASSE II**NOCIVO**

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
AVVERTENZE: nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, depositi mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: LINURON 12,61%; TRIFLURALIN 23,75%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

LINURON - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

TRIFLURALIN - "s". Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveneni.

MODALITA' D'IMPIEGO: Il PROPILAN e' un diserbante da distribuire dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura; fra le graminacee annuali controlla Alopecurus myosuroides, Alopecurus agrestis, Alopecurus pratensis, Poa annua, Apera spica-venti, Briza minor, Lolium multiflorum, Phalaris arundinacea. Fra le dicotiledoni annuali controlla: Papaver rhoeas, Veronica spp., Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Funaria officinalis, Cerastium arvense, Stellaria media, Laminium amplexicaule, L. arvensis purpurea, Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Myosotis arvensis, Polygonum aviculare, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sonchus asper, Senecio spp., Thlaspi arvense, Valerianella aurifolia, Ranunculus spp. Il PROPILAN non controlla: Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Agropyron repens, Cirsium spp., Tussilago farfara.

Colture protette: frumento tenero e duro, a semina invernale, Orzo a semina invernale, Carota.

Epoca d'impiego: Il PROPILAN deve essere usato dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura da trattare.

Preparazione del terreno: i migliori risultati si ottengono su un terreno ben lavorato, livellato e sanuzato, con la buona copertura dei semi in modo da favorire una uniforme germinazione. Modalità di distribuzione: Il PROPILAN deve essere distribuito per irrorazione e non deve essere incorporato nel terreno. Istruzioni speciali: In caso di ricoltivazione occorre attendere almeno 5 mesi dall'applicazione del PROPILAN per poter seminare cereali a semina invernale o primaverile, mais e altre colture di graminacee e colza. Non seminare barbabietole nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. Il PROPILAN non deve essere usato nei terreni con contenuto di sostanza organica superiore all'8%. Dosaggi: litri 2,800-3,500 per Ha, secondo i tipi di terreno. Applicare il PROPILAN in 400-800 lt.d'acqua per ettaro; il PROPILAN deve essere aggiunto nella botte dell'irroratore quando e' piena per metà di acqua e agitato bene durante il completamento del carico. Preparare la miscela quando si prevede di poter intervenire subito dopo. E' possibile usare attrezzature irroranti a bassa pressione (4,5-5 Atm) provviste di barra ed ugelli per diserbanti e munite di strumenti che assicurano una buona agitazione durante la distribuzione. Si raccomanda di montare una valvola di chiusura efficiente in modo da evitare l'eccessiva fuoriuscita del PROPILAN nelle fasi di partenza. Occorre calibrare gli spruzzatori prima di iniziare la distribuzione e controllare spesso che avvenga una uniforme distribuzione. Effettuata la distribuzione, lavare accuratamente con acqua e soda e risciacquare bene tutti i recipienti e gli strumenti agricoli usati per la diluizione e l'impiego del prodotto. Se possibile usare una pompa esclusivamente per il diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': non consigliate miscele con altri prodotti antiparassitari.

AVVERTENZA: conservare il prodotto in locali a temperatura superiore ai 5°C lontano da sorgenti di calore e fiamme.

Intervallo: sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per frumento e orzo e 60 giorni per la carota.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

"Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente"

Taglie delle confezioni

litri 0,4/0,2/0,25/0,50/1/5/10/20

UREON -FL

Diserbante selettivo in pasta fluida

UREON-FL**COMPOSIZIONE**

- Linuron puro g. 36 (= 420 g/l)
- Coformulanti q.b. a g.100

CLASSE III

Attenzione manipolare con prudenza


FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di incidente o di malesse consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
registrazione n.1450 del 30/3/74 del Ministero della Sanità
Stabilimento di produzione : SCAM srl - Modena

S C A M srl Via Bellaria 164, - Modena -

Litri
Partita n°.....

**IRRITANTE****NORME PRECAUZIONALI:** non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Derivato dell'urea. Sintomi durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed esanturia.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO: per una buona riuscita del trattamento è fondamentale che il terreno sia ben sminuzzato, livellato e con riserve idriche notevoli. Nel caso non dovesse essere abbastanza umido, occorre irrigare in modo tale da favorire l'azione diserbante del prodotto. Dopo il trattamento non si eseguono lavorazioni al terreno. Nei terreni sabbiosi e poveri di sostanza organica e nei terreni torbosi si sconsiglia il diserbio in pre-emergenza. E' efficace contro le seguenti infestanti: Stivone, Sefaria, Erba Porcellana, Camomilla, Veronica, Senape, Mercuriella, Galinsoga, Coda di volpe, Borsa di pastore, Mirella, Erba paperino, Piantaggine, Falso Corovolo, Euforbiacee. Il trattamento viene eseguito con un getto sottile e uniforme, usando le normali pompe irroratrici a sadio ed alto volume di acqua. Mais: Pre-emergenza, subito dopo la semina e dopo 2 o 3 giorni al massimo in dosi di litri 1,150 nei terreni di sadio impasto ed in miscela con altri prodotti, litri 1,400 nei terreni torbosi e argillosi, per Ha in 400-500 litri d'acqua. Carote: Pre-emergenza litri 2,350 per Ha in 400-500 litri acqua, post-emergenza litri 1,400 per Ha in 400-600 litri acqua, quando le carote hanno le foglie vere (a 1 mese dalla nascita). Sedano: 8-10 gg. dal trapianto in pieno campo litri 1,400-2,300 per Ha in 400-600 litri acqua. Finocchio: Post-emergenza dopo la 4' foglia vera litri 0,450-1,175 per Ha in 400-600 litri acqua. Soia: In pre-emergenza alla dose di litri 0,700-1,150 in miscela con prodotti a base di Alaclor o altri principi attivi autorizzati.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITA':** è generalmente miscibile con i principali diserbanti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE: nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo spaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCCIVITA': non ammettere pollai e bestiame nel campo trattato prima di 60 giorni, è velenoso per i pesci, evitare di contaminare i corsi d'acqua.

Intervallo: osservare un intervallo di 60 giorni dall'ultimo trattamento all'immissione al consumo.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.


DA NON VENDERSI SFUSO**"Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente"**

Tablle delle confezioni:
Litri 0,5/1/5/10

Ditta: SCHERING***Principio attivo:*****AMITRAZ****CLOROTALONIL****LINURON*****Presidio sanitario:*****ACATRAZ
BUMETTRAN
MITAC 20 CE****CURIT N
CURIT NIL 44 DF
EFFICAN N DF****FRUMIXAL**

Acatraz

Acaricida-Insetticida in formulazione liquido emulsionabile, attivo anche su Afidi, Psille, Cocciniglie, Cicaline ed altri insetti

CLASSE II	ACATRAZ Composizione: Amitraz puro 20,5% (190 g/l) contiene: xilene
	SCHERING Agricoltura Sede legale: Via Manzoni, 11 - 20131 Milano Divisione ed uffici: Schiavoni e Farmaceutici Schering S.p.A. - Via Marconi 16 Registrazione del Ministero della Sanità n. 6791 del 1-10-1988
NOCIVO	

R 10 Infiammabile.
R 20/22 Nocivo per inalazione ed ingestione.
R 36 Irritante per la pelle.
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
S 23 Non respirare i vapori.
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO litri

Per il numero di riferimento della partita vedi

Norme precauzionali

- S 7** Conservare il recipiente ben chiuso
 - Non operare contro vento
 - S 28** In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in appositi recipienti possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua o su altre colture.
- Informazioni per il medico.
- Sintomi irritanti per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, ipercidabilità, ipertensione, bradicardia, ipotermia. Possibile iperglicemia.
- Terapia: sintomatica, monitoraggio cardiorespiratorio per il rischio della bradicardia.
- Consultare un centro antiveleni.
- Modalità e campi di impiego
- L'ACATRAZ è un acaricida ad azione citotopica che agisce contro tutti gli stadi del Ragno rosso, ma principalmente contro le uova estive e le neanidi. Controlla gli acari che infestano le seguenti colture alle sottostituite dosi:
- Melo: litri 2,5-3,5 per ettaro, con massimo due trattamenti.
Pera: litri 3-4,5 per ettaro, con massimo due trattamenti.
Drupeggio: litri 3 per ettaro, con massimo due trattamenti.
Agrumi: litri 2-3 per ettaro, con massimo due trattamenti.
Vite: litri 2,5 per ettaro, con massimo un trattamento.
Cucurbitacee: litri 2-2,5 per ettaro, con massimo un trattamento.
Melanzana: litri 2-2,5 per ettaro, con massimo un trattamento.
Fioralisi ed ornamentali: litri 2-2,5 per ettaro.
- Fra gli insetti controlla la Psilla (Psilla del Pero) e, come azione di contenimento, anche Afidi, Cicaline, Cocciniglie (Saissetia Chiese) e le larve di alcune specie di lepidotteri (Cydia pomonella, Spodoptera exiguus).
- Contro il Ragno Rosso del pero e del melo sono necessari, di norma, due trattamenti per stagione, intervenendo alla schiusura delle uova invernali, oppure più tardi. Si consiglia di effettuare il trattamento alla comparsa degli Acari; se necessario ripetere il trattamento dopo 3 settimane circa. Aggiungere alla miscela 50 grammi di bagnante antischiuma per aumentare l'efficacia del trattamento.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

- Rieschi di nocività
- Il prodotto è tossico per i pesci e per gli insetti utili
- Intervallo di sicurezza
- Sospensione i trattamenti 28 giorni prima del raccolto su melo, pero, drupacee, cucurbitacee, melanzana e 35 giorni su agrumi e vite.
- Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è peccoloso.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non vendersi sfuso

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Numero di partita _____
Data di produzione _____

DA NON APPLICARE CON MEZZA AERIE

- Compatibilità il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari a reazione neutra.
- Avvertenza in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
- Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,5 - 1,5 - 10 - 20 litri

Altre officine di produzione autorizzate:
Schering Agrochemicals Ltd., Hauxton, Cambridge (Inghilterra)

Bumetran®

Acaricida - Insetticida in formulazione EC

CLASSE II	
NOCIVO	

Bumetran
Composizione:
Amitraz puro 21,6% (200 g/l)
contiene: xilene

SCHERING
Agricoltura

Scalo logico:
Via Mantovani, 11 - 20131 Milano
Direzione ed uffici:
20090 Segrate MI - Via E. Schering
Officina di produzione:
SCHERING SPA - Nova Milanese MI
Rappresentanza italiana:
S.M.I. S.p.A. - Milano tel. 4-1977

Distribuito da:
De Pini Opini, SpA
Via Piave, 2 - 38100 Bozzano

R 10 Infiammabile.
R 20/22 Nocivo per inalazione ed ingestione.
R 36 Irritante per la pelle.
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
S 23 Non respirare i vapori.
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S 44 In caso di infortunio consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RUTILIZZATO

CONTENUTO litri

Per il numero di riferimento della partita vedi

Norme precauzionali
S 7 Conservare il recipiente ben chiuso
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Non operare contro vento.
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
Preparare la miscela in appositi recipienti possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, mangimi.
Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua o su altre colture.

Informazioni per il medico.
Sintomi: irritazione per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, ipercidabilità, ipertensione, bradicardia, ipotermia. Possibile ipomagnesemia.
Terapia: sintomatica, monitoraggio cardiorespiratorio per il rischio della bradicardia.
Consultare un centro antiveleni.
Caratteristiche e modalità d'impiego.
Bumetran è un acaricida-insetticida dotato di persistenza, che agisce per contatto e alligato.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in commercio.

Avvertenze:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rieschi di acrobazia:

Il prodotto è tossico per i pesci e per gli insetti utili.
Sospensionare i trattamenti 28 giorni prima del raccolto su mele, pere, drupacee, cucurbitacee, melanzane e 35 giorni su agrumi e vite.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

COLTURA	ACARI ED INSETTI CONTROLLATI	DOSI DI FORMULATO INDICATE Per unità di superficie (litri/ha)	N. MASSIMO DI INTERVENTI PER STAGIONE
Melo	Regno Rosso (P. ulmi) e Nematodi di Cocciniglia (Quadripedibus p.)	2,5-3,5	2
Pera	Pelle, Acari (P. ulmi)	3-4,5	2
Drupacee (Pera, Susino, Albicocco, Ciliegia)	Acari parassiti	3	2
Agrumi	Acari (T. urticae, P. citri), Cocciniglia	2-3	2
Vite	Acari e Cocciniglia	max. 2,5	1
Cucurbitacee e Melanzana	Acari (T. urticae)	2-2,5	1
Florali ed Ornamentali	Acari (T. urticae)	2-2,5	-

* Marchio registrato della Schering S.p.A.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREO

Il prodotto combatte tutti gli acari del Regno rosso (Acari Tetranychidi); i migliori risultati si ottengono intervenendo nelle fasi iniziali dell'intossicazione, ossia in presenza di poche forme mobili per foglia. Se necessario, e qualora la coltura consenta più di un intervento per stagione, ripetere l'applicazione dopo 3 settimane o alla prima reintossicazione. Bumetran può essere impiegato sia con attrezzature operanti a volume normale, sia con atomizzatori eroganti volumi ridotti di soluzione per unità di superficie, purché si rispetti sempre la quantità di formulato per ettaro.

Da non venderci abuso

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

Numero di partita _____
Data di produzione _____

Taglie autorizzate: 500 ml - 1 l

**Altre officine di produzione autorizzate:
Schering Agrochemicals Ltd., Hauxton, Cambridge (Inghilterra)**

Mitac 20 CE

Acaricida - Insetticida in formulazione concentrato emulsionabile, a lunga persistenza.

CLASSE II	Mitac 20 CE Composizione: Amirbaz puro 20,5% (190 g/l) contorno: xilene
	SCHERING Agricoltura Sede legale: Via Mecenate, 11 - 20131 Milano Direzione ed uffici: 20090 Sagrate MI - Via E. Schering Officina di produzione: Schering S.p.A. - Nova Milanese MI Rappresentazione del Ministero della Sanità n. 5473 del 3-10-1983 Distribuito da: CSA-GEIGY Divisione Agricoltura 21047 Sesto VA - C.P. 86
NOGIVO	

R 10 Infiammabile.
R 20/22 Nocivo per inalazione ed ingestione.
R 36 Irritante per la pelle.
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
S 23 Non respirare i vapori.
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO litri

Per il numero di riferimento della partita vedi

Norme precauzionali

- § 7 Conservare il recipiente ben chiuso
 - Non operare contro vento
 - § 25 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
- Nelle preparazioni della miscela tenersi di guanti e di fessie del viso.
- Preparare la miscela in appositi recipienti, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli abitati ed altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua o su altre colture.

Informazioni per il medico

Stazioni: irritante per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, ipercidabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile ipoglicemia.

Terapia: sintomatica, monitoraggio cardiocircolatorio per il rischio della bradicardia.

Consultare un centro antivenerei.

Caratteristiche e modalità d'impiego.

Mitac 20 CE è un acaricida-insetticida dotato di persistenza, che agisce per contatto, asfissia e penetrazione nei tessuti vegetali.

Compatibilità: il prodotto è ristabile con i più comuni antiparassitari in commercio.

Avvertenze: in caso di miscela con altri trattamenti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Ciò che si verificano casi di intossicazione telefonare il medico della microscopia comparata.

Risultati di efficacia

Il prodotto è testato per i pectici e per gli insetti utili.

Intervallo di sicurezza

Sequenziare i trattamenti 20 giorni prima dell'impiego su mele, pere, fragole, arance, meloni, zucchine e fagioli da agrumi e viti.

Attenzione da impiegare esclusivamente in individui nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è vietato.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle procedure descritte è obbligatorio essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

COLTURA	ACARI ED INSETTI CONTROLLATI	DOSE DI FORMULATO INDICATE Per unità d'espandibile (litri/ha)	N. MASSIMO DI INTERVENTI PER STAGIONE
Melo	P. ulmi, T. urticae, Afidi (A. pomi)	2,5-3,5	2
Pera	P. ulmi, T. urticae, Psillo	3-4,5	2
Drupacee (Pescio, Susino, Albicocco, Ciliegio)	P. ulmi, T. urticae, Afidi (Myzus.p.)	3	2
Agrumi	Acari (T. urticae, P. citri), neanidi di Cocciniglia	2-3	2
Vite	P. ulmi, T. urticae, Cicaline	max 2,5	1
Cucurbitacee e Melanzana	T. urticae	2-2,5	1
Florali ed Ornamentali	T. urticae	2-2,5	-

Il prodotto combinate tutti gli stadi del Ragno rosso (Acari Tetranychidi) i migliori risultati si ottengono intervenendo nelle fasi iniziali dell'infestazione, ossia in presenza di poche femmine adulte per foglia. Se necessario, e qualora la coltura consente più di un intervento per stagione, ripetere l'applicazione dopo 3 settimane o alla prima infestazione. Per colture in serra o nelle applicazioni precoci con clima relativamente freddo impiegare la dose di 250 ml di prodotto per ettaro di acqua.

Mitac 20 CE può essere impiegato sia con attrezzature operanti a volume normale, sia con atomizzatori eroganti volumi ridotti di soluzione per unità di superficie, purché si rispetti sempre la quantità di formulato per ettaro.

* Registro registrato alla Schering Agrochemicals Ltd. (Hebden, Cambridge (Inghilterra)).

Da non vendersi sfuso

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Numero di partita _____

Data di produzione _____


DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Taglie autorizzate: 1 - 5 litri

Altre officine di produzione autorizzate:
Schering Agrochemicals Ltd., Hauxton, Cambridge (Inghilterra)

Curit® N

Antiperonosporico in sospensione concentrata per la difesa del pomodoro, della patata, delle colture floricole ed ornamentali.

CLASSE II	Curit N Composizione: 4% (45,2 g/l) Clorotaloni puro 26% (316,4 g/l) contiene: glicol etilico
	SCHERING Agricoltura Sede legale: Via Mecenate, 11 - 20131 Milano Direzione ed. ufficio: 20080 Sagrate MI - Via E. Schering Officina di produzione: SCHERING S.p.A. - Nova Milanese MI Preparazione del Ministero della Sanità n. 4379 del 26-9-1981
NOCIVO	

R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
R 40 Possibilità di effetti irreversibili.
S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
S 30/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO litri

Per il numero di riferimento della partita vedi

Avvertenze

- Nella preparazione della miscela munersi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.
- Non contaminare altre colture e i corsi d'acqua.

Informazioni per il medico

Treatifici di associazione delle seguenti sostanze attive: cimaxoni 4%; clorotaloni 26%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CIMOXANIL (derivato dell'urea): durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'impiego può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitaneamente ed ematuroi. CLOROTALONI: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atessia.

Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche

Curit N è un fungicida liquido efficace contro la peronospora del pomodoro, della patata e delle colture floricole ed ornamentali. Esplica inoltre una importante azione nei confronti della Botrytis cinerea (Muffa grigia) e di altri patogeni di dette colture.

Curit N non solo agisce per contatto sulle zoospore germigianti ma è anche in grado di penetrare nei tessuti vegetali e di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo. Curit N può essere impiegato in calendario antiperonosporico eseguendo il seguente numero massimo di applicazioni:

- Pomodoro: 3 in pieno campo, 5 in serra.
- Patata: 2 in pieno campo.

Modalità e dosi d'impiego

Pomodoro, patata, colture floricole ed ornamentali: contro la peronospora impiegare 2,5-3 litri di formulato per ettaro; iniziare le applicazioni quando le colture hanno raggiunto lo stadio vegetativo di maggiore suscettibilità alla malattia e proseguire secondo il programma consentito. Il prodotto è inoltre attivo contro muffa grigia, ruggine, alternaria, septoria, cladosporiosi ed antracnosi.

Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a

volume normale il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare uniformemente tutta la vegetazione, evitando lo sgocciolamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il Curit N è compatibile con tutti gli antipe-rissitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione a prodotti con reazione alcalina ed oli minerali.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

Rispettare i seguenti tempi di rientro nell'apprezzamento trattato: 12 ore in pieno campo, 24 ore in serra.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

* Sostanza protetta dalla E.I. Du Pont de Nemours & C. (Inc.) Wilmington, Delaware, U.S.A.

Da non vendersi sfuso

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Numero di partita _____

Data di produzione _____

Altre officine di produzione autorizzate:
Schering Agrochemicals Ltd, Hauton, Cambridge, (Inghilterra)
Du Pont de Nemours S.A. (France), Cernay (F)
Rhône-Poulenc, Paganica (L'Aquila)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 litri

Curit Nil 44 DF

Antiperonosporico in granuli
idrodispersibili per la difesa del
pomodoro e della patata.

CLASSE II	Curit Nil 44 DF Composizione: Cimoxanil puro 4% Clorotalonil puro 40%
	SCHERING Agricoltura Sede legale: Via Mecenate, 11 - 20131 Milano Direzione ed ufficio: 20090 Segrate MI - Via E. Schering Ufficio di produzione: Du Pont de Nemours S.A., Cernay (Francia) Registrazione del Ministero della Sanità n. 3058 del 16-10-1980
NOCIVO	

R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
R 40 Possibilità di effetti irreversibili.
S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
S 22 Non respirare le polveri.
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO kg

Per il numero di riferimento della partita vedi

Avvertenze
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Non contaminare altre colture e i corsi d'acqua.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: cimoxanil 4%, clorotalonil 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL (derivato dell'urea): durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitolo ed ematuro.
CLOROTALONIL: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed albuminuria.

Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni
Caratteristiche
Curit Nil 44 DF è un fungicida in microgranuli dispersibili in acqua efficace contro la peronospora del pomodoro e della patata. Esplica inoltre una importante azione collaterale nei confronti della Botrytis cinerea (Muffa grigia) e controlla altre malattie quali Alternaria, Septoria, Antracnosi, Clado-sporiosi e Ruggine.
Curit Nil 44 DF non solo agisce per contatto sulle zoospore germinanti ma è anche in grado di penetrare nei tessuti vegetali e di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

Preparazione della poltiglia
Formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Modalità e dosi d'impiego
Peronospora del pomodoro e della patata: impiegare 250-300 g di prodotto per ettometro d'acqua (non superare i 2,5-3 kg/ha). Iniziare i trattamenti preventivi non appena le colture hanno raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche, o vi è comparsa di altre malattie e

proseguire per il resto della stagione, eseguendo il seguente numero massimo di applicazioni:
- pomodoro: 3 in pieno campo, 5 in serra;
- patata: 2 in pieno campo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità il Curit Nil 44 DF è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida.
Si consiglia di usarlo in associazione a prodotti con reazione alcalina ed oli minerali.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

Rispettare i seguenti tempi di rientro nell'appezzamento trattato: 12 ore in pieno campo, 24 ore in serra.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle precedenti istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

© Schering altro prodotto della E. I. Du Pont de Nemours & C. (Inc.) Wilmington, Delaware U.S.A.

Da non vendersi sfuso

Numero di partita _____

Data di produzione _____

Altre officine di produzione autorizzate:

Schering AG - Wolfenbüttel (Rep. Fed. di Germania)
Schering S.p.A. - Nova Milanese MI (solo confezionamento)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 kg

Effican N DF

Antiperonosporico in granuli idrodispersibili per la difesa della patata e del pomodoro

CLASSE II	Effican N DF Composizione: Cincoxanil puro 4% Clorotaloni puro 25% Fiamme metalio 8% (sotto forma di ossicloruro)
	SCHERING Agricoltura Sede legale: Via Mecenate, 11 - 20131 Milano Direzione ed ufficio: 20090 Segrate MI - Via E. Schering Officina di produzione: Du Pont de Nemours S.A., Cornay (Francia) Registrazione del Ministero della Sanità n. 4369 del 1-10-1981
NOCIVO	<p>Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.</p> <p>R 21/22 Irritante per gli occhi.</p> <p>R 36 Possibilità di effetti irreversibili.</p> <p>R 40 Possibilità di effetti irreversibili.</p> <p>S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.</p> <p>S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.</p> <p>S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.</p> <p>S 22 Non respirare le polveri.</p> <p>S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.</p> <p>S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.</p> <p>S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.</p> <p>S 34/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.</p> <p>S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).</p>
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO	
CONTENUTO kg	
Per il numero di riferimento della partita vedi <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

Avvertenze
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.
Non contaminare altre colture e i corsi d'acqua.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive cinnoxanil 4%, clorotaloni 25%, rame metalio 8%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di tossicazione.
CINCOXANIL (derivato dell'urea): durante l'impiego può causare re congiuntivite, irrita nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono casi subitanei ed ematuria.
CLOROTALONIL: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed ittiassia.
RAMME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, litero ematico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapie: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
Effican N DF è un fungicida in microgranuli dispersibili in acqua efficace contro la peronospora della patata e del pomodoro. Esplica inoltre una importante azione collaterale nei confronti della Botrytis cinerea (Muffa grigia) e contro altre malattie quali Alternaria, Antracnosi, Septoria, Cladosporiosi e Ruggine. Grazie ai suoi componenti, non solo agisce per contatto sulle zoospore germinanti ma è anche in grado di penetrare nei tessuti vegetali e di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo. Per il basso contenuto in rame attivo può essere impiegato nel calendario antiperonosporico fin dai primi trattamenti in quanto non produce rallentamenti vegetativi, eseguendo il seguente numero massimo di applicazioni:
- pomodoro: 3 in pieno campo, 5 in serra;
- patata: 2 in pieno campo.

Modalità e dosi d'impiego
Contro la peronospora (Phytophthora infestans): impiegare 200-250 g di prodotto per ettaro d'acqua irrorando con pompe a volume normale. Se si applica con atomizzatori è necessario aumentare proporzionalmente la concentrazione della soluzione in modo da distribuire la medesima quantità di prodotto per ettaro (non oltre i 2-3 kg/ha).
Iniziere i trattamenti quando le colture hanno raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il periodo di infestazione peronosporiche o

di altre malattie e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo, secondo il numero di trattamenti consentito per ciascuna coltura.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e poi portare a volume agitando l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità Effican N DF è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di usare il prodotto in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.

Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere ripetuto il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Rispettare i seguenti tempi di rientro nell'appezzamento trattato 12 ore in pieno campo, 24 ore in serra.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. In rispetto della predefinita sanzione e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

* Sostanza attiva prodotta dalla E.I. Du Pont de Nemours & C. (Inc.) Wilmington Delaware U.S.A.

Da non venderci sfuso

Numero di partita _____

Data di produzione _____

Altre officine di produzione autorizzate:

Schering AG - Wolfenbüttel (Rep. Fed. di Germania)
Schering S.p.A. - Nova Milanese MI (solo confezionamento)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 kg

Frumixal

Erbicida selettivo per il frumento, orzo e segale in formulazione concentrato emulsionabile

CLASSE II	FRUMIXAL Composizione: Trifluralin puro 23,5% (241 g/l) Linuron puro 11,7% (120 g/l) contiene: xilene
	SCHERING Agricoltura Sede legale Via Manzoni, 11 - 20131 Milano Divisione ed. fiti. - Via E. Schenung 20090 Segrate MI - Via E. Schenung Città di produzione SCHERING S.p.A. - Nova Milanese MI Registrazione del Ministero della Sanità n. 4889 del 4-9-1982
NOCIVO	

R 10 Infiammabile.
R 20/21 Nocivo per inalazione e per contatto con la pelle.
R 36 Irritante per la pelle.
S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
S 23 Non respirare i vapori
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 37 Usare guanti adatti
S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrarli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO litri

Per il numero di rifornimento della partita vedi

Norme precauzionali

- S 7** Conservare il recipiente ben chiuso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture e i corsi d'acqua.
- S 28** In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

Informazioni per il medico.
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: trifluralin 23,5%; linuron 11,7%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.

LINURON (derivato dell'urea): durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitlerio ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche del prodotto

Il Frumixal è una miscela erbicida già pronta per l'uso appositamente studiata per esercitare il controllo di un maggior numero di specie infestanti. Praticamente è in grado di controllare tutte le principali infestanti annuali sia graminacee che dicotiledoni; sono resistenti a questo prodotto solo le Avene e le erbe perennanti quali Cirsium spp., Tussilago farfara.

Dosi ed epoche d'impiego

– Frumento tenero e duro di semina autunnale e cereali minori quali orzo e segale: 3-3.5 l/ha da applicare in pre-emergenza.

Il Frumixal non deve essere incorporato nel terreno perché in condizioni di temperature relativamente basse, quali quelle autunno-vernane, la sua volatilità è quasi nulla. Per ottenere i migliori risultati nel diserbo dei cereali di semina autunnale si consiglia di:

- Trattare subito dopo la semina su terreno ben preparato, livellato e rullato, preferibilmente dotato di sufficiente umidità;
- Evitare di trattare se i semi non sono bene interrati alla

giusta profondità. In tal caso è necessario effettuare preventivamente una rullatura;
– Non trattare quando la coltura sia emergendo dal terreno;

- Su terreni sabbiosi utilizzare le dosi più basse;
- Distribuire il prodotto con un volume d'acqua di 500-800 l/ha, in modo uniforme, cercando di evitare le sovrapposizioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità - Essendo un prodotto già completo non sono raccomandate miscele con altri erbicidi.

Istruzioni speciali Qualora fosse necessaria una ricoltivazione devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin in miscela con Linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio.

Non seminare bietola (da zuccheri), da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva alla applicazione del prodotto.

La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Fitotossicità - In taluni casi può essere fitotossico per le Avene coltivate per cui si sconsiglia di effettuare il diserbo di tali colture con Frumixal.

Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non venderli sfuso

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Numero di partita _____

Data di produzione _____

Altre officine di produzione autorizzate:

Taglie autorizzate: 1-5 litri

Ditta: S E P R A N

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:

DITRAN
LINURON FL SEPRAN

DITRAN

DISERBANTE SELETTIVO DEL MAIS

DITRAN - Composizione:

Linuron puro	gr. 18,8	(gr. 222/l)
Atrazina pura (comprese le triazine attive)	gr. 31,5	(gr. 365/l)
Coformulanti	q.b. a	gr. 100

SEPRAN s.r.l. - AGROCHIMICI


Via fossanigo - Z.I. sud. ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE:

Reg. n. 5306 del 16.3.1983 del Ministero della Sanità

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

Contenuto: lt. PARTITA N.

CLASSE II**NOCIVO****NOCIVO PER INALAZIONE E INGESTIONE. IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.**

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Linuron 18,8% e Atrazina 31,5%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:**Linuron** - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Atrazina** - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti. Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renali acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.**Terapia:** sintomatica. **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.****NORME PRECAUZIONALI** - Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. **AVVERTENZE** - Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in appositi recipienti, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, depositi mangimi. Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il principio attivo non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE****MODALITA' D'IMPIEGO:** diserbante del mais da impiegarsi alla semina per il controllo anche delle infestanti resistenti all'Atrazina quali Setaria, Digitaria, Echinochloa e Panicum. Trova una utile applicazione nei terreni di medio impasto e argillosi con l'avvertenza di assicurare una buona copertura del seme. Agisce per via radicale e fogliare ed è consigliabile alla dose di lt. 1,8 per ettaro (la dose più bassa si riferisce all'uso nei terreni sciolti). **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI!****COMPATIBILITA':** il prodotto è miscibile con i fenossiderivati. Non è compatibile con gli oli minerali bianchi.**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**FITOTOSSICITA':** il prodotto è fitotossico per tutte le colture non indicate nell'etichetta. Si consigliano prove parcellari per le varietà sensibili o di recente acclimatazione. Dal trattamento erbicide alla semina di colture sensibili successive al mais occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es.: bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.**NOCIVITA':** il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.**ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in agricoltura e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: lt. 1 - 5

Officine di produzione: DIACHEM S.P.A. - Albano S. Alessandro (BG)

TERRANALISI - Renazzo di Cento (FE)

LINURON FL - SEPRAN

DISERBANTE SELETTIVO - SOSPENSIONE CONCENTRATA


LINURON FL - SEPRAN - Composizione:		
Linuron puro	gr. 36	(gr. 432/l)
Coformulanti	q.b. e	gr. 100

SEPRAN S.r.l. - AGROCHIMICA
Via Fossanigo - Z.I. sud. ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE:

Reg. n. 3547 del 14.3.1980 del Ministero della Sanità
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
Contenuto: lt. PARTITA N.

CLASSE III



IRRITANTE

IRRITANTE PER GLI OCCHI E LE VIE RESPIRATORIE.

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Derivato dell'Urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica. **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**
NORME PRECAUZIONALI - Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MODALITA' D'IMPIEGO: Il LINURON FL - SEPRAN è un diserbante che agisce prevalentemente per via radicale oltre che per via fogliare. Non combatte le erbe perennanti ad apparato radicale bulboso e rizomatoso. È indicato per il controllo di erbe dicotiledoni e monocotiledoni annuali quali Alopecurus, Amaranthus, Capsella, Chenopodium, Digitaria, Echilochloa, Galinsoga, Lolium, Matricaria, Mercurialis, Papavero, Poa, Polygonum; Portulacacee, Rafano, Ranunculus, Sinapis, Setaria, Solarum, Sonchus, Stellaria, Urtica, Veronica, ecc.
CAROTA: lt. 0,8 per ettaro e per applicazione in 300-500 litri di acqua. Effettuare i trattamenti prima della germinazione del seme (quando il seme è ben coperto dal terreno) e in post-emergenza della coltura quando le carote hanno differenziato il secondo palco fogliare (4 foglie vere).
FINOCCHIO: lt. 0,4 per ettaro e per applicazione in 300-400 litri di acqua in postemergenza della coltura (4 foglie vere).
PATATA: lt. 0,8 per ettaro e per applicazione in 300-500 litri di acqua in pre-emergenza della coltura e sempre in miscela con uno dei seguenti diserbanti: monolinuron, fluorocloridone, metazaclor, pendimetalin.
PREZZEMOLO e SEDANO: lt. 0,8 per ettaro e per applicazione in 300-500 litri di acqua. Effettuare i trattamenti in pieno campo, dopo circa 10 giorni dal trapianto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto è generalmente miscibile con altri diserbanti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi. Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il principio attivo non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanze organica inferiore all'1%.

FITOTOSSICITA': è utile fare attenzione e non trattare in prossimità di altre colture ed in zone interessate da radici di altre coltivazioni. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: ml. 10 - 50 - 250 - lt. 1

Officine di produzione: DIACHEM S.P.A. - Albano S. Alessandro (BG)

TERRANALISI - Ronazzo di Canto (FE)

Ditta: S I A P A**Principio attivo:****AMITRAZ****CLOROTALONIL****LINURON****Presidio sanitario:****EDRIMET
EDRIZAR
EDRIZAR COMBI
MEOTRIN ED
SUMIZAR 25 EC****CLOCUR
DIATAB
POLICRITT CL
SIACRIT C
SIACRIT CX
SIACRIT F
SIACRIT FC
SIACRIT SI
SIACRIT TRE
SIALEX C****ERBITOX PATATE
SILTRINUL
SILTRINUL G
SIOLCID
SIOLCID 25**

EDRIMET

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
**INSETTICIDA-ACARICIDA A VASTO SPETTRO DI AZIONE PER LA DIFESA DELLE COLTURE
 ARBOREE, ERBACEE, ORTICOLE, DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEI FIORI**

EDRIMET

Registrazione Ministero della Sanità n. 6422 del 16.05.1985

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Metomil puro	g. 9 (= 90 g/l)
Amitraz puro	g. 9 (= 90 g/l)
Coformulanti*	q.b. a g. 100

* Contiene cicloesano

Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 1 - 5 L

Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

I CLASSE**MOLTO TOSSICO**

Inflammabile. - Altamente tossico per ingestione - Nocivo per inalazione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e faccine filtranti.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

METOMIL 9%**AMITRAZ 9%**

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METOMIL: Sintomi: Inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

AMITRAZ: Sintomi: Irritante per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, ipereccitabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile iperglicemia.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è costituito dall'unione di due principi attivi ad azione complementare e sinergica. Agisce contro tutti gli stadi di sviluppo di acari ed insetti.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Melo: Ragno rosso, Filomminatori (massimo 2 trattamenti/anno) 250-275 ml/ha (5-5,5 l/ha)

Pero: Ragno rosso, Psille (massimo 2 trattamenti/anno) 250-275 ml/ha (5-5,5 l/ha).

Pesce, susino, albicocco: Acari, Cidia e Anarsia, Cocciniglia (massimo 2 trattamenti/anno) 250-275 ml/ha (5-5,5 l/ha).

Vite: Acari, Tignole (massimo 1 trattamento/anno) 300 ml/ha (3 l/ha)

Agrumi: Acari, Aonidiella, Mosca bianca, Cocciniglia (massimo 2 trattamenti/anno) 300 ml/ha (3 l/ha)

Cocomero, melone, cetriolo, zucca, zucchini e melanzana: Acari e mosca bianca (massimo 1 trattamento/anno) 300 ml/ha (3 l/ha).

Fiorali ed ornamentali: 300 ml/ha (3 l/ha)

Ha effetto secondario su Afidi, Cicaline, Cocciniglie, Cydia pomonella, Spodoptera, Plutella maculipennis.

Le dosi si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (20 hl/ha per melo, pero, pesco, susino, albicocco e 10 hl/ha per le altre colture).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITA'**

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari, purché a reazione non fortemente alcalina.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, gli insetti utili, gli animali selvatici e domestici ed il bestiame. Evitare i trattamenti durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto su agrumi e vite, 28 giorni sulle altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

EDRIZAR**(LIQUIDO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA - ACARICIDA PARTICOLARMENTE ATTIVO CONTRO PSILLA ED ACARI****EDRIZAR**


Registrazione Ministero della Sanità n. 2439 del 31.01.1977

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONEAmitraz puro g. 20,5 (= 192 g/l)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* Contiene Xilene e CicloesanonePartita numero:
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,500 - 1 - 5 - 10 L

Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SILIA - Aprilia (Latina)

II CLASSE**NOCIVO****Inflammabile.** - Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. - Irritante per la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture.**Prescrizioni particolari:**

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali ben ariati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, depositi mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, ipercitabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile iperglicemia. Terapia: sintomatica, monitoraggio cardiocircolatorio per il rischio della bradicardia. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

L'EDRIZAR controlla gli acari che infestano le colture, agendo in modo particolare contro le uova estive e le neanidi. L'EDRIZAR è particolarmente attivo contro le uova e gli stadi giovanili della psilla del pero. Il prodotto, dotato di lunga persistenza di azione, agisce per contatto, ingestione ed asfissia e possiede una spiccata azione citotossica.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Melo: Ragno rosso (massimo 2 trattamenti/anno) 125-175 ml/ha (2,5-3,5 l/ha)
Pero: Ragno rosso, Psilla (massimo 2 trattamenti/anno) 150-225 ml/ha (3-4,5 l/ha)
Drupacee (Pesco, susino, albicocco, ciliegio, mandorlo): Acari (massimo 2 trattamenti/anno) 150 ml/ha (3 l/ha)
Vite: Acari (massimo 1 trattamento/anno) 250 ml/ha (2,5 l/ha)
Agrumi: Acari, Aonidiella (massimo 2 trattamenti/anno) 200-300 ml/ha (2-3 l/ha)
Cocomero, melone, cetriolo, zucca, zucchino e melanzana: Acari (massimo 1 trattamento/anno) 200-250 ml/ha (2-2,5 l/ha)
Fiorcelli ed ornamentali: 150-250 ml/ha (1,5-2,5 l/ha) (a dose maggiore va impiegata con clima freddo o sotto serra).

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (20 l/ha per melo, pero e drupacee e 10 l/ha per le altre colture).

Subordinatamente ai fitofagi indicati, l'EDRIZAR controlla anche Afidi, Cicaline, Cocciniglie e le larve di alcune specie di lepidotteri (Cydia pomonella, Epidoptera exigua, Plutella maculipennis).

Per il controllo del ragno rosso su fruttiferi (melo, pero e drupacee) sono richiesti, di norma, due trattamenti per stagione e si può intervenire alla schiusura delle uova invernali (circa a caduta petali) oppure più tardi. Il trattamento va ripetuto, se occorre, tre settimane dopo. Per aumentare l'efficacia del trattamento è opportuno aggiungere alla soluzione 50 ml/ha di bagnante adesivo IROL. L'EDRIZAR può essere impiegato anche a basso volume, purché venga mantenuta costante la quantità di prodotto per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITA'**

L'EDRIZAR è compatibile con i più comuni insetticidi e fungicidi. Pertanto, in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Tossico per i pesci e gli insetti utili.

FITOTOSSICITA'

In caso di dubbio o di varietà poco diffuse o di recente acclimatazione si consiglia di eseguire preventive prove parcelari.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto su vite e agrumi, 28 giorni sulle altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

EDRIZAR COMBI

PASTA
INSETTICIDA-ACARICIDA A VASTO SPETTRO DI AZIONE

EDRIZAR COMBI

Registrazione Ministero della Sanità n. 6564 del 21.11.1985

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Amitraz puro	g. 15 (= 150 g/l)
Diflubenzuron puro	g. 5 (= 50 g/l)
Coformulanti*	q.b. a g. 100

* contiene Xilene e Cicloesano

Partita numero:


Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 1 - 5 L

Stabilimento di produzione:

SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SILIA - Aprilia (Latina)

II CLASSE



NOCIVO

Inflammabile. - Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. - Irritante per la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattati di associazione delle seguenti sostanze attive: AMITRAZ 15%; DIFLUBENZURON 5%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

AMITRAZ: Sintomi: Irritante per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, ipereccitabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile iperglicemia.

DIFLUBENZURON: ---

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

L'EDRIZAR COMBI controlla la generalità degli insetti che infestano il melo, il pero, le fioricole e le ornamentali in pieno campo. Il prodotto esplica anche una notevole azione acaricida contro tutte le specie di acari parassiti delle anzidette colture. La sua azione insetticida ed acaricida si esplica per contatto ed ingestione. La lunga persistenza d'azione garantisce la protezione della coltura per un lungo periodo di tempo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Melo: Fillo-minatori (Lithocolletis; Cernostoma etc.): Effettuare il trattamento durante il volo degli adulti, in coincidenza con la deposizione delle uova. Qualora lo si desidera il trattamento potrà essere effettuato anche all'apparire delle mine fogliari, purchè queste non abbiano superato il diametro di 2 mm. Dose applicativa: 175-225 ml/ha (3,5-4,5 l/ha). Ricamatrici (capua sp.; Archips sp.; Pandemis sp.): Trattare al primo apparire delle ovature. Dose applicativa: 175-225 ml/ha (3,5-4,5 l/ha). - Carpocapsa pomonella: 175-225 ml/ha (3,5-4,5 l/ha). Per tutti gli altri parassiti, quali afidi, acari, tignole: trattare al primo apparire dei parassiti, ripetendo l'applicazione secondo le necessità. Dose applicativa: 175-225 ml/ha (3,5-4,5 l/ha). In ogni caso non effettuare più di due trattamenti annui in totale.

Però: Psilla (Psilla pyri): applicare 200-300 ml/ha (4-6 l/ha) alla deposizione delle prime uova; Afidi, Eriofidi (Eriophyes pyri), Cocciniglie, Acari: applicare 200-300 ml/ha (4-6 l/ha) al primo apparire dei parassi-

ti, ripetendo il trattamento in caso di reinfestazione. In ogni caso non effettuare più di due trattamenti annui in totale.

Garofano (In pieno campo): per la lotta alle beghe (Cacoecia prunibana, Dianthoecia compta, Epicoristodes acerbella) impiegare 250-600 ml/ha (2,5-6 l/ha). Trattare preventivamente, prima della comparsa delle ovature, o appena inizia la deposizione.

L'EDRIZAR COMBI può essere utilizzato alla dose di 250-600 ml/ha (2,5-6 l/ha) per il controllo degli insetti e degli acari che infestano le seguenti colture: - rosa, gerbera, lillium, crisantemo, Bouvardia, Poinsetta, Aralia, Asparagus da fronda, Ciclamino, camelia, azalea.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (20 hl/ha per melo e pero e 10 hl/ha per le altre colture).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari fatta eccezione dei prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora di verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto non è fitotossico, tuttavia su varietà nuove è consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

MEOTRIN ED

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
ACARICIDA AD AZIONE OVOLARVICIDA ED
ADULTICIDA E CON OTTIMA AZIONE INSETTICIDA

MEOTRIN ED

Registrazione Ministero della Sanità n. 7903 del 7.04.1990

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Fenpropatrin	g. 10 (= 97 g/l)
Amitraz	g. 20 (= 194 g/l)
Coformulanti*	q.b. a g. 100

* contiene Cicloesanone, Xilene

Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,250 0,500 - 1 - 5 L

Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SILIA - Aprilia (Latina)



I CLASSE



TOSSICO

Infiammabile - Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. - Irritante per la pelle. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e faccine filtranti.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, depositi di mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FENPROPATRIN 10 %; AMITRAZ 20 %; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FENPROPATRIN: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-simpaticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte dei pazienti allergici o asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopneumoniti chimiche, aritmie cardiache.
AMITRAZ: Sintomi: irritante per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, ipereccitabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile iperglicemia.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Attivo contro tutte le specie di acari dannosi alle colture, il prodotto esplica la sua azione per contatto e per ingestione nei confronti di tutti gli stadi di sviluppo del fitofago. La miscela risulta particolarmente indicata per trattamenti primaverili o di fine estate; sono invece sconsigliati gli interventi in presenza di alte temperature. Oltre agli acari, il prodotto controlla anche gli insetti dannosi eventualmente presenti sulle colture, risultando particolarmente attivo contro la psilla del pero e anche contro i fillonatori, gli afidi e le cocciniglie.
Colture trattabili: Arancio, limone, melo, pero, pesco, vite, cetriolo, zucchini, colture floricole ed ornamentali in pieno campo ed in serra.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Melo: Ragno rosso (massimo 2 trattamenti/anno) 125-175 ml/hl (2,5-3,5 l/ha)
Pero: Ragno rosso, Psille (massimo 2 trattamenti/anno) 150-225 ml/hl (3-4,5 l/ha)
Pesco: Acari (massimo 2 trattamenti/anno) 150 ml/hl (3 l/ha).

Vite: Acari (massimo 1 trattamento/anno) 250 ml/hl (2,5 l/ha).
Arancio e limone: Acari, Aonidiella (massimo 2 trattamenti/anno) 200-300 ml/hl (2-3 l/ha).
Cetriolo, zucchini: Acari (massimo 1 trattamento/anno) 200-250 ml/hl (2-2,5 l/ha).
Fioreali ed ornamentali: 150-250 ml/hl (1,5-2,5 l/ha). La dose maggiore va impiegata con clima freddo o sotto serra.
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (20 hl/ha per melo, pero e pesco e 10 hl/ha per le rimanenti colture).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i fitofarmaci di normale impiego sulle colture anzidette. Comunque, poiché non tutte le possibili combinazioni sono state saggiate, si consiglia di verificare la stabilità della miscela preparandone una piccola quantità a scopo di prova.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Nei trattamenti su colture orticole, floricole, soprattutto in serra, è bene eseguire saggi preliminari in quanto alcune varietà, in particolare alcune cultivars di rosa, potrebbero essere sensibili al prodotto.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per arancio, limone e vite, 28 gg. per le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

SUMIZAR 25 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA A VASTO SPETTRO D'AZIONE

SUMIZAR 25 EC

Registrazione Ministero della Sanità n. 6830 del 29.10.1986

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Fenvalerate puro	g. 5 (= 50 g/l)
Amitraz puro	g. 20 (= 200 g/l)
Coformulanti*	q.b. a g. 100
* contiene Cicloesanone	

Partita numero:


Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 1 - 10 L



Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SILIA - Aprilia (Latina)

II CLASSE



NOCIVO

Inflammabile. - Nocivo per inalazione e ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale protettivo.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FENVALERATE 5%; AMITRAZ 20%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FENVALERATE Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. I solventi presenti nel formulato possono provocare broncopneumoniti chimiche, aritmie cardiache.

AMITRAZ Sintomi: irritante per cute e mucose. Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, ipereccitabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile iperglicemia.

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto controlla un elevato numero di insetti parassiti, per cui è in grado di risolvere agevolmente numerosi problemi di difesa. Il prodotto non determina effetti secondari sulle colture trattate e molto di rado, dopo il suo impiego, si renderà necessario effettuare interventi con prodotti acaricidi specifici. Dotato di lunga persistenza, agisce per contatto, ingestione, asfissia e repellenza, possedendo inoltre azione citotropica.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Pero e Melo: per la lotta ad: afidi (*Aphis pomi*, *Disaphis plantaginea*, *Eriosoma lanigerum*), Cocciniglie (*Mytilococcus ulmi*, *Epidiaspis leperii*, *Quadraspidotus perniciosus*), ricamatrici (*Pandemis sp.*, *Capua sp.*, *Cacoecia sp.*), verme della frutta (*Carpocapsa pomonella*), psilla del pero (*Psylla piri*). Dose applicativa: melo: 2,5-3,5 l/ha (125-175 ml/hl); pero: 3-4,5 l/ha (150-225 ml/hl).

Pesce: contro afidi (*Myzus persicae*, *Hyalopterus pruni*, *Brachycaudus spp.*), cocciniglie (*Pseudaulaucapsis pentagona*), tignole (*Cydia molesta*, *Anarsia lineatella*). Dose applicativa: 3 l/ha (150 ml/hl).

Arancio: contro tutte le cocciniglie (*Pseudococcus citri*, *Mytilococcus sp.*, *Ceroplastes sinensis*, *Coccus spp.*, *Aonidiella aurantii*, *Chrysomphalus dictyospermi*), tignola (*Prays citri*). Dose applicativa: 2-3 l/ha (200-300 ml/hl).

Vite: per la lotta contro cocciniglie (*Pseudococcus citri*, *Targionia vitis*, *Pulvinaria vitis*), tignole (*Lobesia botrana*, *Clysia ambiguella*). Dose applicativa: 2,5 l/ha (250 ml/hl).

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (20 hl/ha per melo, pero e pesce e 10 hl/ha per arancio e vite).

AVVERTENZA:

Su vite effettuare 1 solo trattamento annuo. Su melo, pero, pesce e arancio effettuare massimo 2 trattamenti annui.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti i concimi fogliari, nonché con tutti gli insetticidi ed i fungicidi di normale impiego sulle colture sopra elencate. Non è invece compatibile con prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Su colture poco diffuse o di recente commercializzazione, prima di fare trattamenti su vaste superfici, fare piccole prove parcellari.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è molto tossico per le api, tossico per gli insetti utili e i pesci, nocivo per gli animali domestici ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto per gli aranci, 35 giorni per la vite e 30 giorni per le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

CLOCUR**(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
FUNGICIDA CUPROORGANICO PER LE MALATTIE DEGLI ORTAGGI****CLOCUR**

Registrazione Ministero della Sanità n. 6666 del 14.11.1986

SIAPA - via Veer, 16 - Roma


COMPOSIZIONE	
Clorotaloniil puro	g. 20 (= 317 g/l)
Rame metallico puro (sotto forma di ossidocloruro)	g. 20 (= 317 g/l)
Coformulanti	q.b. e g. 100

Parità numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 1 - 5 - L

Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SIJA - Aprilia (Latina)


II CLASSE**NOCIVO**

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Irritante per gli occhi. - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. - Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Treatati di associazione delle seguenti sostanze attive: CLOROTALONIIL 20%, RAME 20%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOROTALONIIL: Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.

RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC; emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea emetica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antivenerei.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida ad azione preventiva, con un vasto spettro d'azione, dotato di alta persistenza e resistenza al dilavamento. In considerazione della sua azione polivalente, l'applicazione del prodotto permette il controllo temporaneo di numerosi funghi parassiti, non tracheomicotici, della parte aerea delle colture, ad eccezione dell'oidio. Grazie alla presenza nella miscela del Clorotaloniil, il prodotto svolge una buona azione acarica frenante.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

Sedano (in campo ed in serra): contro Septoriose (Septoria spp.), Cercosporiose (Cercospora spp.), Alternariose (Alternaria spp.), Botrytis cinerea e Batteriose: ml 250-400/100 l di acqua.

Pomodoro (in campo ed in serra): contro Peronospora (Phytophthora spp.), Alternariose (Alternaria solani), Septoriose (Septoria lycopersici), Cladosporiose (Cladosporium fulvum), Botrytis cinerea e Batteriose: ml 250-400/100 l di acqua.

Cocomero, melone, e cetriolo (in campo ed in serra): contro Antracnosi (Colletotrichum spp.), Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Botrytis cinerea, Dydymella spp. e Cladosporiose (Cladosporium spp.) e Batteriose: ml 250-400/100 l di acqua.

Fagiolo, pisello, e fagiolo (in pieno campo): contro Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Uromyces spp.), Botrytis cinerea, Ascochyta spp., Peronospora (Peronospora spp.) e Batteriose: ml 250-300/100 l di acqua.

Cipolla (in pieno campo): contro Peronospora (Peronospora spp.), Ruggine (puccinia spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Botrytis spp., Sclerotium cepivorum ecc. e Batteriose: ml 250-400/100 l di acqua.

Petata (in pieno campo): contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternariose (Alternaria solani), Botrytis cinerea e Batteriose: ml 250-400/100 l di acqua.

Fioralisi ed ornamentali (in campo ed in serra): contro Peronospora (Phytophthora spp.), Alternariose (Alternaria solani), Cladosporiose (Cladosporium fulvum), Botrytis cinerea e Batteriose: ml 250-400/100 l di acqua.

AVVERTENZE:

Su sedano, cocomero, melone, cetriolo e pomodoro in campo non superare i tre trattamenti annui. Su pomodoro in serra non superare i cinque trattamenti annui. Su cipolla, petata, fagiolo, pisello e fagiolo non superare i due trattamenti annui. Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITA'**

Il prodotto è compatibile con i più diffusi fitofarmaci utilizzati in agricoltura, ad eccezione degli oli bianchi e dei concimi fogliari a base di boro. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto, alle dosi ed alle modalità di etichetta, non è fitotossico. Nelle colture floreali ed ornamentali, data la molteplicità delle specie e delle varietà coltivate, è necessario effettuare prove preliminari di selettività su superfici limitate, prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciogliere a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

DIATAB

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
FUNGICIDA ORGANICO PER LE MALATTIE DEGLI
ORTAGGI E DELLE PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI

DIATAB

Registrazione Ministero della Sanità n. 2134 del 06.04.1976

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Clorotalonil puro g. 40,8 (= 510 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100


Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 1 - 5 L



II CLASSE



NOCIVO

Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Ravenna) - SILIA - Aprilia (Latina)

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE

DIATAB è attivo contro moltissimi funghi che colpiscono le piante orticole ad eccezione dell'oidio ed è dotato di azione acarofrenante.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

Sedano (in campo ed in serra) contro Septoriosi (Septoria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Botrytis cinerea: ml 200-280/100 l di acqua.

Pomodoro (in campo ed in serra) contro Peronospora (Phytophthora spp.), Alternariosi (Alternaria solani), Septoriosi (Septoria lycopersici), Cladosporiosi (Cladosporium fulvum), Botrytis cinerea: ml 200-280/100 l di acqua.

Cocomero, melone e cetriolo (in campo ed in serra) contro Antracnosi (Colletotrichum spp.), Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Botrytis cinerea, Dydimella spp. e Cladosporiosi (Cladosporium spp.): ml 200-280/100 l di acqua.

Fagiolo, pisello e fagiolino (in pieno campo) contro Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Uromyces spp.), Botrytis cinerea, Ascochyta spp. e Peronospora (Peronospora spp.): ml 200-230/100 l di acqua.

Cipolla (in pieno campo) contro Peronospora (Peronospora spp.), Ruggine (Puccinia spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Botrytis spp., Sclerotium cepivorum ecc.: ml 200-280/100 l di acqua.

Patata (in pieno campo) contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternariosi (Alternaria solani), Botrytis cinerea: ml 200-280/100 l di acqua.

Floreali ed ornamentali (in campo ed in serra) contro Peronospora (Phytophthora spp.), Alternariosi (Alternaria solani), Septoriosi (Septoria spp.), Cladosporiosi (Cladosporium fulvum), Botrytis cinerea, Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. etc: ml 200-280/100 l di acqua.

AVVERTENZE:

Su sedano, cocomero, melone, cetriolo e pomodoro (in campo) non superare i tre trattamenti annui. Su pomodoro in serra non superare i cinque trattamenti annui. Su patata e su cipolla in pieno campo e su fagiolo, fagiolino e pisello in pieno campo non superare i due trattamenti annui.

Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più diffusi fitofarmaci utilizzati in agricoltura, ad eccezione degli oli bianchi e dei concimi fogliari a base di boro. In caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto alle dosi e modalità di etichetta non è fitotossico. Nelle colture floreali ed ornamentali, data la molteplicità delle specie delle varietà coltivate, è necessario effettuare prove preliminari di selettività su superfici limitate, prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

POLICRITT CL

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA ORGANICO PER IL CONTROLLO DI NUMEROSE MALATTIE DEL MELO, DEL PERO, DEL PESCO, DEL SUSINO E DELLE COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI.

POLICRITT CL

Registrazione Ministero della Sanità n. 7269 del 26.11.1987

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Clorotalonil puro	g. 20 (= 246 g/l)
Carbendazim puro	g. 10 (= 123 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100

Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.


Contenuto: 1 - 5 L

Stabilimento di produzione:

SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SILIA - Aprilia (Latina)



II CLASSE



NOCIVO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciate filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Traffasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CLOROTALONIL 20 %
CARBENDAZIM 10 %
 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLOROTALONIL
 Sintomi: Irritazione per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
CARBENDAZIM
 Sintomi: Non si conoscono casi di intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
 Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE

Il POLICRITT CL è un fungicida frutto della miscela di due principi attivi a differente meccanismo e modalità di azione. Il Clorotalonil è dotato di attività preventiva, alta resistenza al dilavamento ed azione acarofrenante, mentre il Carbendazim è dotato di attività curativa, preventiva e di sistema acropeta.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (20 hl/ha sui fruttiferi e 10 hl/ha, sulle fioricole ed ornamentali). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.
Pomacee (melo e pero) contro Monilia, Muffa grigia, Alternaria, Gloeosporium: intervenire alla dose di 200 ml per 100 litri di acqua nei periodi più favorevoli alla malattia.
Drupacee (pesco e susino) - contro Monilia dei fiori: effettuare 1-2 interventi all'inizio od a fine fioritura alla dose di 200 ml per 100 l di acqua. - contro Monilia dei frutti: intervenire in pre-raccolta quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia (piogge o bagnature) alla dose di 200 ml per 100 l di acqua. - contro Nerume o Tichiolatura (Cladosporium carpophilum) e ruggini (Tranzschelia pruni-spinosa): intervenire alla comparsa dei primissimi sintomi alla dose di 200 ml per 100 litri d'acqua.
Culture fioricole ed ornamentali in serra ed in pieno campo contro Muffa grigia, Oidio, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Ruggini, Tichiolatura, Septoriosi, Fusariosi: intervenire alla dose di 300-500 ml per 100 l di acqua. Iniziare i trattamenti al primo apparire delle condizioni favorevoli alle malattie e ripeterli ogni 7-14 giorni secondo necessità.

Interventare alla comparsa dei primissimi sintomi alla dose di 200 ml per 100 litri d'acqua.

Culture fioricole ed ornamentali in serra ed in pieno campo contro Muffa grigia, Oidio, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Ruggini, Tichiolatura, Septoriosi, Fusariosi: intervenire alla dose di 300-500 ml per 100 l di acqua. Iniziare i trattamenti al primo apparire delle condizioni favorevoli alle malattie e ripeterli ogni 7-14 giorni secondo necessità.

AVVERTENZE:

Su pero, melo, pesco e susino non superare i 4 trattamenti annui. Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Non effettuare miscelazioni con olii minerali e con antiparassitari a reazione alcalina. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Prima di procedere al trattamento assicurarsi che siano trascorsi almeno 20 giorni da un eventuale precedente irrorazione con olio minerale.

Sulle colture floreali ed ornamentali, dato il grande numero di varietà e di specie coltivate, è consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari su piccole superfici prima di generalizzare il trattamento.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

SIACRIT C

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
FUNGICIDA AD ATTIVITA' PREVENTIVA E CURATIVA PER
IL CONTROLLO DI VARIE MALATTIE DEL MELO, PERO E PESCO

SIACRIT C

Registrazione Ministero della Sanità n. 7042 del 16.04.1987

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Fenarimol puro	g.	2,1 (= 24,6 g/l)
Clorotalonil puro	g.	28 (= 328 g/l)
Coformulanti	q.b. a	g. 100


Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 1 - 5 - L

Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SILIA - Aprilia (Latina)

II CLASSE



NOCIVO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale protettivo.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta o verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fenarimol 2,1%, Clorotalonil 28%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FENARIMOL: —

CLOROTALONIL: Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

SIACRIT C è un formulato frutto dell'associazione di due principi attivi a differente meccanismo fungicida con conseguente sinergismo d'azione. Il Fenarimol è dotato di attività preventiva e curativa ed eradicante, mentre il Clorotalonil è dotato di attività preventiva, azione acaro frenante ed alta resistenza al dilavamento.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (15 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per unità di superficie.

Melo contro Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) ed oidio (*Podosphaera leucotricha*): intervenire nei periodi di maggior sensibilità alle malattie od in funzione dell'infezione alla dose di 170 ml/ha d'acqua.

Pero contro ticchiolatura (*Venturia pirina*) e Septoria: intervenire nei periodi di maggior sensibilità alla malattia od in funzione dell'infezione alla dose di 170 ml/ha d'acqua. Il prodotto garantisce anche un'ottima protezione nei confronti della maculatura bruna (*Alternaria* spp. - *Stemphylium* spp.) per la quale tuttavia deve essere previsto un calendario apposito con formulati a base di Procymidone.

Pesco contro Oidio (*Sphaerotheca pannosa*) e Moniliosi (*Monilia* spp.): intervenire nelle fasi di maggior pericolosità delle avversità, in particolare a partire dalla scamicatura alla dose di 170 ml/ha d'acqua.

AVVERTENZE:

Su melo, pero e pesco non superare i 4 trattamenti annui.

Non accedere ai campi trattati prima che siano trascorse 12 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più diffusi fitofarmaci utilizzati in agricoltura, ad eccezione degli oli minerali e dei concimi fogliari a base di boro.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi e modalità di etichetta non è fitotossico

Sospendere i trattamenti 21 gg. prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando, il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SIACRIT CX

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WDG)
FUNGICIDA ORGANICO PER LE MALATTIE DEL POMODORO E DELLA PATATA

SIACRIT CX

Registrazione Ministero della Sanità n. 7009 del 17.03.1987

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Clorotalonil puro	g. 35
Cimoxanil puro	g. 3,5
Coformulanti	q.b. a g. 100


Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.
Contenuto: 0,250 - 1 - 5 Kg.

Prodotto nello Stabilimento di: UCB S.p.A. Gand (Belgio)
e Confezionato nello Stabilimento: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)
- SILIA - Aprilia (Latina)



II CLASSE



NOCIVO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotalonil 35%, Cimoxanil 3,5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOTALONIL: Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

CIMOXANIL: Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è frutto dell'associazione di due principi attivi a differente meccanismo d'azione: Clorotalonil e Cimoxanil. Il Cimoxanil è dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante, e penetra molto rapidamente all'interno della vegetazione infestata. Il Clorotalonil è dotato di attività preventiva ed alta resistenza al dilavamento. Il SIACRIT CX è attivo contro moltissimi funghi che colpiscono le piante orticole ad eccezione dell'oidio ed è dotato di azione acaro-frenante.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Le quantità indicate sono riferite ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

Pomodoro (in campo ed in serra) contro Peronospora (Phytophthora spp.), Alternariosi (Alternaria solani), Septoriosi (Septoria lycopersici), Botrytis cinerea e Cladosporiosi (Cladosporium fulvum): g 250-285/100 l di acqua.

Patata (in pieno campo) contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternariosi (Alternaria solani), Botrytis: g 250-285/100 l di acqua.

AVVERTENZE:

Su pomodoro non superare i 5 trattamenti annui in serra ed i 3 trattamenti annui in campo. Su patata non superare i 2 trattamenti annui.

Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non miscelare con prodotti alcalini. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto non è fitotossico

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SIACRIT F

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
FUNGICIDA AD ATTIVITA' PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DI NUMEROSE
MALATTIE FUNGINE DI ALCUNE COLTURE ORTICOLE ED ORNAMENTALI

SIACRIT F

Registrazione Ministero della Sanità n. 6980 del 04.03.1987

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Clorotalonil puro	g. 35 (= 420g/l)
Fenarimol puro	g. 1 (= 12 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100


Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,100 - 0,500 - 1 - 5 L

Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SILIA - Aprilia (Latina)

II CLASSE



NOCIVO

Nocivo a contatto con la pelle. - Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi di acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Clorotalonil 35%, Fenarimol 1%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOROTALONIL:

Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

FENARIMOL: —

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

SIACRIT F è un formulato frutto dell'associazione di due principi attivi a differente meccanismo fungicida con conseguente sinergismo di azione. Il Fenarimol è dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante, mentre il Clorotalonil è dotato di attività preventiva, azione acaro frenante ed alta resistenza al dilavamento.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

Cocomero, melone, cetriolo (in campo ed in serra) contro Antracnosi (*Colletotrichum* spp.), Cladosporiosi (*Cladosporium* spp.), Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Botrytis cinerea, *Dydymella* spp. ed Oidio (*Erysiphe chiochocacearum*): ml 250-350/ha d'acqua.

Pisello contro oidio (*Erysiphe polygoni*), peronospora (*Peronospora pisi*), muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Antracnosi (*Colletotrichum* spp.): ml 250-280/ha di acqua.

Fiorali ed ornamentali (in campo ed in serra) contro Antracnosi (*Colletotrichum* spp.), Cladosporiosi (*Cladosporium* spp.), Peronospora, Botrytis cinerea, *Dydymella* spp., Septoria, Alternaria ed Oidio: ml 150-350/ha d'acqua.

AVVERTENZE

Su cocomero, melone e cetriolo non superare i tre trattamenti annui. Su pisello non superare i 2 trattamenti annui.

Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più diffusi fitofarmaci utilizzati in agricoltura, ad eccezione degli oli bianchi e dei concimi fogliari a base di boro. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi e modalità di etichetta non è fitotossico. Sulle piante floreali ed ornamentali è necessario tuttavia effettuare saggi preliminari prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Sciquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SIACRIT FC

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WDG)
FUNGICIDA AD ATTIVITA' PREVENTIVA E CURATIVA PER IL
CONTROLLO DI VARIE MALATTIE DELLE POMACEE E DEL PESCO.

SIACRIT FC

Registrazione Ministero della Sanità n. 7174 del 03.07.1987

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE	
Fenarimol puro	g. 3,4
Clorotalonil puro	g. 45
Coformulanti	q.b. a g. 100

Partita numero:


Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,250 - 1 - 5 - 25 Kg.

Prodotto nello Stabilimento di: UCB S.p.A. Gand (Belgio)
e Confezionato nello Stabilimento di - SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)
- SILIA - Aprilia (Latina)



II CLASSE



NOCIVO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito di mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fenarimol 3,4%, Clorotalonil 45%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FENARIMOL: —

CLOROTALONIL: Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il SIACRIT FC è un formulato frutto dell'associazione di due principi attivi a differente meccanismo fungicida con conseguente sinergismo di azione. Il Fenarimol è dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante, mentre il Clorotalonil è dotato di attività preventiva, azione acaro frenante ed alta resistenza al dilavamento.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (15 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per unità di superficie.

Melo contro Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) ed oidio (*Podosphaera leucotricha*): intervenire nei periodi di maggior sensibilità alle malattie od in funzione dell'infezione alla dose di 125 g/100 l di acqua.
Pere contro Ticchiolatura (*Venturia pirina*) e Septoria: intervenire nei periodi di maggior sensibilità alla malattia od in funzione dell'infezione alla dose di 125 g/100 l di acqua. Il prodotto garantisce anche un'ottima protezione nei confronti della maculatura bruna (*Alternaria* spp. - *Stemphylium* spp.) per la quale tuttavia deve essere previsto un calendario apposito con formulati a base di Procimidone.

Pesce contro Oidio (*Sphaerotheca pannosa*) e Moniliosi (*Monilia* spp.): intervenire nelle fasi di maggior pericolosità delle avversità, in

particolare a partire dalla scamicatura alla dose di 125 g/100 l di acqua ogni 7 giorni.

AVVERTENZE:

Su melo, pero, pesco non superare i quattro trattamenti annui.

Non accedere ai campi trattati prima che siano trascorse 12 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi attualmente in commercio. Comunque, data la molteplicità delle combinazioni possibili si suggerisce di verificare la compatibilità fisica di ciascuna miscela estemporanea preparandone una piccola quantità prima dell'impiego. Non è compatibile con olii minerali le cui applicazioni devono essere distanziate di almeno 3 settimane da quelle del prodotto. Deve essere utilizzato con cautela su colture soggette a rugginosità.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

In colture nuove o poco diffuse è opportuno fare piccole prove parcellari prima di effettuare trattamenti massivi.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SIACRIT S.I.

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

**FUNGICIDA ORGANICO PER IL CONTROLLO DI NUMEROSE MALATTIE
DI ALCUNE COLTURE FRUTTICOLE, ORTICOLE E ORNAMENTALI**

SIACRIT S.I.

Registrazione Ministero della Sanità n. 7470 del 14.04.1988

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE


Fenarimol puro	g. 3,5 (= 45 g/l)
Clorotalonil puro	g. 40 (= 518 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100

Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,500 - 1 - 5 L

Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SILIA - Aprilia (Latina)

**II CLASSE****NOCIVO**

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fenarimol 3,5%, Clorotalonil 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FENARIMOL: —
CLOROTALONIL:

Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è una formulazione di due fungicidi ad azione preventiva e curativa nei confronti di numerosi parassiti fungini.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Melo e Pero: contro ticchiolatura, oidio, marciume dei frutti applicare 80-100 ml/ha di prodotto. Iniziare i trattamenti dalla ripresa vegetativa effettuandoli ad intervalli di 7-10 gg. fino a quando sussistano le condizioni ambientali che favoriscono lo sviluppo dei parassiti anzidetti. Usare la dose più elevata e l'intervallo più breve durante le fasi in cui la coltura è più sensibile ai patogeni citati ed in particolare a ticchiolatura e oidio.

Pescio: per il controllo dell'oidio applicare il prodotto alla dose di 80-100 ml/ha effettuando un 1° trattamento alla scamicatura ed un 2° sette giorni dopo. Riprendere i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi della malattia alternandoli ad intervalli di 6-8 giorni. Si raccomanda di attenersi all'intervallo più breve, su varietà molto sensibili (Nettarine) e nelle fasi di maggiore sensibilità della coltura al patogeno. Il prodotto ha una valida azione anche contro altri parassiti fungini quali: bolla, monilia, nerume dei frutti, ruggine.

Cucurbitacee (cocomero, melone, cetriolo): contro oidio, antracnosi, vaiolatura, alternaria, cladosporiosi, muffa grigia. Applicare 80-100 ml/ha di prodotto ad intervalli di 8-10 gg. iniziando i trattamenti al primo apparire della malattia. Il prodotto è dotato di efficacia nei confronti della peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*).

Pisello: contro oidio (*Erysiphe polygoni*), Peronospora (*Peronospora pisi*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Antracnosi (*Colletotrichum spp.*): 80-100 ml/ha.

Colture floricole: per la lotta contemporanea a oidio, ruggine, antracnosi, septoriosi, fusariosi non vascolari, alternaria, ticchiolatura

della rosa, impiegare 80-100 ml/ha di prodotto. Iniziare i trattamenti al primo apparire della malattia e ripeterli secondo necessità.

Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (15 hl/ha per i frutteti e 10 hl/ha per le altre colture).

AVVERTENZE:

Su melo, pero, pesco non superare i quattro trattamenti annui. Su cocomero, melone e cetriolo non superare i tre trattamenti annui. Su pisello non superare i 2 trattamenti annui. Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto è compatibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi attualmente in commercio. Comunque, data la molteplicità delle combinazioni possibili si suggerisce di verificare la compatibilità fisica di ciascuna miscela estemporanea preparandone una piccola quantità prima dell'impiego. Non è compatibile con oli minerali le cui applicazioni devono essere distanziate di almeno 3 settimane da quelle del prodotto. Deve essere utilizzato con cautela su colture soggette a rugginosità. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

In colture nuove o poco diffuse è opportuno fare piccole prove parcellari prima di effettuare trattamenti massivi.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto su melo, pero e pesco e 14 giorni su cocomero, melone, cetriolo e pisello. Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento. Lo smaltimento delle confezioni vuote o dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SIACRIT TRE

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WDG)
FUNGICIDA ORGANICO PER LE MALATTIE DI POMODORO E PATATA

SIACRIT TRE

Registrazione Ministero della Sanità n. 7008 del 17.03.1987

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE	
Clorotalonil puro	g. 20
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)	g. 27
Cimoxanil puro	g. 2
Coformulanti	q.b. a g. 100


Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,250 - 1 - 5 Kg.

Prodotto nello Stabilimento di: UCB S.p.A. Gand (Belgio)
e Confezionato nello Stabilimento: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)
- SILIA - Aprilia (Latina)

II CLASSE



NOCIVO



Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Irritante per gli occhi. - Possibilità di effetti irreversibili. - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di faccette filtrante.
- Preparare la miscela in appositi recipienti, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLOROTALONIL 20%, RAME 27%, CIMOXANIL 2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLOROTALONIL: Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofageali, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
CIMOXANIL: Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è frutto dell'associazione di tre principi attivi a differente meccanismo d'azione: Clorotalonil, Cimoxanil e Rame. Il Cimoxanil è dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante, e penetra molto rapidamente all'interno della vegetazione irrorata. Il Clorotalonil è dotato di attività preventiva ed alta resistenza al dilavamento. Il Rame allarga lo spettro del prodotto alla batteriosi, oltre a controllare numerose malattie fungine. SIACRIT TRE è attivo contro moltissimi funghi e batteri che colpiscono le piante orticole ed è dotato di azione acarofrenante.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conse-

quenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.
Pomodoro (in campo ed in serra) contro Peronospora (Phytophthora spp.), Alternariosi (Alternaria solani), Septoriosi (Septoria lycopersici), Botrytis cinerea, Rhizoctonia spp., Cladosporiosi (Cladosporium fulvum) e Batteriosi: g 450-500/100 l di acqua.
Patata (in pieno campo) contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternariosi (Alternaria solani), Botrytis e batteriosi: g 450-500/100 l di acqua

AVVERTENZE:

Su pomodoro non superare i 5 trattamenti annui in serra e 3 in campo. Su patata non superare i 2 trattamenti annui.

Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più diffusi fitofarmaci utilizzati in agricoltura, ad eccezione degli oli bianchi e dei concimi fogliari a base di boro. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi e modalità di etichetta non è fitotossico.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SIALEX C

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
FUNGICIDA ORGANICO PER LE MALATTIE DEL POMODORO
E DELLE PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI

SIALEX C

Registrazione Ministero della Sanità n. 6086 del 24.10.1984

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Clorotalonil puro	g. 30 (= 377 g/l)
Procimidone puro	g. 15 (= 189 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100

Partita numero:


Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 1 - 5 - L

Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SILIA - Aprilia (Latina)



II CLASSE



NOCIVO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotalonil 30%, Procimidone 15%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOROTALONIL: Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

PROCIMIDONE: —

Terapia: Sintomatica

Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è frutto dell'associazione di due principi attivi ad azione di copertura e dotati di alta resistenza al dilavamento: Clorotalonil e Procimidone. SIALEX C è attivo contro moltissime malattie (ad eccezione dell'oidio) ed è dotato di azione acaro-frenante.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego di modo da mantenere costante la quantità di prodotto per unità di superficie.

Pomodoro (in campo ed in serra) contro Peronospora (*Phytophthora* spp.), Alternariosi (*Alternaria solani*), Septoriosi (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Sclerotinia e *Rhizoctonia* spp.: ml 200-250/ha d'acqua.

Floreali ed ornamentali (ad eccezione del ciclamino) contro Peronospora (*Peronospora* spp.), Ruggine (*Puccinia* spp.), *Alternaria* (*Alternaria* spp.), Cladosporiosi (*Cladosporium* spp.) e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), *Ascochyta* spp., ecc: ml 200-250/ha d'acqua.

AVVERTENZE:

Su pomodoro non superare i tre trattamenti annui in pieno campo e cinque in serra.

Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più diffusi fitofarmaci utilizzati in agricoltura ad eccezione degli oli bianchi e dei concimi fogliari a base di boro. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi e modalità di etichetta non è fitotossico. Tuttavia, sulle ornamentali è consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari su varietà di nuova introduzione.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

ERBITOX PATATE

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WDG)
ERBICIDA PER IL CONTROLLO DELLE MALERBE
GRAMINACEE E DICOTILEDONI CHE INFESTANO LA PATATA

ERBITOX PATATE

Registrazione Ministero della Sanità n. 4868 del 19.06.1982

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE	
Linuron puro	g. 33,3
2,4 D puro (da sale sodico)	g. 11,2
Coformulanti	q.b. a g. 100




Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.
Contenuto: 0,500 - 1 - 5 Kg.

Prodotto nello Stabilimento di: UCB S.p.A. Gand (Belgio)
e Confezionato nello Stabilimento - SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)
- SILA - Aprilia (Latina)

II CLASSE



NOCIVO

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. - Irritante per la pelle. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale filtrante.
- Preparare la miscela in contenitori appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli destinati ad altri usi agricoli, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Linuron 33,3%, 2,4 D 11,2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

LINURON: Derivato dell'urea. Sintomi: Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subiterno ed ematuria.

2,4 D: Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

ERBITOX PATATE è un diserbante tipico selettivo per la patata sia precoce che tardiva. Il prodotto agisce per via radicale e per via fogliare contro le più comuni infestanti dicotiledoni ed alcune graminacee: *Amaranthus retroflexus* (amaranto), *Anagallis arvensis* (anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (borsa del pastore), *Chenopodium album* (farinaccio), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa c.g.* (giavone), *Euphorbia* spp. (euforbia), *Galinsoga parviflora* (galinsoga), *Matricaria chamomilla* (camomilla), *Mercurialis annua* (mercuriale), *Papaver rhoeas* (papavero), *Plantago maior* (plantaggine), *Poa annua* (poa), *Polygonum convolvulus* (falso convolvolo), *Polygonum persicaria* (persicaria), *Portulaca oleracea* (erba porcellana) *Raphanus raphanistrum* (rafano), *Senecio vulgaris* (senecio), *Setaria* spp. (setaria), *Sinapis arvensis* (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stellaria media* (centocchio), *Veronica* spp. (veroniche).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega sempre in miscela con altri formulati autorizzati sulla coltura, in pre-emergenza alla dose di 2-3 kg/ha dopo la rincalzatura o dopo le altre eventuali pratiche colturali di preparazione che si volessero effettuare successivamente alla semina. Il prodotto deve essere distribuito in modo uniforme su tutta la superficie da diserba-

re, con un quantitativo di acqua (circa 3-4 hl/ha) sufficiente per poter bagnare uniformemente tutta la vegetazione infestante già in atto, oltre al terreno sottostante. Le dosi di impiego per ettaro variano con la composizione del terreno: quella minima è valida per terreni leggeri, sabbiosi, ricchi di scheletro e moderatamente dotati di sostanza organica, quella massima per terreni pesanti ricchi di sostanza organica.

Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di Sostanza organica inferiore all'1%

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i principali diserbanti di comune impiego sulla coltura indicata. Tuttavia, siccome non tutte le possibili combinazioni sono state provate, si consiglia di verificare su piccola scala la compatibilità fisico-chimica e la selettività delle miscele. **AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Ale dosi e con le modalità indicate il prodotto risulta selettivo. Solo nei terreni più leggeri, in seguito ad eccessive precipitazioni, possono verificarsi temporanei effetti fitotossici.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci. Si raccomanda di non inquinare corsi d'acqua e di far trascorrere almeno 60 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il formulato.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SILTRINUL

LIQUIDO EMULSIONABILE

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO IN PRE-EMERGENZA DI INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI IN COLTURE DI CEREALI A SEMINA AUTUNNO/INVERNALE, SOIA E GIRASOLE

SILTRINUL

Registrazione Ministero della Sanità n. 1713 del 25.06.1974

SIAPA - via Yaer, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Trifluralin puro	g. 23,5 (= 240 g/l)
Linuron puro	g. 11,75 (= 120 g/l)
Coformulanti*	q.b. a g. 100
* contiene xilene	

Partita numero:


Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20 L

Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SILIA - Aprilia (Latina)



II CLASSE



NOCIVO

Infiammabile. - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. - Conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e faccette filtranti.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito di mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Trifluralin 23,5%, Linuron 11,75%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

TRIFLURALIN: —

LINURON: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro antiveleni.

qualche caso può essere utile rullare il terreno dopo la semina e prima del trattamento.

VOLUME DI IRRORAZIONE: Applicare il SILTRINUL in 200-800 litri di acqua per ha; il SILTRINUL deve essere aggiunto nella botte riempita a metà di acqua ed agitato bene durante il completamento del riempimento. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare una qualsiasi attrezzatura irrorante a bassa pressione (1,5-0,5 Atm) provvista di barra e di ugelli per erbicidi e di una pompa di capacità adeguata ad assicurare una buona agitazione durante l'irrorazione. Si raccomanda di montare un'efficiente valvola di chiusura per impedire la eccessiva fuoriuscita del prodotto nelle fasi di partenza, di svolta e di fermata. Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto venga distribuito uniformemente.

ISTRUZIONI SPECIALI:

Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin in miscela con Linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, coccomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza, cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Il prodotto inoltre, non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore a 1%.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SILTRINUL si impiega da solo.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in locali a temperatura superiore ai 5°C.

Non conservare presso sorgenti di calore o fuoco.

Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciogliere a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL SILTRINUL

INFESTANTI CONTROLLATE:

Graminacee annuali: Alopecurus agrestis - Alopecurus myosuroides - Alopecurus pratensis - Apera spica-venti - Briza minor - Lolium multiflorum - Poa annua - Poa spp. Dicotiledoni annuali: Alchemilla arvensis - Anagallis arvensis - Arabidopsis thaliana - Capsella bursa-pastoris - Cerastium arvense - Juncus bufonius - Lamium purpureum - Lamium amplexicaule - Lithospermum arvense - Matricaria chamomilla - Matricaria inodora - Myosotis arvensis - Myosurus minimum - Papaver rhoeas - Polygonum aviculare - Raphanus raphanistrum - Sinapis arvensis - Sonchus asper - Specularia speculum - Stellaria media - Thlaspi arvense - Valerianella auricula - Veronica spp. Il SILTRINUL non controlla: Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis, Agropyron repens, Cirsium spp. e Tussilago farfara.

COLTURE PROTETTE:

Frumento, a semina autunno-invernale, duro e tenero. Orzo a semina autunno-invernale. Segale a semina autunno-invernale. Soia - Girasole.

CEREALI (frumento, segale, orzo)

EPOCA D'IMPIEGO: Il SILTRINUL deve essere usato dopo la semina e prima della emergenza della coltura da trattare.

DOSAGGI: 3-3,8 lt per ha per ogni tipo di terreno. E' comunque consigliabile le dosi inferiori nei terreni sciolti.

SOIA: Il SILTRINUL deve essere applicato in pre-emergenza della coltura, alle dosi di 3-3,8 litri per ha.

GIRASOLE: Il SILTRINUL deve essere applicato in pre-emergenza alla dose di 3-3,8 litri per ha.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE: Il SILTRINUL deve essere distribuito per irrorazione e non deve essere incorporato nel terreno.

PREPARAZIONE DEL TERRENO: Per ottenere i migliori risultati il letto di semina deve essere ben preparato, eliminando le zolle grosse, e tutti i semi devono essere ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme, soprattutto in previsione di anomale condizioni climatiche (piogge violente, freddi intensi). A questo scopo in

SILTRINUL G

(GRANULARE)

**DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI
GRAMINACEE E DICOTILEDONI IN ALCUNE COLTURE DI CEREALI A SEMINA
AUTUNNO/INVERNALE, DI PATATA, CAROTA, CARCIOFO, FINOCCHIO E SOIA**

Registrazione Ministero della Sanità n. 7523 del 22.09.1988

SIAPA - via Yser, 18 - Roma

IV CLASSE

COMPOSIZIONE	
Trifluralin puro	g. 2
Linuron puro	g. 1
Coformulanti	q.b. a g. 100



Contenuto: 5 - 25 Kg

Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SILIA - Aprilia (Latina)

Norme precauzionali: - Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:
Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazioni delle seguenti sostanze attive, Trifluralin 2%, Linuron 1%, le quali, separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

TRIFLURALIN: ---**LINURON:**

(Derivato dell'urea) Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

SILTRINUL G è una formulazione della miscela Trifluralin + Linuron. I vantaggi che tale preparato offre rispetto ai prodotti liquidi possono così essere riassunti:

- può essere distribuito insieme ai concimi di normale impiego purché di simile granulometria e peso specifico. Con una sola operazione è pertanto possibile concimare e diserbare la coltura;
- è possibile distribuire l'erbicida in qualunque fase di sviluppo della coltura, purché le infestanti non siano ancora emerse;
- applicato tardivamente può controllare anche quelle infestanti che nascono in modo scalare nel tempo.

INFESTANTI CONTROLLATE:

Graminacee annuali: Alopecurus spp. (Erba codina) - Apera spicaventi (Spica venti) - Briza minor (Erba brillante) - Lolium multiflorum (Loglio) - Poa spp. (Poa).

Dicotiledoni annuali: Achemilla arvensis (Ventagliana) - Anagallis arvensis (Anagallide) - Arabidopsis thaliana (Pelosella) - Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore) - Cerastium arvense (Cerastio arvense) - Fumaria officinalis (Fumaria) - Juncus bufonius (Giunco della botte) - Lamium purpureum (Ortica falsa) - Lamium amplexicaule (Erba ruota) - Lithospermum arvense (Strigolo selvatico) - Matricaria chamomilla (Camomilla) - Matricaria inodora (Matricaria selvatica) - Myosotis arvensis (Myosotis) - Papaver rhoeas (Papavero) - Polygonum aviculare (Coreggiola) - Ranunculus spp. (Ranuncoli) - Raphanus raphanistrum (Rafanistro) - Sinapis arvensis (Senape) - Sonchus asper (Sonco) - Specularia speculum (Specchio di Venere) - Stellaria media (Centocchio) - Thlaspi arvense (Erba stoma) - Valerianella auricula (Gallinetta) - Veronica spp. (Veroniche).

Il prodotto non controlla: Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis (Avena selvatiche), Agropyron repens (Gramigna), Cirsium spp. e Tussilago farfara (Farfara).

COLTURE PROTETTE: Cereali a semina autunnale (frumento, orzo, segale), Carota, Patata, Carciofo, Finocchio, Soia.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Cereali: il prodotto può essere applicato in pre o in post-emergenza della coltura, ma prima che le infestanti siano emerse. Dose: 30 kg/ha nei terreni sciolti; 45 kg/ha in tutti gli altri tipi di terreno.
Carota: applicare il prodotto in pre-emergenza o in post-emergenza dopo che la coltura ha superato lo stadio di 4 foglie vere. Dose: 35 kg/ha nei terreni sciolti; 45 kg/ha in tutti gli altri tipi di terreno.

Patata: il prodotto si applica solo in miscela con altri diserbanti autorizzati, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Dose: 35 kg/ha nei terreni sciolti; 45 kg/ha in tutti gli altri tipi di terreno.

Carciofo (impianti di almeno 2 anni): applicare il prodotto dopo le lavorazioni effettuate per stimolare la ripresa vegetativa della coltura. Dose: 30 kg/ha nei terreni sciolti; 45 kg/ha in tutti gli altri tipi di terreno.

Finocchio: il prodotto si applica in post-emergenza quando la coltura ha differenziato la quarta foglia vera. Dose: 35 kg/ha nei terreni sciolti; 45 kg/ha in tutti gli altri tipi di terreno.

Soia: l'applicazione del prodotto su questa coltura può essere fatta in: - pre-semina con incorporamento; - pre-emergenza; post-emergenza. Dose: 35 kg/ha nei terreni sciolti; 45 kg/ha in tutti gli altri tipi di terreno.

AVVERTENZE:

Nei trattamenti di pre-emergenza il prodotto non deve essere incorporato;
Nelle applicazioni di post-emergenza può essere incorporato nelle interfile;

Non usare il prodotto in terreni con tenore di sostanza organica superiore all'8% o in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati il letto di semina deve essere ben preparato e senza zolle ed avvallamenti che possono dar luogo a ristagni di acqua. Tutti i semi devono essere coperti dal terreno.

ISTRUZIONI SPECIALI:

Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin in miscela con Linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio; melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITA'**

Il prodotto può essere distribuito in miscela con concimi granulari aventi pari granulometria e peso specifico. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SIOLCID**(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
DISERBANTE SELETTIVO**

SIOLCID

Registrazione Ministero della Sanità n. 0874 del 04.12.1972

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Linuron puro	g. 37,6 (= 440 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100


Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25 L

Stabilimento di produzione: SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna) - SILIA - Aprilla (Latina)

Irritante per la pelle. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

III CLASSE**IRRITANTE**

SIAPA
SOCIETÀ ITALO-AMERICANA
PRODOTTI ANTIPARASSITARI

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale filtrante.
- Preparare la miscela in contenitori appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli destinati ad altri usi agricoli, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il SIOLCID è un diserbante selettivo specifico per la distruzione delle specie erbacee annuali infestanti le colture di mais, asparago, sedano, fagiolo, fagiolino, rapa, carota, patata, carciofo, finocchio, soia e girasole. Il SIOLCID esplica la sua azione per via radicale e per via fogliare. In base alle nostre attuali conoscenze ed in condizioni pedoclimatiche normali (terreno di medio impasto sufficientemente umido e ben lavorato e sminuzzato nello strato superficiale, in ambiente mediamente piovoso) il SIOLCID combatte: Giavone, Setaria, Amarantho, Digitaria, Farinello, Persicaria, Erba Porcellana, Camomilla, Veronica, Senape, Mercurella, Galinsoga, Borsa Pastore, Morella, Erba Paperina, Piantaggine, Falso Convolvolo, Euforbia, Rafano, Centocchio, Senecio, Anagallide, Papavero, Poa. Il SIOLCID alle dosi selettive per le colture non combatte le erbe perennanti ad apparato radicale bulboso, profondo e rizomatoso. Alle normali dosi d'impiego la persistenza nel terreno del SIOLCID non supera i 2-3 mesi, per cui si ha una buona per-

sistenza di azione, senza pericolo alcuno di inconvenienti per le colture che seguono nella rotazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Mais: Il SIOLCID s'impiega solo in pre-emergenza subito dopo la semina o al massimo dopo 2-3 giorni. Nei terreni di medio impasto il prodotto si impiega solo in miscela con altri diserbanti autorizzati sulla coltura alla dose di 1 l/ha. Nei terreni torbosi o argillosi la dose di impiego è di 1-1,3 l/ha. Si possono anche diserbare mais di secondo raccolto e da foraggio, senza timore alcuno di danni per le colture successive seminate o trapiantate 2-3 mesi dopo il trattamento. Una semina relativamente profonda (4-5 cm.) ed uniforme garantisce in ogni caso i migliori risultati, soprattutto in condizioni di eccessiva piovosità.

Carota: Impiego in pre-emergenza: la dose non deve superare i 2 per ettaro effettuando il trattamento prima della germinazione del seme che deve essere ben coperto dal terreno. Impiego in post-emergenza: la dose varia da 1,5 a 2,2 l per ettaro ed il trattamento si effettua a partire da quando le carote hanno completamente formato il secondo palco fogliare (4 foglie vere) scegliendo il momento e la dose idonei in funzione dello sviluppo delle infestanti. Non trattare in giornate eccessivamente calde o soleggiate. Impiego misto in pre e post-emergenza: si consiglia la dose di 1,3 per ettaro in pre-emergenza ed una seconda applicazione alla stessa dose quando le piante hanno differenziato le 4 foglie vere (dopo circa un mese dalla nascita delle piantine).

Sedano: 1-2 l/ha in pre-emergenza oppure in post-emergenza o post-trapianto con coltura allo stadio di almeno 4 foglie vere e dopo la crisi di trapianto.

Rapa: 1-2 l/ha in post-trapianto dopo che la coltura ha superato la crisi di trapianto.

Patata: Il SIOLCID s'impiega in pre-emergenza, alla dose di 1,3-2,2/ha solo in miscela con altri formulati autorizzati sulla coltura.

Asparago: trattare il terreno già sistemato prima della fuoriuscita dei turioni, alla dose di 1-2 l/ha.

Carciofo:

- coltura di nuovo impianto: 0,8-1,4 l/ha dopo la messa a dimora degli ovuli e prima della fuoriuscita dei germogli dal terreno;
- coltura di nuovo impianto riprodotta per carducci: 1-1,5 l/ha, 15-25 gg dopo la messa a dimora dei carducci.;
- coltura di vecchio impianto: 1,2-1,5 l/ha alla ripresa vegetativa, prima che i germogli raggiungano la lunghezza di 15-20 cm (le prime foglie possono ustionarsi, ma senza alcuna conseguenza sullo sviluppo della coltura).

Fagiolo, fagiolino: in pre-emergenza alle seguenti dosi: 0,8-1 l/ha (terreni leggeri); 1,2 l/ha (terreni di medio impasto); 1,3 l/ha (terreni pesanti).

Finochlo: il SIOLCID s'impiega in post-emergenza a partire da quando la coltura ha differenziato la quarta foglia vera, alla dose di 0,5-1 per ettaro.

Sola: il SIOLCID s'impiega in pre-emergenza alla dose di 0,5-0,9 l/ha. Ridurre il dosaggio su terreni particolarmente sabbiosi.

Girasole: il SIOLCID s'impiega in pre-emergenza alla dose di 0,9-1,3 l/ha.

Le dosi d'impiego per ettaro variano con la composizione del terreno: di quelle da noi consigliate quella minima è valida per terreni leggeri, sabbiosi e moderatamente dotati di sostanza organica, quella massima per terreni pesanti o ricchi di sostanza organica.

Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto in sostanza organica inferiore all'1%.

L'effetto erbicida è sempre in stretta relazione al perfetto livellamento e sminuzzamento della superficie del terreno ed allo stato di umidità di quest'ultimo. Se il terreno non è ben sminuzzato e livellato e ben dotato di riserve idriche prima della semina, i semi e le piantine delle infestanti possono sfuggire all'azione del prodotto. Se l'umidità del terreno è insufficiente bisogna ripristinarla ricorrendo ad una moderata irrigazione per aspersione o per scorrimento. Una leggera pioggia dopo il trattamento favorisce l'azione del diserbante. Evitare però eccessivi apporti di acqua che, come le violente precipitazioni dopo il trattamento, possono arrecare danni alle colture. Dopo il trattamento non effettuare per qualche tempo lavorazioni sulla superficie irrorata; nel caso in cui il terreno tenda ad incrostarsi eccessivamente è consigliabile ricorrere ad una rullatura unicamente per smuovere la superficie, senza effettuare lavorazioni che porterebbero in profondità il diserbante annullando la sua azione. Eseguire il diserbo in giornate poco ventilate. Preparare accuratamente il letto di semina. Seminare uniformemente e più profondamente possibile in relazione alla specie coltivata. Negli impieghi in pre-emergenza non irrorare su terreno secco nello strato superficiale. Irrorare unicamente colture asciutte e ad investimento e sviluppo regolari. Evitare super dosaggi e sovrapposizioni durante i trattamenti. Il SIOLCID si irrorerà con le normali pompe comunemente impiegate per i diserbanti avendo cura di usare ugelli a getto sottile ed uniforme. Per la prepara-

zione della poltiglia non occorrono accorgimenti particolari. Nel caso di pompe provviste di agitatore meccanico si può versare il prodotto direttamente nel serbatoio previamente riempito per 2/3 del quantitativo di acqua richiesto, aggiungendo quindi il rimanente. Per gli altri tipi di pompe stemperare prima il prodotto in poca acqua ed agitando energicamente raggiungere il volume richiesto. Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto. Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SIOLCID è miscibile con i principali diserbanti di comune impiego sulle colture indicate. Tuttavia, siccome non tutte le possibili combinazioni sono state provate, si consiglia di verificare su piccola scala la compatibilità chimico-fisica e la selettività della miscela.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

In caso di dubbio e di varietà poco diffuse e di recente acclimatazione si consiglia di eseguire preventive prove parcellari.

Nei terreni più leggeri, in seguito ad eccessive precipitazioni, possono verificarsi temporanei effetti fitotossici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SIOLCID 25LIQUIDO EMULSIONABILE -
DISERBANTE SELETTIVO

SIOLCID 25

Registrazione Ministero della Sanità n. 1998 del 04.09.1975

SIAPA - via Yser, 16 - Roma

COMPOSIZIONE

Linuron puro	g. 25 (= 253 g/l)
Coformulanti*	q.b. a g. 100

* contiene xilene e cicloesano

Partita numero:


Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20 L

Stabilimento di produzione:

SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

SILIA - Aprilia (Latina)

**II CLASSE****NOCIVO**

Infiammabile. - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. - Irritante per la pelle. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subiterno ed ematuria..
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il SIOLCID 25 è un diserbante selettivo specifico per la distruzione delle specie erbacee annuali infestanti le colture di mais, carota, sedano, rapa, patata, fagiolo, fagiolino, asparago, carciofo, finocchio, soia e girasole. Il SIOLCID 25 esplica la sua azione per via radicale e per via fogliare. In base alle nostre attuali conoscenze ed in condizioni pedoclimatiche normali (terreno di medio impasto sufficientemente umido, ben lavorato e smiuzzato nello strato superficiale, in ambiente mediamente piovoso) il SIOLCID 25 combatte:

Giavone, Setaria, Amaranto, Digitaria, Farinello, Persicaria, Erba Porcellana, Camomilla, Veronica, Senape, Mercurella, Galinsoga, Borsa Pastore, Morella, Erba Paperina, Plantaggine, Falso Convolvolo, Euforbia. Il SIOLCID 25 alle dosi selettive per le colture non combatte le erbe perennanti ad apparato radicale bulboso, profondo e rizomatoso, tipo: Convolvolo, Sorghum halepense, Gramigna, Cipollino, Cardo campestre, Equi-

seto, Soffione. Alle normali dosi d'impiego la persistenza nel terreno del SIOLCID 25 non supera i 2-3 mesi, per cui si ha una buona persistenza di azione, senza pericolo alcuno di inconvenienti per le colture che seguono nella rotazione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

MAIS: Il SIOLCID 25 si impiega solo in pre-emergenza, subito dopo la semina o al massimo dopo 2-3 giorni. Nei terreni di medio impasto il prodotto si impiega solo in miscela con altri diserbanti autorizzati sulla coltura, alla dose di 1,7 l/ha. Nei terreni torbosi e argillosi la dose di impiego è di 1,7-2,2 l/ha. Si possono anche diserbare mais di secondo raccolto e da foraggio, senza timore alcuno di danni per le colture successive seminate o trapiantate 2-3 mesi dopo il trattamento. Una semina relativamente profonda (4-5 cm.) ed uniforme garantisce in ogni caso i migliori risultati, soprattutto in condizioni di eccessiva piovosità.

CAROTA: Impiego in pre-emergenza: la dose non deve superare i 3,5 l per ettaro effettuando il trattamento prima della germinazione del seme che deve essere ben coperto dal terreno.

Impiego in post-emergenza: la dose varia da 2,6 a 3,8 l per ettaro in 400-600 litri di acqua ed il trattamento si effettua a partire da quando le carote hanno completamente formato il secondo palco fogliare (4 foglie vere) scegliendo il momento e la dose idonei in funzione dello sviluppo delle infestanti. Non trattare in giornate eccessivamente calde o soleggiate. Impiego misto in pre e post-emergenza: si consiglia la dose di 2,2 l per ettaro dopo la semina, in pre-emergenza ed una seconda applicazione alla stessa dose quando le piante hanno differenziato le 4 foglie vere (dopo circa un mese dalla nascita delle piantine).

SEDANO: 1,7-3,5 l/ha in pre-emergenza oppure in post-emergenza o post-trapianto con coltura allo stadio di almeno 4 foglie vere e dopo la crisi di trapianto.

RAPA: 1,7-3,5 l/ha in post-trapianto dopo il superamento della crisi di trapianto.

PATATA: Il SIOLCID 25 s'impiega in pre-emergenza, nell'intervallo che intercorre tra la semina e l'emergenza della coltura dal terreno, alla dose di 2,2-3,8 l/ha solo in miscela con altri formulati autorizzati sulla coltura.

ASPARAGO: trattare il terreno già sistemato prima della fuoriuscita dei turioni, alla dose di 1,7-3,5 l/ha.

FAGIOLO, FAGIOLINO: In pre-emergenza alle seguenti dosi: 1,4-1,7 l/ha (terreni leggeri); 2 l/ha (terreni di medio impasto); 2,2 l/ha (terreni pesanti).

CARCIOFO:

- nuovo impianto: 1,3-2,4 l/ha dopo la messa a dimora degli ovuli e prima della fuoriuscita dei germogli dal terreno;

- nuovo impianto riprodotto per carducci: 1,7-2,6 l/ha, 15-25 giorni dopo la messa a dimora dei carducci;

- coltura di vecchio impianto: 2-2,6 l/ha alla ripresa vegetativa, prima che i germogli raggiungano la lunghezza di 15-20 cm (le prime foglie possono ustionarsi, ma senza alcuna conseguenza sullo sviluppo della coltura).

FINOCCHIO: Il SIOLCID 25 si impiega in post-emergenza a partire da quando la coltura ha differenziato la quarta foglia vera, alla dose di 0,8-1,7 l/ha

SOIA: 0,8-1,5 l/ha in pre-emergenza della coltura.

GIRASOLE: 1,5-2,2 l/ha in pre-emergenza della coltura.

Le dosi d'impiego per ettaro variano con la composizione del terreno: di quelle da noi consigliate quella minima è valida per terreni leggeri, sabbiosi e moderatamente dotati di sostanza organica, quella massima per terreni pesanti o ricchi di sostanza organica.

Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto in sostanza organica inferiore all'1%.

L'effetto erbicida è sempre in stretta relazione al perfetto livellamento e sminuzzamento della superficie del terreno ed allo stato di umidità di quest'ultimo. Se il terreno non è ben sminuzzato e livellato e ben dotato di riserve idriche prima della semina, i semi e le piantine delle infestanti possono sfuggire all'azione del prodotto. Se l'umidità del terreno è insufficiente bisogna ripristinarla ricorrendo ad una moderata irrigazione per aspersione o per scorrimento. Una leggera pioggia dopo il trattamento favorisce l'azione del diserbante. Evitare però eccessivi apporti di acqua che, come le violente precipitazioni dopo il trattamento, possono arrecare danni alle colture. Dopo il trattamento non effettuare per qualche tempo lavorazioni sulla superficie irrorata; nel caso in cui il terreno tenda ad incrostarsi eccessivamente è consigliabile ricorrere ad una rullatura unicamente per smuovere la superficie, senza effettuare lavorazioni che porterebbero in profondità il diserbante annullando la sua azione. Eseguire il diserbo in giornate poco ventilate.

Preparare accuratamente il letto di semina.

Seminare uniformemente e più profondamente possibile in relazione alla specie coltivata.

Negli impieghi in pre-emergenza non irrorare su terreno secco nello strato superficiale. Irrorare unicamente colture escluse e ad investimento e sviluppo regolari.

Evitare super dosaggi e sovrapposizioni durante i trattamenti. Il SIOLCID 25 si irrori con le normali pompe comunemente impiegate per i diserbanti avendo cura di usare ugelli a getto sottile ed uniforme.

Per la preparazione della poltiglia non occorrono accorgimenti particolari. Nel caso di pompe provviste di agitatore meccanico si può versare il prodotto direttamente nel serbatoio previamente riempito per 2/3 del quantitativo di acqua richiesto, aggiungendo quindi il rimanente. Per gli altri tipi di pompe stemperare prima il prodotto in poca acqua ed agitando energicamente raggiungere il volume richiesto.

Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SIOLCID 25 è miscibile con i normali diserbanti di comune impiego sulle colture indicate. Tuttavia siccome non tutte le possibili combinazioni sono state provate, si consiglia di verificare su piccola scala la compatibilità chimico-fisica e la selettività della miscela.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Su colture sane, per le quali viene consigliato, in normali condizioni di ambiente e di impiego, il prodotto non ha dimostrato fitossicità. In caso di dubbio e di varietà poco diffuse e di recente acclimatazione si consiglia di eseguire preventive prove parcellari.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

Ditta: SILIA**Principio attivo:****CLOROTALONIL****LINURON****Presidio sanitario:****SILBOT
SILCRIT CX
SILCRIT F
SILCRIT TRE
SILCUR C
SILDAZIM C****SILOCID
SILTRIN**

SILBOT

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
FUNGICIDA ORGANICO PER LE MALATTIE DEL POMODORO
E DELLE PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI

SILBOT

Registrazione Ministero della Sanità n. 6041 del 12.09.1984

SILIA S.p.A. - via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina)

COMPOSIZIONE

Clorotalonil puro	g. 30 (= 377 g/l)
Proclimidone puro	g. 15 (= 189 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100

Partita numero:


Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 1 - 5 - L

Stabilimento di produzione: - SILIA - Aprilia (Latina) - SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)



II CLASSE



NOCIVO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotalonil 30%, Proclimidone 15%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CLOROTALONIL: Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia. PROCIMIDONE: —
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è frutto dell'associazione di due principi attivi ad azione di copertura e dotati di alta resistenza al dilavamento: Clorotalonil e Proclimidone. SILBOT è attivo contro moltissime malattie (ad eccezione dell'oidio) ed è dotato di azione acaro-frenante.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego di modo da mantenere costante la quantità di prodotto per unità di superficie.

Pomodoro (in campo ed in serra) contro Peronospora (*Phytophthora* spp.), Alternariosi (*Alternaria* solani), Septoriosi (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Sclerotinia e Rhizoctonia spp.: ml 200-250/ha d'acqua.

Floreali ed ornamentali (ad eccezione del ciclamino) contro Peronospora (*Peronospora* spp.), Ruggine (*Puccinia* spp.), Alternaria (*Alternaria* spp.), Cladosporiosi (*Cladosporium* spp.) e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Ascochyta spp., ecc: ml 200-250/ha d'acqua.

AVVERTENZE:

Su pomodoro non superare i tre trattamenti annui in pieno campo e cinque in serra.
Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più diffusi fitofarmaci utilizzati in agricoltura ad eccezione degli oli bianchi e dei concimi fogliari a base di boro. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi e modalità di etichetta non è fitotossico. Tuttavia, sulle ornamentali è consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari su varietà di nuova introduzione.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciogliere a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SILCRIT CX

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WDG)
FUNGICIDA ORGANICO PER LE MALATTIE DEL POMODORO E DELLA PATATA

SILCRIT CX

Registrazione Ministero della Sanità n. 6989 del 04.03.1987

SILIA S.p.A. - via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina)

COMPOSIZIONE	
Clorotalonil puro	g. 35
Cimoxanil puro	g. 3,5
Coformulanti	q.b. a g. 100.


Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,250 - 1 - 5 Kg.

Prodotto nello Stabilimento di: UCB S.p.A. Gand (Belgio)

e Confezionato nello Stabilimento: SILIA - Aprilia (Latina) - SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

**II CLASSE****NOCIVO**

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLOROTALONIL 35%, CIMOXANIL 3,5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOROTALONIL: Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

CIMOXANIL: Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica..

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è frutto dell'associazione di due principi attivi a differente meccanismo d'azione: Clorotalonil e Cimoxanil. Il Cimoxanil è dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante, e penetra molto rapidamente all'interno della vegetazione irrorata. Il Clorotalonil è dotato di attività preventiva ed alta resistenza al dilavamento. Il SILCRIT CX è attivo contro moltissimi funghi che colpiscono le piante orticole ad eccezione dell'oidio ed è dotato di azione acaro-frenante.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Le quantità indicate sono riferite ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

Pomodoro (in campo ed in serra) contro Peronospora (Phytophthora spp.), Alternariosi (Alternaria solani), Septoriosi (Septoria lycopersici), Botrytis cinerea e Cladosporiosi (Cladosporium fulvum): g 250-285/100 l di acqua.

Patata (in pieno campo) contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternariosi (Alternaria solani), Botrytis: g 250-285/100 l di acqua,

AVVERTENZE:

Su pomodoro non superare i 5 trattamenti annui in serra ed i 3 trattamenti annui in campo. Su patata non superare i 2 trattamenti annui.

Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITA'**

Non miscelare con prodotti alcalini.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto non è fitotossico

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SILCRIT F

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA AD ATTIVITA' PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DI NUMEROSE MALATTIE FUNGINE DI ALCUNE COLTURE ORTICOLE ED ORNAMENTALI

SILCRIT F

Registrazione Ministero della Sanità n. 7007 del 17.03.1987

SILIA S.p.A. - via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina)

COMPOSIZIONE


Clorotalonil puro	g. 35 (= 420g/l)
Fenarimol puro	g. 1 (= 12 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100

Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,100 - 0,500 - 1 - 5 L

Stabilimento di produzione: - SILIA - Aprilia (Latina) - SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

**II CLASSE****NOCIVO**

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Treatasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotalonil 35%, Fenarimol 1%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOROTALONIL: Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

FENARIMOL: —

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antidoverni.

CARATTERISTICHE

SILCRIT F è un formulato frutto dell'associazione di due principi attivi a differente meccanismo fungicida con conseguente sinergismo di azione. Il Fenarimol è dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante, mentre il Clorotalonil è dotato di attività preventiva, azione acaro frenante ed alta resistenza al dilavamento.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

Cocomero, melone, cetriolo (in campo ed in serra) contro Antracnosi (Colletotrichum spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Botrytis cinerea, Dydimella spp. ed Oidio (Erysiphe chioracearum): ml 250-350/ha d'acqua.

Pisello contro oidio (Erysiphe polygoni), peronospora (Peronospora pisi), Muffa grigia (Botrytis cinerea), Antracnosi (Colletotrichum spp.): ml 250-280/ha di acqua.

Florali ed ornamentali (in campo ed in serra) contro Antracnosi (Colletotrichum spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Peronospora, Botrytis cinerea, Dydimella spp., Septoria, Alternaria ed Oidio: ml 150-350/ha d'acqua.

AVVERTENZE

Su cocomero, melone e cetriolo non superare i tre trattamenti annui. Su pisello non superare i 2 trattamenti annui.

Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITA'**

Il prodotto è compatibile con i più diffusi fitofarmaci utilizzati in agricoltura, ad eccezione degli oli bianchi e dei concimi fogliari a base di boro. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi e modalità di etichetta non è fitotossico. Sulle piante floreali ed ornamentali è necessario tuttavia effettuare saggi preliminari prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SILCRIT TRE

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WDG)
FUNGICIDA ORGANICO PER LE MALATTIE DI POMODORO E PATATA

SILCRIT TRE

Registrazione Ministero della Sanità n. 7093 del 26.05.1987

SILIA S.p.A. - via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina)

COMPOSIZIONE	
Clorotalonil puro	g. 20
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)	g. 27
Cimoxanil puro	g. 2
Coformulanti	q.b. a g. 100




Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.
Contenuto: 0,250 - 1 - 5 Kg.

Prodotto nello Stabilimento di: UCB S.p.A. Gand (Belgio)
e confezionato nello Stabilimento: - SILIA - Aprilia (Latina)
- SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

II CLASSE



NOCIVO

Nocivo a contatto con la pelle per ingestione. - Irritante per gli occhi. - Possibilità di effetti irreversibili. - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in appositi recipienti, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLOROTALONIL 20%, RAME 27%, CIMOXANIL 2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLOROTALONIL: Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
CIMOXANIL: Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono orlati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è frutto dell'associazione di tre principi attivi a differente meccanismo d'azione: Clorotalonil, Cimoxanil e Rame. Il Cimoxanil è dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante, e penetra molto rapidamente all'interno della vegetazione infestata. Il Clorotalonil è dotato di attività preventiva ed alta resistenza al dilavamento. Il Rame allarga lo spettro del prodotto alla batteriosi, oltre a controllare numerose malattie fungine. SILCRIT TRE è attivo contro moltissimi funghi e batteri che colpiscono le piante orticole ed è dotato di azione acarofrenante.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

Pomodoro (in campo ed in serra) contro Peronospora (Phytophthora spp.), Alternariosi (Alternaria solani), Septoriosi (Septoria lycopersici), Botrytis cinerea, Rhizoctonia spp., Cladosporiosi (Cladosporium fulvum) e Batteriosi: g 450-500/100 l di acqua.
Patata (in pieno campo) contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternariosi (Alternaria solani), Botrytis e batteriosi: g 450-500/100 l di acqua

AVVERTENZE:

Su pomodoro non superare i 5 trattamenti annui in serra e 3 in campo. Su patata non superare i 2 trattamenti annui.

Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più diffusi fitofarmaci utilizzati in agricoltura, ad eccezione degli oli bianchi e dei concimi fogliari a base di boro. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi e modalità di etichetta non è fitotossico.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SILCUR C**(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
FUNGICIDA CUPRORGANICO PER LE MALATTIE DEGLI ORTAGGI****SILCUR C**

Registrazione Ministero della Sanità n. 7167 del 3.07.1987

SILIA S.p.A. - via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina)

COMPOSIZIONE	
Clorotalonil puro	g. 20 (= 317 g/l)
Rame metallico puro (sotto forma di ossicloruro)	g. 20 (= 317 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100




Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 1 - 5 - 20 L.

Stabilimento di produzione: - SILIA - Aprilia (Latina) - SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

II CLASSE**NOCIVO**

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Irritante per gli occhi. - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. - Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In casi di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corai d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazioni delle seguenti sostanze attive: CLOROTALONIL 20%, RAME 20%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLOROTALONIL. Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
RAME. Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
 Terapia: sintomatica.
 Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida ad azione preventiva, con un vasto spettro d'azione, dotato di alta persistenza e resistenza al dilavamento. In considerazione della sua azione polivalente, l'applicazione del prodotto permette il controllo temporaneo di numerosi funghi parassiti, non tracheomicotici, della parte aerea delle colture, ad eccezione dell'oidio. Grazie alla presenza nella miscela del Clorotalonil, il prodotto svolge una buona azione acarica frenante.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

Sedano (in campo ed in serra): contro Septoriosi (Septoria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Botrytis cinerea e Batteriosi: ml 250-400/100 l di acqua.

Pomodoro (in campo ed in serra): contro Peronospora (Phytophthora spp.), Alternariosi (Alternaria solani), Septoriosi (Septoria lycopersici), Cladosporiosi (Cladosporium fulvum), Botrytis cinerea e Batteriosi: ml 250-400/100 l di acqua.

Cocomero, melone, e cetriolo (in campo ed in serra): contro Antracnosi (Colletotrichum spp.), Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Botrytis cinerea, Didymella spp. e Cladosporiosi (Cladosporium spp.) e Batteriosi: ml 250-400/100 l di acqua.

Fagiolo, pisello, e fagiolo (in pieno campo): contro Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Uromyces spp.), Botrytis cinerea, Ascochyta spp., Peronospora (Peronospora spp.) e Batteriosi: ml 250-350/100 l di acqua.

Cipolla (in pieno campo): contro Peronospora (Peronospora spp.), Ruggine (puccinia spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Botrytis spp., Sclerotium cepivorum ecc. e Batteriosi: ml 250-400/100 l di acqua.

Patata (in pieno campo): contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternariosi (Alternaria solani), Botrytis cinerea e Batteriosi: ml 250-400/100 l di acqua.

Fiorelli ed ornamentali (in campo ed in serra): contro Peronospora (Phytophthora spp.), Alternariosi (Alternaria solani), Cladosporiosi (Cladosporium fulvum), Botrytis cinerea e Batteriosi: ml 250-400/100 l di acqua.

AVVERTENZE:

Su sedano, cocomero, melone, cetriolo e pomodoro in campo non superare i tre trattamenti annui. Su pomodoro in serra non superare i cinque trattamenti annui. Su cipolla, patata, fagiolo, pisello e fagiolo non superare i due trattamenti annui.
 Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITA'**

Il prodotto è compatibile con i più diffusi fitofarmaci utilizzati in agricoltura, ad eccezione degli oli bianchi e dei concimi fogliari a base di boro. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto, alle dosi ed alle modalità di etichetta, non è fitotossico. Nelle colture floreali ed ornamentali, data la molteplicità delle specie e delle varietà coltivate, è necessario effettuare prove preliminari di selettività su superfici limitate, prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciogliere a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SILDAZIM C

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA ORGANICO PER IL CONTROLLO DI NUMEROSE MALATTIE DEL MELO, DEL PERO, DEL PESCO, DEL SUSINO E DELLE COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI.**SILDAZIM C**

Registrazione Ministero della Sanità n. 6886 del 14.11.1986


SILIA S.p.A. - via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina)

COMPOSIZIONE	
Clorotalonil puro	g. 20 (= 246 g/l)
Carbendazim puro	g. 10 (= 123 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100

Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 1 - 5 L

Stabilimento di produzione:
- SILIA - Aprilia (Latina) - SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)**II CLASSE****NOCIVO**

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. - Possibilità di effetti irreversibili. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di faccette filtranti.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLOROTALONIL 20%, CARBENDAZIM 10%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOROTALONIL
Sintomi: Irritazione per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

CARBENDAZIM
Sintomi: Non si conoscono casi di intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il SILDAZIM C è un fungicida frutto della miscela di due principi attivi a differente meccanismo e modalità di azione. Il Clorotalonil è dotato di attività preventiva, alta resistenza al dilavamento ed azione acarofrenante, mentre il Carbendazim è dotato di attività curativa, preventiva e di sistemica acropeta.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (20 hl/ha sui fruttiferi e 10 l/ha. sulle fioricole ed ornamentali). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.

Pomacee (melo e pero) contro Monilia, Muffa grigia, Ticchiolatura, Alternaria, Gloeosporium: intervenire alla dose di 200 ml per 100 litri di acqua nei periodi più favorevoli alla malattia.

Drupacee (pesco e susino) - contro Monilia dei fiori: effettuare 1-2 interventi all'inizio od a fine fioritura alla dose di 200 ml per 100 l di acqua. - contro Monilia dei frutti: intervenire in pre-raccolta quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia (piogge o bagnature) alla dose di 200 ml per 100 l di acqua. - contro Nerume o Ticchiolatura (Cladosporium carpophilum) e ruggini (Tranzschelia pruni-spinosa):

Intervenire alla comparsa dei primissimi sintomi alla dose di 200 ml per 100 litri d'acqua.

Culture fioricole ed ornamentali in serra ed in pieno campo contro Muffa grigia, Oidio, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Ruggini, Ticchiolatura, Septoriosi, Fusariosi: intervenire alla dose di 300-500 ml per 100 l di acqua, iniziare i trattamenti al primo apparire delle condizioni favorevoli alle malattie e ripeterli ogni 7-14 giorni secondo necessità.

AVVERTENZE:

Su pero, melo, pesco e susino non superare i 4 trattamenti annui. Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITA'**

Non effettuare miscele con olii minerali e con antiparassitari a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Prima di procedere al trattamento assicurarsi che siano trascorsi almeno 20 giorni da un eventuale precedente irrorazione con olio minerale.

Sulle colture floreali ed ornamentali, dato il grande numero di varietà e di specie coltivate, è consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari su piccole superfici prima di generalizzare il trattamento.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SILOCID

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
DISERBANTE SELETTIVO

SILOCID

Registrazione Ministero della Sanità n. 3352 del 20.11.1979

SILIA S.p.A. - via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina)

COMPOSIZIONE

Linuron puro g. 37,6 (= 440 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita numero:


Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,250 - 1 L.

Stabilimento di produzione: - SILIA - Aprilia (Latina) - SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)



III CLASSE



IRRITANTE

Irritante per la pelle. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale filtrante.
- Preparare la miscela in contenitori appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli destinati ad altri usi agricoli, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni...

CARATTERISTICHE

Il SILOCID è un diserbante selettivo specifico per la distruzione delle specie erbacee annuali infestanti le colture di mais, asparago, sedano, fagiolo, fagiolino, rapa, carota, patata, carciofo, finocchio, soia e girasole. Il SILOCID esplica la sua azione per via radicale e per via fogliare. In base alle nostre attuali conoscenze ed in condizioni pedoclimatiche normali (terreno di medio impasto sufficientemente umido e ben lavorato e sminuzzato nello strato superficiale, in ambiente mediamente piovoso) il SILOCID combatte: Glavone, Setaria, Amarantho, Digitaria, Farinello, Persicaria, Erba Porcellana, Camomilla, Veronica, Senape, Mercurella, Galinsoga, Borsa Pastore, Morella, Erba Paperina, Piantaggine, Falso Convolvolo, Euforbia, Rafano, Centocchio, Senecio, Anagallide, Papavero, Poa. Il SILOCID alle dosi selettive per le colture non combatte le erbe perennanti ad apparato radicale bulboso, profondo e rizomatoso. Alle normali dosi d'impiego la persistenza nel terreno del SILOCID non supera i 2-3 mesi, per cui si ha una buona persistenza di azione, senza pericolo alcuno di inconvenienti per le colture che seguono nella rotazione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Mais: Il SILOCID s'impiega solo in pre-emergenza subito dopo la semina o al massimo dopo 2-3 giorni. Nei terreni di medio impasto il prodotto si impiega solo in miscela con altri diserbanti autorizzati sulla coltura alla dose di 1 l/ha. Nei terreni torbosi o argillosi la dose di impiego è di 1-1,3 l/ha. Si possono anche diserbare mais di secondo raccolto e da foraggio, senza timore alcuno di danni per le colture successive seminate o trapiantate 2-3 mesi dopo il trattamento. Una semina relativamente profonda (4-5 cm.) ed uniforme garantisce in ogni caso i migliori risultati, soprattutto in condizioni di eccessiva piovosità.

Carota: Impiego in pre-emergenza: la dose non deve superare i 2 per ettaro effettuando il trattamento prima della germinazione del seme che deve essere ben coperto dal terreno. Impiego in post-emergenza: la dose varia da 1,5 a 2,2 l per ettaro ed il trattamento si effettua a partire da quando le carote hanno completamente formato il secondo palco fogliare (4 foglie vere) scegliendo il momento e la dose idonei in funzione dello sviluppo delle infestanti. Non trattare in giornate eccessivamente calde o soleggiate. Impiego misto in pre e post-emergenza: si consiglia la dose di 1,3 per ettaro in pre-emergenza ed una seconda applicazione alla stessa dose quando le piante hanno differenziato le 4 foglie vere (dopo circa un mese dalla nascita delle piantine).

Sedano: 1-2 l/ha in pre-emergenza oppure in post-emergenza o post-trapianto con coltura allo stadio di almeno 4 foglie vere e dopo la crisi di trapianto.

Rapa: 1-2 l/ha in post-trapianto dopo che la coltura ha superato la crisi di trapianto.

Patata: Il SILOCID s'impiega in pre-emergenza, nell'intervallo che intercorre tra la semina e l'emergenza della coltura dal terreno, alla dose di 1,3-2,2/ha solo in miscela con altri formulati autorizzati sulla coltura.

Asparago: trattare il terreno già sistemato prima della fuoriuscita dei turioni, alla dose di 1-2 l/ha.

Carciofo:

- coltura di nuovo impianto: 0,8-1,4 l/ha dopo la messa a dimora degli ovuli e prima della fuoriuscita dei germogli dal terreno;
- coltura di nuovo impianto riprodotta per carducci: 1-1,5 l/ha, 15-25 gg dopo la messa a dimora dei carducci;
- coltura di vecchio impianto: 1,2-1,5 l/ha alla ripresa vegetativa, prima che i germogli raggiungano la lunghezza di 15-20 cm (le prime foglie possono ustionarsi, ma senza alcuna conseguenza sullo sviluppo della coltura).

Fagiolo, fagiolino: in pre-emergenza alle seguenti dosi: 0,8-1 l/ha (terreni leggeri); 1,2 l/ha (terreni di medio impasto); 1,3 l/ha (terreni pesanti).

Finocchio: il SILOCID s'impiega in post-emergenza a partire da quando la coltura ha differenziato la quarta foglia vera, alla dose di 0,5-1 per ettaro.

Sola: il SILOCID s'impiega in pre-emergenza alla dose di 0,5-0,9 l/ha. Ridurre il dosaggio su terreni particolarmente sabbiosi.

Girasole: il SILOCID s'impiega in pre-emergenza alla dose di 0,9-1,3 l/ha.

Le dosi d'impiego per ettaro variano con la composizione del terreno: di quelle da noi consigliate quella minima è valida per terreni leggeri, sabbiosi e moderatamente dotati di sostanza organica, quella massima per terreni pesanti o ricchi di sostanza organica.

Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto in sostanza organica inferiore all'1%.

L'effetto erbicida è sempre in stretta relazione al perfetto livellamento e aminuzzamento della superficie del terreno ed allo stato di umidità di quest'ultimo. Se il terreno non è ben aminuzzato e livellato e ben dotato di riserve idriche prima della semina, i semi e le piantine della infestanti possono sfuggire all'azione del prodotto. Se l'umidità del terreno è insufficiente bisogna ripristinarla ricorrendo ad una moderata irrigazione per aspersione o per scorrimento. Una leggera pioggia dopo il trattamento favorisce l'azione del diserbante. Evitare però eccessivi apporti di acqua che, come le violente precipitazioni dopo il trattamento, possono arrecare danni alle colture. Dopo il trattamento non effettuare per qualche tempo lavorazioni sulla superficie irrorata; nel caso in cui il terreno tenda ad incrostarsi eccessivamente è consigliabile ricorrere ad una rullatura unicamente per smuovere la superficie, senza effettuare lavorazioni che porterebbero in profondità il diserbante annullando la sua azione. Eseguire il diserbo in giornate poco ventilate. Preparare accuratamente il letto di semina. Seminare uniformemente e più profondamente possibile in relazione alla specie coltivata. Negli impieghi in pre-emergenza non irrorare su terreno secco nello strato superficiale. Irrorare unicamente colture asciutte e ad investimento e sviluppo regolari. Evitare super dosaggi e sovrapposizioni durante i trattamenti. Il SILOCID si irrora con le normali pompe comunemente impiegate per i diserbanti avendo cura di usare ugelli a getto sottile ed uniforme. Per la preparazione della poltiglia non occorrono accorgimenti partico-

lari. Nel caso di pompe provviste di agitatore meccanico si può versare il prodotto direttamente nel serbatoio previamente riempito per 2/3 del quantitativo di acqua richiesta, aggiungendo quindi il rimanente. Per gli altri tipi di pompe stemperare prima il prodotto in poca acqua ed agitando energicamente raggiungere il volume richiesto. Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto. Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SILOCID è miscibile con i principali diserbanti di comune impiego sulle colture indicate. Tuttavia, siccome non tutte le possibili combinazioni sono state provate, si consiglia di verificare su piccola scala la compatibilità chimico-fisica e la selettività della miscela.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

In caso di dubbio e di varietà poco diffuse e di recente acclimatazione si consiglia di eseguire preventive prove parcellari.

Nei terreni più leggeri, in seguito ad eccessive precipitazioni, possono verificarsi temporanei effetti fitotossici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

SILTRIN

LIQUIDO EMULSIONABILE

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO IN PRE-EMERGENZA DI INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI IN COLTURE DI CEREALI A SEMINA AUTUNNO/INVERNALE, SOIA E GIRASOLE

SILTRIN

Registrazione Ministero della Sanità n. 4788 del 3.06.1982

SILIA S.p.A. - via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina)

COMPOSIZIONE

Trifluralin puro	g. 23,5 (= 240 g/l)
Linuron puro	g. 11,75 (= 120 g/l)
Coformulanti*	q.b. a g. 100

* contiene xilene


Partita numero:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20 L

Stabilimento di produzione: - SILIA - Aprilia (Latina) - SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

II CLASSE



NOCIVO

Infiammabile. - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:

- Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito di mangimi.
- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Trifluralin 23,5%, Linuron 11,75%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

TRIFLURALIN: —

LINURON:

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

durante il completamento del riempimento. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare una qualsiasi attrezzatura irrorante a bassa pressione (1,5-0,5 Atm) provvista di barra e di ugelli per erbicidi e di una pompa di capacità adeguata ad assicurare una buona agitazione durante l'irroramento. Si raccomanda di montare un'efficiente valvola di chiusura per impedire la eccessiva fuoriuscita del prodotto nelle fasi di partenza, di svolta e di fermata. Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto venga distribuito uniformemente.

SOIA

Il SILTRIN deve essere applicato in pre-emergenza della coltura, alle dosi di 3-3,8 litri per ha.

GIRASOLE

Il SILTRIN deve essere applicato in pre-emergenza alla dose di 3-3,8 litri per ha.

ISTRUZIONI SPECIALI:

Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin in miscela con Linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza, cavoli, spinacio. Non seminare bistola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Il prodotto inoltre, non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore a 1%.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SILTRIN si impiega da solo.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in locali a temperatura superiore ai 5°C.

Non conservare presso sorgenti di calore o fuoco.

Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature-versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL SILTRIN

INFESTANTI CONTROLLATE:

Graminacee annuali: Alopecurus agrestis - Alopecurus myosuroides - Alopecurus pratensis - Apera spica-venti - Briza minor - Lolium multiflorum - Poa annua - Poa spp. Dicotiledoni annuali: Alchemilla arvensis - Anagallis arvensis - Arabidopsis thaliana - Capsella bursa-pastoris - Cerastium arvense - Juncus bufonius - Lamium purpureum - Lamium amplexicaule - Lithospermum arvense - Matricaria chamomilla - Matricaria inodora - Myosotis arvensis - Myosurus minimum - Papaver rhoeas - Polygonum aviculare - Raphanus raphanistrum - Sinapis arvensis - Sonchus asper - Specularia speculum - Stellaria media - Thlaspi arvense - Valerianella auricula - Veronica spp. Il SILTRIN non controlla: Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis, Agropyron repens, Cirsium spp. e Tussilago farfara.

COLTURE PROTETTE:

Frumento, a semina autunno-invernale, duro e tenero. Orzo a semina autunno-invernale. Segale a semina autunno-invernale. Soia - Girasole.

CEREALI (frumento, segale, orzo)

EPOCA D'IMPIEGO: Il SILTRIN deve essere usato dopo la semina e prima della emergenza della coltura da trattare.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE: Il SILTRIN deve essere distribuito per irrorazione e non deve essere incorporato nel terreno.

PREPARAZIONE DEL TERRENO: Per ottenere i migliori risultati il letto di semina deve essere ben preparato, eliminando le zolle grosse, e tutti i semi devono essere ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme, soprattutto in previsione di anomale condizioni climatiche (piogge violente, freddi intensi). A questo scopo in qualche caso può essere utile rullare il terreno dopo la semina e prima del trattamento.

DOSAGGI: 3-3,8 lt per ha per ogni tipo di terreno. E' comunque consigliabile la dose inferiore nei terreni sciolti. Volume di irrorazione: Applicare il SILTRIN in 200-800 litri di acqua per ha; il SILTRIN deve essere aggiunto nella botte riempita a metà di acqua ed agitato bene


Ditta: S I P C A M***Principio attivo:*****CLOROTALONIL****LINURON*****Presidio sanitario:*****CLORTONIL
CLORTOSIP
CLORTOSIP L
CLORTOSIP R
CLORTOSIP RL
FENACLOR DF
FENACLOR FL
FRUMIDOR CP
ROVER COMBI****LINURON SIPCAM FLOW
SIPLÉN B
SIPLÉN L**

CLORTONIL®

Fungicida organico in sospensione concentrata per la difesa di Pomodoro, Patata. Il prodotto esplica un'efficace azione preventiva, grazie al suo contenuto in CLOROTALONIL in speciale formulazione liquida micronizzata e curativa nei confronti della Peronospora, per la presenza di CIMOXANIL che agisce entro 2 giorni dall'inizio delle piogge e delle rugiade infestanti.

- CLORTONIL Composizione:
 - Clorotalonil puro g. 40 (= 49,2 g/litro)
 - Cimoxanil puro g. 4 (= 49,2 g/litro)
 - Coformulanti e solventi: q.b. a g. 100

CLASSE II



NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, assorbire con terra o sabbia, raccogliere con cura, lavare con acqua. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Avvertenza:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Treatasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotalonil puro 40%; Cimoxanil 4%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Clorotalonil: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

Cimoxanil: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni:

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleali

(R) marchio registrato SIPCAM - Milano
 SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e Per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
 Viale Gian Galeazzo, 3 - MILANO.

Prodotto distribuito da:

Registrazione n. 6695 del 9.5.86
 del Ministero della Sanità

Officina di produzione: . . .

. . . Litro

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n° . . .

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate diluite in acqua distribuite con pompe a volume normale:

Pomodoro:

contro Peronospora, Septoria, Tichoclatura, Antracnosi: 12-3 per ha e per applicazione; sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno in pieno campo e 5 applicazioni/anno in serra.

Patata:

contro Peronospora ed Alternaria: 1 2-3 per ha e per applicazione; sono consentite un massimo di 2 applicazioni/anno.

Preparazione della poltiglia:

versare in prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagabile di uso primaverile-estivo eccezione fatta per le miscele alcaline come Poltiglia Bordolese e Poltiglia Sulfuri. Qualora si desiderasse effettuare miscele con liquidi emulsionabili, normalmente sconsigliate, controllare la compatibilità degli stessi con prove preliminari.

Avvertenza:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

stante l'elevato numero di varietà delle specie orticole, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici, prima di passare al trattamento di superfici più ampie.

Rischi di nocività:

il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 14 gg. prima della raccolta.

Tempo di rientro dopo l'impiego: in campo: 12 ore in serra: 24 ore

Attenzione:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

STABILIMENTI AUTORIZZATI

- SIPCAM - Salerno sul Lambro (Milano)

TAGLIE AUTORIZZATE


ml. 250-500 litri 1-5-10-20

CLORTOSIP®

Fungicida organico in granuli idrodispersibili (DF) ad ampio spettro di efficacia e con alta persistenza di azione, attivo per la difesa di: Patata, Melo, Pero, Pesco, Susino, Pomodoro, Cetriolo, Cocomero, Melone, Sedano, Fiori e Colture Ornamentali. Si impiega in trattamenti liquidi contro: Botrytis, Peronospora, Tichiolatura, Alternaria, Septoria, Antracnosi di alcune colture orticole, floreali ed ornamentali; Tichiolatura del Melo e del Pero; Botrytis e Sclerotinia, Rhizopus, Gloeosporium, Penicillium del Pesco e del Susino.

- CLORTOSIP Composizione:
- Clorotaloni puro g. 75
- Coformulanti e inerti: q. b. a. g. 100

CLASSE II



NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non respirare le polveri. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non distarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Avvertenza:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di faccine filtranti. Preparare la miscela in recipienti appositi possibilmente all'aperto od in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi:
irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia sintomatica

AVVERTENZA. consultare un Centro Antiveneni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate diluite in acqua distribuite con pompe a volume normale:

POMODORO

contro Peronospora, Septoria, Tichiolatura, Alternaria, Antracnosi, Botrytis: Kg. 1-2 per ettaro e per applicazione; sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno in pieno campo e 5 applicazioni/anno in serra.

CETRIOLO, COCOMERO, MELONE

contro Antracnosi e Botrytis: Kg. 1-2 per ettaro e per applicazione; sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno sia in pieno campo che in serra.

SEDANO

contro Alternaria e Septoria: Kg. 1-2 per ettaro e per applicazione; sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno sia in pieno campo che in serra.

PATATA

contro Peronospora e Alternaria: kg. 1,3-2 per ha e per applicazione; sono consentite un massimo di 2 applicazioni/anno

COLTURE FLORICOLE (rosa, garofano, gladiolo, crisantemo) e ORNAMENTALI

contro Botrytis, Peronospora, Tichiolatura, Alternaria, Septoria: g. 150-200 per 100 litri di acqua.

MELO, PERO

contro la Tichiolatura: Kg. 0,8-1,3 per ettaro e per applicazione; sono consentite un massimo di 4 applicazioni/anno. Impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici.

PESCO, SUSINO

contro Botrytis, Sclerotinia, Rhizopus, Gloeosporium, Penicillium: - in trattamenti in vegetazione: Kg. 1-1,3 per ettaro e per applicazione.

- in trattamenti in pre-raccolta: Kg. 1-1,3 per ettaro e per applicazione. Sono consentite un massimo di 4 applicazioni/anno. Impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici. Per tutti gli impieghi sopra indicati, intervenire principalmente con trattamenti preventivi secondo normali calendari di intervento.

Preparazione della poltiglia:

semperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte. Indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile di uso primaverile-estivo occasione fatta per le miscele alcaline come Poltiglia Bordolese e Poltiglia di Solfuri. Qualora si desiderasse effettuare miscele con liquidi emulsionabili normalmente scongiurate, controllare la compatibilità degli stessi con prove preliminari.

Avvertenze:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

stante l'elevato numero di varietà delle specie orticole, floreali e frutticole, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici, prima di passare al trattamento di superfici più ampie.

Rischi di nocività:

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti: 21 giorni prima della raccolta per melo, pero, pesco, susino; 14 giorni prima della raccolta per le altre colture.

Tempo di rientro dopo l'impiego: - in campo: 12 ore - in serra: 24 ore

Attenzione:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

STABILIMENTI AUTORIZZATI
- SIPCAM PHYTEUROPE - Montreuil Belleville (Francia)


TAGLIE AUTORIZZATE
g. 200-500 Kg. 1-5-10-25

CLORTOSIP® L

Fungicida organico in sospensione concentrata, caratterizzato da una azione preventiva ad ampio spettro di efficacia e con alta persistenza di azione, attivo per la difesa di alcuni fruttiferi e ortaggi, patata, floreali ed ornamentali.

- CLORTOSIP L Composizione:
 - Clorotalonil puro g. 40 (= 492 g/litro)
 - Coformulanti e solventi: q. b. a g. 100

CLASSE II



NOCIVO

(R) marchio registrato SIPCAM - Milano
 SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e Per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
 Viale Gian Galeazzo, 3 - MILANO.

Prodotto distribuito da:

Registrazione n. 5866 del 6.4.84
 del Ministero della Sanità

Officina di produzione: ...

... Litro

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n°: ...

NATURA DEL RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, raccogliere con terra, sabbia o segatura. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi:

Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.

Terapia sintomatica

AVVERTENZA consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate distribuite con pompe a volume normale:

Pomodoro: contro Peronospora, Septoria, Ticholatura, Alternaria, Antracnosi, Botrytis: lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno in campo e 5 applicazioni/anno in serra
Cocomero, melone, ostrione: contro Antracnosi e Botrytis: lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno sia in serra che in campo

Fagiola, fagiolina, pisello: contro Peronospora, Antracnosi, Botrytis, Ruggine, Collettriccium: lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 2 applicazioni/anno in campo

Sedano: contro Alternaria e Septoria: lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno sia in campo che in serra

Cipolla: contro Peronospora, Muffa bianca e grigia, Alternaria: lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 2 applicazioni/anno in campo

Patata: contro Peronospora ed Alternaria: lt. 2-3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 2 applicazioni/anno

Mela e pere: (impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici): contro Ticholatura lt. 1.2-2 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 4 applicazioni/anno

Pesce e susino: (impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici): contro Botrytis, Sclerotinia, Rhizopus, Gloeosporium, Paecilium: in trattamenti in vegetazione lt. 1.6-2 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 4 applicazioni/anno

Culture floreali ed ornamentali contro Botrytis, Ticholatura, Ruggini, Peronospora, Antracnosi, Septoriosi, Alternariosi, Fusariosi non vascolare: ml. 200-250 per 100 litri di acqua.

Preparazione della poltiglia:

temperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:

il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari in polvere bagnabile di uso primaverile-estivo. Non è miscelabile con le miscele alcaline come Poligin Bordoiese, Polisolfuri ed oli. Dopo un trattamento con olio il prodotto può essere impiegato dopo almeno tre settimane.

Avvertenze:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Fitotossicità:

stante l'elevato numero di varietà delle specie orticole, floreali e frutticole, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici, prima di passare al trattamento di superfici più ampie. Su meli Golden Delicious e simili si può verificare una intensificazione della rugginiosità in coincidenza di imprevedibili fattori climatici.

Rischi di nocività:

il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per melo, pero, pesco e susino; 14 giorni per le altre colture.

Attenzione:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Tempi di rientro dopo l'impiego: in campo 12 ore, in serra 24 ore

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

STABILIMENTI AUTORIZZATI

- SIPCAM - Salzano sul Lambro (Milano)

TAGLIE AUTORIZZATE


ml. 250-300 litri 1-5-10

CLORTOSIP® R

Fungicida organico in granuli idrodispersibili (DF) ad ampio spettro di efficacia e con alta persistenza di azione, attivo per la difesa di: Pomodoro, Sedano, Melo, Pero, Patata, Fiori e Colture Ornamentali. Si impiega in trattamenti liquidi contro: Botrytis, Peronospora, Tichiolatura, Alternaria, Septoria, Antracnosi di alcune colture orticole, floreali ed ornamentali.

- CLORTOSIP R Composizione:
 -Clortaloniil puro g. 15
 -Rame puro g. 30
 (da Ossicloruro Tetrammico)
 -Coformulanti, coloranti ed inerti: q.b. a... g. 100

CLASSE II



NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non respirare le polveri. Non distarsi dal prodotto e dal recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Conservare il recipiente ben chiuso. Per pulire il packaging e gli oggetti contaminati da questo prodotto, raccogliere mescolando con terra o sabbia con cura, lavare con acqua.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Avvertenza:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di faccette filtranti. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto od in locali ariati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clortaloniil puro 15%; Rame (da Ossicloruro tetrammico) 30%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Clortaloniil: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.

Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emoliali. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea emetica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni: _____

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate diluite in acqua distribuite con pompe a volume normale:

POMODORO

contro Peronospora, Septoria, Tichiolatura, Alternaria, Antracnosi, Botrytis: Kg. 6,5-10 per ettaro e per applicazione; sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno in pieno campo e 5 applicazioni/anno in serra.

SEDANO

contro Alternaria e Septoria: Kg. 6,5-10 per ettaro e per applicazione; sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno sia in pieno campo che in serra.

MELO, PERO

contro la Tichiolatura: Kg. 4-6,5 per ettaro e per applicazione; sono consentite un massimo di 4 applicazioni/anno. Impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici.

PATATA

contro Peronospora e Alternaria: Kg. 6,5-10 per ettaro e per applicazione; sono consentite un massimo di 2 applicazioni/anno.

COLTURE FLOREALI (rosa, garofano, gladiolo, orientamento) e ORNAMENTALI

contro Botrytis, Peronospora, Tichiolatura, Alternaria, Septoria: g. 400-500 per 100 litri di acqua.

Per tutti gli impieghi sopra indicati, intervenire principalmente con trattamenti preventivi secondo normali calendari di intervento.

Preparazione della poltiglia:

stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile di uso primaverile-estivo eccezione fatta per le miscele alcaline come Poltiglia Bordolese e Poltiffurfi. Qualora si desiderasse effettuare miscela con liquidi emulsionabili normalmente sconsigliate, controllare la compatibilità degli stessi con prove preliminari.

Avvertenze:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

stante l'elevato numero di varietà delle specie orticole, floreali e frutticole, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici, prima di passare al trattamento di superfici più ampie.

Rischi di nocività:

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti: 21 giorni prima della raccolta per melo e pero; 20 giorni prima della raccolta per le altre colture.

Tempo di rientro dopo l'impiego: - in campo: 12 ore - in serra: 24 ore

Attenzioni:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

STABILIMENTI AUTORIZZATI
 - SIPCAM PHYTEUROPE - Montreuil Bellevue (Francia)


TAGLIE AUTORIZZATE
g. 200-500 Kg. 1-5-10-25

CLORTOSIP® RL

Fungicida organico in sospensione concentrata, caratterizzato da una azione preventiva ad ampio spettro di efficacia e con alta persistenza di azione, attivo per la difesa di: alcuni fruttiferi e ortaggi, patata, ornamentali e floreali.

- CLORTOSIP RL Composizione:
- Clortalonil puro g. 20 (= 280 g/litro)
- Rame puro g. 15 (= 210 g/litro)
(sottoforma di Ossicloruro tetramamico)
- .. Coformulanti e solventi: q.b. a g. 100

CLASSE II



NOCIVO

(R) marchio registrato SIPCAM - Milano
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e Per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - MILANO.

Prodotto distribuito da:

Registrazione n. 4742 del 2.8.82 del Ministero della Sanità

Officina di produzione: ...

... Litro

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n°: ...

NATURA DEL RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Conservare il recipiente ben chiuso. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, assorbire con terra o sabbia, raccogliere con cura, lavare con acqua. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clortalonil puro 20 %; Rame (da Ossicloruro Tetramamico) 15%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Clortalonil: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.

Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coiche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni:

AVVERTENZA: consultare un Centro Antivealei

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate distribuite con pompe a volume normale.

Mela e pere (impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici) contro la Tichiolatura (in pre-fioritura), Cancri rameali, Marciume del colletto, Ruggine:

- trattamenti invernali: 1. 3,5 per ha e per applicazione.
- trattamenti in vegetazione: 1. 2 per ha e per applicazione.

Sono consentite un massimo di 4 applicazioni

Pesce e susino (impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici) contro Corineo, Cancri rameali, Bolla, Monilia, Gloeosporium, Penicillium, Botrytis, Sclerotinia, Rhizopus, Nerume: trattamenti autunno-invernali: 1. 3,5 per ha e per applicazione.

Sono consentite un massimo di 4 applicazioni

ORTAGGI

Pomodoro contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Fusariosi non vascolari, Muffa grigia, Septoria, Rhizoctonia, Cercosporiosi: - in pieno campo e in serra: 1. 3,5-5,4 per ha e per applicazione.

Sono consentite un massimo di 3 applicazioni in campo e 5 in serra

Legumi (fagiola, fagiolina, pisello) contro Peronospora, Antracnosi, Ruggini, Collectotricum: 1. 3,5-4,3 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 2 applicazioni e solo in campo.

Cipolla contro Peronospora, Muffa bianca e grigia, Alternaria: 1. 3,5-5,4 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 2 applicazioni e solo in campo.

Patata contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Rhizoctonia, Fusariosi non vascolari: 1. 3,5-5,4 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 2 applicazioni.

Cavolflo, cavomero e melone contro Peronospora e antracnosi: 1. 3,5-5,4 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 3 applicazioni sia in campo che in serra.

Radice contro Alternaria e Septoria: 1. 3,5-5,4 per ha e per applicazione. Sono consentite un massimo di 3 applicazioni sia in campo che in serra.

Colture ornamentali contro Botrytis, Tichiolatura, Ruggini, Peronospora, Antracnosi, Septoriosi, Alternariosi, Fusariosi non vascolari: ml. 275-425 per 100 litri di acqua.

Preparazione della poltiglia:

Stampare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua e parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile di uso primaverile-estivo eccettuata fatta per la miscela alcinone come Poltiglia lardolea, Poltiture ed oli. Dopo un trattamento con olio il prodotto può essere impiegato dopo almeno 3 settimane.

Avvertenze:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi possibilmente all'aperto o in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle contenitori vuoti e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in presenza di venti d'acqua.

Fitotossicità:

esente (elevato numero di varietà delle specie ortive, floreali, ornamentali e infuocole, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare al trattamento di superfici più ampie. Su vite accertare prima un eventuale sensibilità varietale delle uve bianche, specie da tavola. Non si deve trattare durante la fioritura; su alcune varietà di melo (Abbondanza 'Bellard', Black Stayman, Comerolo, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morigindul, Stayman, Stayman Red, Stayman Wineap, Black Davis, King Davis, Rametta del Canada, Rosa Marilovana) e di pere (Abate Fetel, Buona Lugia d'Arnanova, Butira Calopau, Passerama, S.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Ciapp, Kaiser, Juliana, Giffard cuprescens), il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su melo Golden Delicious e simili si può verificare una intensificazione della rugginosità in coincidenza di imprevedibili fattori climatici.

Rischi di nocività:

Il prodotto è tossico per i pesci. E' nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta; sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per pomacee e drupacee.

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Tempi di rientro dopo l'impiego: in campo 12 ore, in serra 24 ore.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

STABILIMENTI AUTORIZZATI

- SIPCAM - Salemaso sul Lambro (Milano)
- INAGRA - Susca (Spagna)

TAGLIE AUTORIZZATE


- litri 0,250-0,500-1-5-10
- litri 0,250-0,500-1-5-10

FENACLOR[®] DF

Fungicida organico in granuli idrodispersibili (DF) per la difesa di Melo, Pero, Pesco, Pomodoro, Cetriolo, Cocomero, Melone e Colture floreali. Si impiega in trattamenti liquidi contro: Tichiolatura, Botrytis, Oidio, Peronospora, Aternaria, Septoria, Monilia.

- FENACLOR DF Composizione:
- Clorotaloni puro g. 40
- Fenarimol puro g. 4
- Coformulanti ed inerti: q. b. a. g. 100

CLASSE II



NOCIVO

(F) marchio registrato SIPCAM - Milano
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e Per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - MILANO.

Prodotto distribuito da:

Registrazione n. 6104 del 19.10.84
del Ministero della Sanità

Officina di produzione:

..... Kg

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n°:

NATURA DEL RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non respirare le polveri. Non distarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corai d'acqua.

Avvertenza:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli edibili ed altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corai d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotaloni puro 40%; Fenarimol puro 4%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Clorotaloni: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

Fenarimol:

Terapia sintomatica

Controindicazioni:

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveneni

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate diluite in acqua distribuite con pompe a volume normale

POMODORO

contro Oidii vari: Kg 2,5-3,75 per ettaro e per applicazione; sono consentiti un massimo di 3 applicazioni/anno in pieno campo e 5 applicazioni/anno in serra.

MELO, PERO

contro la Tichiolatura ed Oidio: Kg 1,5-2,5 per ettaro e per applicazione; sono consentite un massimo di 4 applicazioni/anno. Impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici.

PESCO

contro Oidio, Monilia, Tichiolatura: Kg 2-2,5 per ettaro e per applicazione alla fioritura e alla scamicatura dei frutticini. Ripetere i trattamenti nei periodi critici, durante il primo accrescimento dei frutti; sono consentite un massimo di 4 applicazioni/anno. Impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici.

CETRIOLO, COCOMERO, MELONE

contro Oidii vari: Kg 2,5-3,75 per ettaro e per applicazione; sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno sia in pieno campo che in serra.

COLTURE FLOREALI

contro Botrytis, Peronospora, Tichiolatura, Aternaria, Septoria: g. 150-200 per 100 litri di acqua.

Preparazione della poltiglia:

stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile di uso primaverile-estivo eccezione fatta per le miscele alcaline come Poltiglia Bordolese e Poltigliature. Qualora si desiderasse effettuare miscele con liquidi emulsionabili normalmente sconsigliate, controllare la compatibilità degli stessi con prove preliminari.

Avvertenze:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

stante l'elevato numero di varietà delle specie frutticole e floreali, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici, prima di passare al trattamento di superfici più ampie.

Rischi di nocività:

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti:

21 giorni prima della raccolta per melo, pero, pesco; 14 giorni prima della raccolta per le altre colture.

Tempo di rientro dall'impiego:

- in campo: 12 ore - in serra: 24 ore

Attenzione:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

STABILIMENTI AUTORIZZATI
- SIPCAM PHYTEUROP - Montreuil Bellay (Francia)


TAGLIE AUTORIZZATE
g. 200-500 Kg. 1-6-10-25

FENACLOR[®] FL

Fungicida organico in sospensione concentrata per la difesa di Melo, Pero, Pesca, Cocomero, Melone, Cetriolo, Pomodoro, Pisello, Colture floreali. Si impiega in trattamenti liquidi contro: Oidii, Ticchiolature, Monilia, Peronospore, Alternarie, Clado-porium, Atractonai, Cercospore e Septorie.

- FENACLOR FL Composizione:
 -- Clorotalonil puro g. 40 (= 496 g/litro)
 -- Fenarimol puro g. 2 (= 24,8 g/litro)
 -- Coformulanti e solventi: q. b. a. g. 100

CLASSE II



NOCIVO

(R) marchio registrato SIPCAM
 Milano
 SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici
 e Per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
 Viale Gian Galeazzo, 3 - MILANO.

Prodotto distribuito da:

Registrazione n. 7494 del 25.5.88
 del Ministero della Sanità

Officina di produzione:

. . . . Litro

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n° . . .

NATURA DEL RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, raccogliere con terra, sabbia o segatura. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Avvertenza:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto ed in locali aerei diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura e deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotalonil puro 40%; Fenarimol puro 2%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Clorotalonil: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassici.

Fenarimol:

Terapia sintomatica

Controindicazioni:

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per ettaro:

Melo e pero

Contro la Ticchiolatura ed oidio impiegare 1 1,2-2 per ha e per applicazione; non sono ammessi più di 4 trattamenti all'anno. Impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici

Pesce

Contro Oidio, Monilia e Ticchiolatura impiegare il prodotto alle dosi di 1,5-2 per ha e per applicazione alla fioritura ed alla scamicatura dei frutticini. Ripetere i trattamenti nei periodi critici durante il primo accrescimento dei frutti, impiegando sulle varietà più sensibili le dosi più elevate. Non sono ammessi più di 4 trattamenti all'anno. Impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici.

Cocomero, melone, cetriolo, pomodoro, pisello

contro Oidii vari impiegare 1 2; volendo intervenire anche contro Peronospore, Ticchiolature, Alternarie, Cercospore e Septorie impiegare 1 3 non sono ammessi per il Pomodoro più di 3 trattamenti in campo e 5 in serra; per Cocomero, Melone e Cetriolo non più di 3 sia in campo che in serra, per il Pisello non più di 2 trattamenti in pieno campo.

Colture floreali (rosa, garofano, gladiolo e crisantemo)

contro Oidio impiegare ml 120-160 per 100 litri di acqua; volendo intervenire anche contro Peronospore, Alternarie, Ticchiolature, Septorie usare ml 160-200 ripetendo i trattamenti secondo necessità.

Preparazione della poltiglia:

diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:

il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile di uso primaverile-estivo eccezione fatta per le miscele alcaline come Poltiglia Bordolese e Poltiosolfuri. Qualora si desiderasse effettuare miscele con liquidi emulsionabili normalmente scongiurate, controllare la compatibilità degli stessi con prove preliminari.

Avvertenza:

in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

stante l'elevato numero di varietà delle specie orticole, floricole e frutticole, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici, prima di passare al trattamento di superfici più ampie.

Sospendere i trattamenti:

21 giorni prima della raccolta su melo, pero, pesca.
 Su ortaggi 14 giorni prima della raccolta.

Tempi di rientro : 12 ore in campo; 24 ore in serra

Attenzione:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

STABILIMENTI AUTORIZZATI

- SIPCAM - Salerano sul Lambro (Milano)

TAGLIE AUTORIZZATE

litri 0,250-1,5-10-20


FRUMIDOR® CP

Fungicida organico in granuli idrodispersibili (DF) ad azione preventiva e curativa per la difesa di Melo, Pero, Colture Floreali.

- FRUMIDOR CP Composizione:

-- Clorotaloni puro	g. 50
-- Tiofanato metile puro	g. 20
-- Coformulanti ed inerti: q.b. a	g. 100

CLASSE II



NOCIVO

(R) marchio registrato SIPCAM - Milano
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e Per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - MILANO.

Prodotto distribuito da:

Registrazione n. 6774 del 30.7.86
del Ministero della Sanità

Officina di produzione:

... Kg
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n°: ..

NATURA DEL RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti a proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non respirare le polveri. Togliamci di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non distarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, miscelare mescolando con terra, sabbia o segatura.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Avvertenza:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotaloni puro 50%; Tiofanato Metile puro 20%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Clorotaloni: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

Tiofanato Metile:

Terapia sintomatica

Controindicazioni:

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi per ettaro di seguito indicate diluite in acqua distribuite con pompe a volume normale:

MELO, PERO

contro la Turchiolutura ed Oldio: Kg 1-2 per ettaro e per applicazione; sono consentite un massimo di 4 applicazioni/anno. Impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici.

COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO (garofano, rosa, crisantemo, bulbose da fiore)

contro Botrytis, Peronospora, Turchiolutura, Alternaria, Septoria: g 250-300 per 100 litri di acqua.

Per tutti gli impieghi sopra indicati è opportuno effettuare trattamenti preventivi ovvero al più tardi all'inizio della comparsa delle malattie, ripetendo i trattamenti secondo necessità.

Preparazione della poltiglia:

stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile di uso primavera-estivo eccezione fatta per le miscele alcaline come Polighia Bordolese e Polisolfuri. Qualora si desiderasse effettuare miscele con liquidi emulsionabili normalmente scongiurate, controllare la compatibilità degli stessi con prove preliminari.

Avvertenze:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

Stante l'elevato numero di varietà delle specie floreali e frutticole, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici, prima di passare al trattamento di superfici più ampie.

Rischi di nocività:

il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti: 21 giorni prima della raccolta per melo e pero.

Tempi di rientro : 12 ore in campo; 24 in serra

Attenzione:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

STABILIMENTI AUTORIZZATI

- SIPCAM PHYTEUROP - Montrouil Bellay (Francia)

TAGLIE AUTORIZZATE

g. 200-500 Kg. 1-5-10-25


ROVER COMBI®

Fungicida organico in sospensione concentrata ad ampio spettro di efficacia e con alta persistenza di azione, attivo per la difesa di Melo, Pero e Colture Floreali. Si impiega in trattamenti liquidi contro: Tichiolatura del Melo e del Pero e Botrytis, Oidio, Sclerotinia, Peronospora, Alternaria, Cercospora, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi di Colture floreali.

- ROVER COMBI Composizione:

- Clorotaloniil puro g. 30 (= 372 g/litro)
- Tiofanato metile puro g. 12 (= 149 g/litro)
- Coformulanti e solventi: q.b. a g. 100

CLASSE II



NOCIVO

(R) marchio registrato SIPCAM - Milano
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e Per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Viale Gino Galeazzo, 3 - MILANO.

Prodotto distribuito da:

Registrazione n. 6775 del 30.7.86
del Ministero della Sanità

Officina di produzione: ...

... Litro
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n°: ...

NATURA DEL RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Conservare il recipiente ben chiuso. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, assorbire con terra o sabbia, raccogliere con cura. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotaloniil puro 30%; Tiofanato Metile puro 12%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Clorotaloniil: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.

Tiofanato Metile: _____

Terapia sintomatica _____

Controindicazioni: _____

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleeni

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate diluite in acqua distribuite con pompe a volume normale:

MELO, PERO

contro la Tichiolatura ed Oidio: 11,5-2,5 per ettaro e per applicazione; sono consentite un massimo di 4 applicazioni/anno. Impiego previsto solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici.

COLTURE FLOREALI (garofano, rosa, crisantemo, bulbose da fiore) IN PIENO CAMPO

contro Botrytis, Oidio, Ruggine, Tichiolatura, Septoria e Fusariosi rameale: ml. 320-400 per 100 litri di acqua.

Per tutti gli impieghi sopra indicati è opportuno effettuare trattamenti preventivi ovvero al più tardi all'inizio della comparsa delle malattie, ripetendo i trattamenti secondo necessità. Trattamenti ripetuti non troppo distanziati riducono le popolazioni degli acari parassiti (ragnetti rossi). L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

Preparazione della poltiglia:

diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, mescolando delicatamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:

il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile di uso primaverile-estivo eccezione fatta per le miscele alcaline come Poltiglia Bordolese e Polisolfuri.

Avvertenze:

in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto od in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Lo smaltimento delle confezioni e l'eventuale prodotto non riutilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Fitotossicità:

stante l'elevato numero di varietà delle specie frutticole e floreali, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici, prima di passare al trattamento di superfici più ampie.

Rischi di nocività:

il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti: 21 giorni prima della raccolta per melo e pero.

Tempo di rientro dall'impiego:

- in campo: 12 ore - In serra: 24 ore

Attenzione:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

STABILIMENTI AUTORIZZATI

- SIPCAM - Salerano sul Lambro (Milano)

TAGLIE AUTORIZZATE


ml. 250-300 litri 1-5-10-20

SIPLLEN® B

Diserbante selettivo in sospensione concentrata per il controllo in pre-emergenza di infestanti graminacee e dicotiledoni in frumento, orzo, segale a semina invernale, Fagiolo, Fagiolino, Carciofo.

- SIPLLEN B Composizione:**
- Linuron puro g. 11.75 (= 123 g/litro)
 - Trifluralin puro g. 23.50 (= 247 g/litro)
 - Coformulanti e solventi: q.b. a g. 100
- Contiene: Xilene e N,N-Dimetilformamide

CLASSE II



NOCIVO

(R) marchio registrato SIPCAM - Milano
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e Per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - MILANO.

Prodotto distribuito da:

Registrazione n. 2024 del 3.9.75
del Ministero della Sanità

Officina di produzione: ..

.... Litro

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n°

NATURA DEL RISCHIO

Infiammabile. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle. Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non respirare i vapori. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, assorbire con terra, sabbia o segatura; raccogliere con cura. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrarli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

AVVERTENZE:

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, depositi mangimi. Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il p.a. non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Linuron puro 11,75%; Trifluralin puro 23,5%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Linuron: derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subletali ed ematuria.

Trifluralin: la sostanza è quasi insolubile in acqua ed abbastanza solubile in acetone e xilolo. Dopo ingestione è scarsamente assorbibile dal tratto gastroenterostomiale e circa il 70% di una dose orale è escreta nelle feci ed oltre il 15% nelle urine. Nell'animale da esperimento sono riportati stato stuporoso, convulsioni, coma, vomito, diarrea. La sostanza è irritante per cute, occhi, mucose in genere, comprese quelle del tratto respiratorio.

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni:

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni.

MODALITA' DI IMPIEGO

INFESTANTI CONTROLLATE:

Graminacee annuali:

Alopecurus spp., Apera spica venti, Lolium spp., Poa spp.:

Dicotiledoni:

Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Matricaria spp., Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Ranunculus spp., Raphanus raphanistrum, Sinapsis arvensis, Sonchus spp., Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp. Il prodotto non controlla Avena fatua, A. ludoviciana, A. Sterilis, Agropyrum repens, Cirsium spp., Tussilago farfara ed altre perennanti.

Culture protette:

Frumento invernale duro e tenero, Orzo a semina invernale, Segale a semina invernale, Fagiolo a semina primaverile, Fagiolino a semina estiva, Carciofo.

EPOCA DI IMPIEGO:

il prodotto deve essere usato dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura trattata.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE:

il prodotto deve essere distribuito per irrorazione e non deve essere incorporato nel terreno (tranne che per l'impiego su fagiolino estivo e su carciofo).

DOSE DI IMPIEGO:

3-3,5 litri per ettaro per ogni tipo di terreno.

Preparazione della poltiglia:

usare il prodotto in 200-800 litri di acqua per ettaro; il prodotto deve essere aggiunto nella botte riempita a metà di acqua ed agitato bene durante il completamento del riempimento. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare una qualsiasi attrezzatura irrorante a bassa pressione (1,5-3,0 atm) provvista di spruzzatori per erbicidi ed una pompa di capacità adeguata ad assicurare una buona agitazione durante l'irrorazione. Una efficiente valvola di chiusura deve essere usata per impedire l'eccessiva fuoriuscita del prodotto quando l'attrezzatura parte, gira o si ferma. Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto venga distribuito uniformemente.

Preparazione del terreno:

per ottenere i migliori risultati, il letto di semina deve essere ben preparato, eliminando le zolle grosse, e tutti i semi devono essere ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme.

Istruzioni speciali:

qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del prodotto e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. Il prodotto non deve essere applicato in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:

il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego sulle colture consigliate, ad eccezione dei prodotti alcalini.

Avvertenza:

in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

il prodotto è risultato selettivo verso le principali varietà di Frumento, Orzo e Segale invernali, Fagiolo, Fagiolino, Carciofo indipendentemente dal tipo di terreno, comunque non tutte le varietà sono state sperimentate, per cui si consigliano prove parcellari.

Avvertenze:

evitare il congelamento del preparato. Evitare temperature estreme, conservare il prodotto in locali a temperatura superiore a 5 gradi C. Non conservare presso sorgenti di calore o fuoco.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per fagiolo, fagiolino, e carciofo.

Attenzione:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

STABILIMENTI AUTORIZZATI

- SIPCAM - Salerano sul Lambro (Milano)
- SOCIETE' CHIMIQUE FRANCAISE

TAGLIE AUTORIZZATE


- L 1-5-10-20
- L 1-5-10-20

SIPLLEN® L

Diserbante selettivo in sospensione concentrata per il controllo in emergenza di infestanti graminacei e dicotiledoni in frumento, orzo, segale, fagiolo, fagiolino, carciofo.

- SIPLLEN L Composizione:
 -- Linuron puro g. 11 (= 120 g/litro)
 -- Trifluralina puro g. 22 (= 240 g/litro)
 -- Coformulanti e solventi: q.b. a g. 100
 Contiene: Xiloss

CLASSE III



IRRITANTE

NATURA DEL RISCHIO

Inflammabile. Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Avvertenze :

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di faccette filtranti. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, depositi mangimi. Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Il p.a. non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Linuron puro 11%; Trifluralina puro 22%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Linuron: derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subituro ed ematuria.

Trifluralina: la sostanza è quasi insolubile in acqua ed abbastanza solubile in acetone e xilolo. Dopo ingestione è scarsamente assorbita dal tratto gastrointestinale e circa il 70% di una dose orale è escreta nelle feci ed oltre il 15% nelle urine. Nell'animale da esperimento sono riportati stato stuporoso, convulsioni, coma, vomito, diarrea. La sostanza è irritante per cute, occhi, mucose in genere, comprese quelle del tratto respiratorio.

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni:

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleai.

MODALITA' DI IMPIEGO

Infestanti controllate:

Graminacee annuali

Alopecurus spp. Apera spica-venti, Lolium spp., Poa spp.;

Dicotiledoni

Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Fumaria officinalis, Lamium spp., Lithospermum arvense, Matricaria spp., Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Ranunculus spp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sonchus spp., Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp.

Il prodotto non controlla:

Avena fatua, A. ludoviciana, A. sterilis, Agropyrum repens, Cirsium spp., Tussilago farfata ed altre infestanti perennanti.

Culture protette:

Frumento invernale duro e tenero, Orzo a semina invernale, Segale a semina invernale, Fagiolo a semina primaverile, Fagiolino a semina estiva, Carciofo.

Epoca di impiego:

Il prodotto deve essere usato dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura trattata.

Sistema di distribuzione:

Il prodotto deve essere distribuito per irrorazione e non deve essere incorporato nel terreno (tranne che per l'impiego su fagiolino estivo e su carciofo).

Dose d'impiego : 3-3,8 litri per ettaro e per ogni tipo di terreno.

Preparazione della pottiglia:

usare il prodotto in 200-800 litri di acqua per ettaro; il prodotto deve essere aggiunto nella botte riempita a metà di acqua ed agitato bene durante il completamento del riempimento. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Usare una qualsiasi attrezzatura irrorante a bassa pressione (1,5-3,0 atm.) provvista di spruzzatori per erbicidi ed una pompa di capacità adeguata ad assicurare una buona agitazione durante l'irrorazione.

Una efficiente valvola di chiusura deve essere usata per impedire l'occlusiva fuoriuscita del prodotto quando l'attrezzatura parte, gira o si ferma.

Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto venga distribuito uniformemente.

Preparazione del terreno:

per ottenere i migliori risultati, il letto di semina deve essere ben preparato, eliminando le zolle grosse, e tutti i semi devono essere ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme.

Istruzioni speciali:

Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del prodotto e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, zucca, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, cotta e cavoli, spinacio.

Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.

Il prodotto non deve essere applicato in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:

il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego sulle colture consigliate, ad eccezione dei prodotti alcalini.

Avvertenza:

in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:

il prodotto è risultato selettivo verso le principali varietà di grano invernale, orzo invernale e segale invernale indipendentemente dal tipo di terreno, comunque non tutte le varietà sono state sperimentate, per cui si consigliano prove parcellari.

Avvertenze:

evitare il congelamento del preparato. Evitare temperature estreme, conservare il prodotto in locali a temperature superiori a 5°C.

Non conservare presso sorgenti di calore o fuoco.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per fagiolo, fagiolino, carciofo.

Attenzione:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

STABILIMENTI AUTORIZZATI

- SIPCAM - Salerano sul Lambro (Milano)

TAGLIE AUTORIZZATE

Litri 0.250-1.5-10-20

Ditta: S I P S A

Principio attivo:

CLOROTALONIL

LINURON

Presidio sanitario:

**TALON S Combi WDG
TALON 75 WDG**

**GRANBAS
STIURON**

FUNGICIDA formulato in granuli idrodispersibili

NORME OPERAZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa. Non consentire altre colture e colti d'acqua. Non usare come letame. Non diluire del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

AVVERTENZE

Nella preparazione della miscela murire di guanti e di facciale bianca. Preparare la miscela in recipienti appositi, protetti dalla sporcizia o in locali ariati dove si quali abbia un alto grado di ventilazione, quali depositi di fucina e verura, depositi magrifi. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in presenza di colti d'acqua.

PRECAUZIONI PER IL MEDICO

Evitare l'infetto per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritare oculare con possibile epitelio corneale. Sensibilizzante. Può provocare dermati reattivi ad atossici. Tempe: invernificata. Consultare un Centro Antivenetiv.

CARATTERISTICHE

Il TALON 75 wdg è un fungicida ad azione preventiva a largo spettro d'azione, efficace contro vari funghi patogeni delle seguenti colture: ortaggi, fruttiferi e colture floreali.

DOSE E MODALITÀ D'IMPIEGO PER 100 lt. d'acqua:

COLTURE ORTIVE (in pieno campo od in serra): Pomerani e Pomme; contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporium, Muffa grigia, Botrytis, Antracnosi, Cercosporiosi e Rizozonio. 150-200 gr/lt. Con un massimo di 3 applicazioni annue in campo e 5 in serra per il pomodoro e di 2 applicazioni annue per la patata. Cereale, melissa e cavenare: contro Antracnosi, Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Vadobatura, Rizozonio e Fusarium non vascolare. 150-200 gr/lt. Con un massimo di 3 applicazioni annue a pieno campo o in serra. Sclerotinia: 200-250 gr/lt. Massimo tre applicazioni annue a pieno campo e in serra. Cappelto: contro Peronospora, Muffa grigia, Ruggine ed Alternaria. 150-200 gr/lt. Massimo due applicazioni annue a pieno campo. Peggine, leguminose e pisello: contro Antracnosi, Peronospora e Ruggine. 150-200 gr/lt. Massimo due applicazioni annue in pieno campo. Il TALON 75 wdg va impiegato sulle colture orlive in via preventiva, in qualunque periodo dell'anno a seconda delle necessità, rispettando i trattamenti ad intervalli regolari in funzione della virulenza e dell'andamento stagionale e rispettando il numero massimo di applicazioni annuali sopra riportato. POMACEE (mele e pere): contro Tichobolatura, Cancro ramato, Ruggine, Marciume del fusto e del colletto. 200-250 gr/lt in trattamenti invernali; 100-150 gr/lt in trattamenti prima della fioritura; 120-150 gr/lt in trattamenti dopo la fioritura. Impiegando il prodotto solo in campo con un massimo di 4 applicazioni annue e solo in associazione con fungicidi sistematici.

DRUPACEE (perce e susino): contro Monilia, Corineo,

Bella Ruggine, Nerume e Cancro ramato. 150-200 gr/lt in trattamenti prima e dopo la fioritura; 150-200 gr/lt in trattamenti 5-6 settimane prima della raccolta; 150-200 gr/lt in trattamenti 3-4 settimane prima della raccolta. Impiegando il prodotto esclusivamente con un massimo di 4 applicazioni annue e solo in miscela con fungicidi sistematici. COLTURE FIORIBILI E ORNAMENTALI: contro Antracnosi, Muffa grigia, Tichobolatura, Ruggine, Saperone, Alternaria, Fusarium non vascolare. 150-200 gr/lt in trattamenti preventivi od alle prime comparse della malattia, ripetendo i trattamenti quando è necessario in funzione dell'andamento stagionale e delle infestazioni. Preparazione della sospensione: evaporare in esse acqua di TALON 75 wdg in poca acqua miscelando bene ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea, versare quindi nella quantità d'acqua necessaria, mescolando con cura, fino ad ottenere la diluizione voluta. Tempi di riverso: 12 ore (in campo) - 24 ore (in serra).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREE

COMPATIBILITÀ

Associazioni possibili con: - strobil-inibitori fungicidi - antiparassitari sistemici, ceteropoli e translantivi - dicarbossimici (antibiotici) - benzimidazolici - rame - zolfo. Non è lecita compatibilità con gli oli minerali e con gli emulsionanti a reazione alcalina (fosfolipidi, poliglicol borato).

AVVERTENZE:

Il TALON 75 wdg deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali. In caso di miscela con altri fungicidi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Quindi, si verificassero casi di infestazione informare il medico della miscelazione completa.

FOTOTOSSICITÀ: E' consigliabile eseguire saggi preliminari prima di procedere ad erigere trattamenti su colture da fiore particolarmente delicate.

RISCHIO DI NOCIVITÀ: Non eseguire trattamenti durante la fioritura essendo il prodotto tossico per gli insetti utili.

SOCIETÀ ITALIANA S.p.A. SODALITÀ DELLA RACCOLTA DI PASCARE E DELLA RACCOLTA DI OLIVARI DELLA RACCOLTA DI COLTURE ORTIVE

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle specie e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è proibito.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SPURSO

TALON 75 wdg

COMPOSIZIONE 100 gr. di prodotto contengono:

Clorotalonil puro

Bagnanti, disperdenti e supporti inerti

75 gr.

q.b. a 100 gr.

CLASSE II

R - 21/22: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

- 40: Possibilità di effetti irreversibili

S - 2: Conservare fuori dalla portata dei bambini

- 13: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande


- 20/21: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

- 24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

- 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico

- 36/37: Usare indumenti protettivi e guanti acati in caso di incidente o di malessere

- 45: consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli questa etichetta)



NOCIVO

SIPSA Società Industriale Prodotti e Servizi per Agricoltura - s.r.l. Via X Aprile, 3 - 40110 COTTIGNOLA (PA) - Tel. 0545/41750 - Fax 0545/40270

Officina di produzione: FORWARD INTERNATIONAL LTD. - P.O. Box 46 - 903 TAPEI - TAIWAN - R.O.C.

Officina di confezionamento: STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Stabilimento di Celegnola (PA) - Via X Aprile, 3

Registrazione Ministero della Sanità n. 7147 del 24-06-1987

Peso netto: Kg. 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N. _____

GRANBAS


COMPOSIZIONE 100 gr. di prodotto contengono:

Trifluralin puro 23,50 gr. (= 244 gr./lt)

Linuron puro 11,75 gr. (= 122 gr./lt)

Coformulanti (contiene xilene e cicloesano) q.b. a 100 gr.

CLASSE II



- R - 10:** Irritabile
- 20/21: Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
- S - 2:** Irritante per la pelle
- 38: Conservare fuori dalla portata dei bambini
- 13: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
- 20/21: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
- 23: Non respirare i vapori
- 24: Evitare il contatto con la pelle
- 25: Evitare il contatto con gli occhi
- 36/37: Usare indumenti protettivi e guanti adatti
- 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli questa etichetta)

NOCIVO

SIPSA

Società Industriale Prodotti e Servizi per Agricoltura - s.r.l.
Via X Aprile, 3 - 48010 COTTIGNOLA (RA) - Tel. 0545/1750 - Fax 0545/40270

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Sanità n. 7214 del 03-07-1987

Contenuto netto: lt. 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N. _____

Stabilimenti di produzione autorizzati: DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
BASLINI IND. CHIM. S.p.A. - P.zza E. Basini, 1 - TREVIGLIO (BG)

DISERBANTE liquido emulsionabile per il controllo di graminacee e dicotiledoni in cereali a semina autunnale

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare la confezione ben chiusa;
- Non contaminare altre colture o corai d'acqua;
- Non operare contro vento;
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- Non distanziare dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

AVVERTENZE

- Nella preparazione della miscela murirsi di guanti e di laccale filtrante.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli usati ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdure, depositi mangimi.
- Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco.
- Non impiegare il prodotto in prossimità di corai d'acqua.
- Lo smaltimento delle confezioni vuote e del loro contenuto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.
- Il p.a. non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

- Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
- TRIFLURALIN 23,5 %
- LINURON 11,75 %
- In quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

TRIFLURALIN:

- LINURON:** derivato dell'urea.
- Sintomi:** Durante l'impiego può causare congiuntivite, irritazione irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitro ed ematuria.
- Terapia:** sintomatica.
- Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

GRANBAS è un diserbante liquido selettivo che controlla le infestanti graminacee e dicotiledoni in pre-emergenza delle colture di cereali, intervenendo sull'attività fotosintetica delle malerbe.

Culture protette e dosi:

Fiumenuto duro e tenero, orzo, segale: impiegarne 3-4 litri di GRANBAS/ha diluito in 200-300 litri di acqua.

Intossicazioni controllate:

Graminacee annuali: poe, loggio, erba codina, spica-verdi, erba britannica.
Dicotiledoni annuali: borsa del pastore, fumaria, camomilla, peperone, coreggiola, ranuncolo, raltanistro, senape, veroniche, anagallide.

GRANBAS non controlla avere selvatiche, graminacee, citrato, farina.

EPOCA D'IMPIEGO

GRANBAS deve essere usato tra la semina e l'emergenza.
GRANBAS deve essere distribuito per irrorazione e non deve essere incorporato nel terreno che deve essere ben preparato eliminando tutte le zolle grosse.

ISTRUZIONI SPECIALI

Quando fosse necessaria una ricottivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin in miscela con Linuron e la semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocconero, cetarbio e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e carvoti, spinacchio.
Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.
La miscela deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti locali. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: sospendere i trattamenti all'emergenza della coltura.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

DISERBANTE
selettivo formulato in granuli idrodispersibili

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione,
lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AVVERTENZE

- Nella preparazione della miscela evitare di guanti e
di indossare il bracciale.
- Preparare la miscela in recipienti appositi, possibil-
mente all'aperto o in locali ariati dovei da quelli
adatti ad altre operazioni agricole, quali depositi di
fieno e verdure, deposito mangimi.
- Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il
sostanziale.
- Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi
d'acqua.
- Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale
residuo prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le
norme in vigore.
- Il p.a. non deve essere impiegato in terreni soggetti
con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivate dall'urea.
Sintesi: Durante l'impiego può causare congiuntiviti-
ti, eritemi nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare prurito, nausea, vomito e diarrea. Sono casi subitanei ed emetici.
Temperie, Stomatite.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Lo STIURON wdg è un diserbante formulato in granuli
idrodispersibili, adatto per combattere le più
comuni infestazioni ericali, quali: Puzosella, cancri-
li, verosia, plantaginella, elubacca, caposella, setaria,
diavolotto, senape, amaranto, papavero, digitale,
borra di pastore, morella, poligono, portulaca,
renoncolo, gerone e malvaria.
Alle dosi consigliate per le colture lo STIURON wdg non
controlla le erbe perenni.

DOSE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Lo STIURON wdg si impiega alle seguenti dosi per
erica:
DISERBO DELLA CAROTA: In pre-emergenza 1,2-
1,8 Kg., nell'intervento tra la semina e 2-3 giorni prima
dell'emergenza della coltura ponendo il seme ben
coperto nel terreno; in post-emergenza 1,5-2,0 Kg.,
quando la carota hanno completamente formato il 2°
nodo fogliare (quattro foglie vere).
DISERBO DELLA PATATA: 1,2-2,0 Kg., in pre-emer-
genza, nell'intervento tra il collocamento e dimora dei
tubi e l'emergenza della coltura.
DISERBO DEL CARCIOFO: 0,6-1,4 Kg., prima della
fioritura vegetativa.
DISERBO DEL SEDANO: 1-2 Kg., intervenendo dopo
la posa e crescita, non appena la pianta hanno
superato le fasi del trapianto.
DISERBO DEL FROCCHO: 0,5-1,0 Kg. in pre-emer-
genza.
DISERBO DI FAGIOLI E FAGIOLINI: 0,8-1,2 Kg. in
pre-emergenza subito dopo la semina.

STIURON wdg

COMPOSIZIONE 100 gr. di prodotto contengono:

Linuron puro

47,5 gr.

Bagnanti, disperdenti e supporti inerti

q.b. a 100 gr.

CLASSE III

ATTENZIONE

Manipolare con prudenza

R-36: Irritante per la pelle.

S-2: Conservare fuori dalla portata
dei bambini


-13: Conservare lontano da alimenti
o mangimi e da bevande

-20/21: Non mangiare, né bere, né fumare
durante l'impiego

-24/25: Evitare il contatto con gli occhi
e con la pelle

-37: Usare guanti adatti

-45: In caso di incidente o di malessere
consultare immediatamente il medico
(se possibile, mostrargli questa etichetta)



IRRITANTE

SIPSA

Società Industriale Prodotti e Servizi per Agricoltura - S.r.l.
Via X Aprile, 3 - 46010 COTTIGNOLA (RA) - Tel. 0542/1750 - Fax 0542/40270

Officina di produzione: FORWARD INTERNATIONAL LTD. - P.O. Box 46 - 800 TAIFEI - TANHAN - R.D.C.

Officina di confezionamento: STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Stabilimento di Cognola (RA) - Via X Aprile, 9

Registrazione Ministero della Sanità n. 4916 del 25-09-1982

Peso netto: Kg. 1

PARTITA N. _____

DISERBO DELL'ASPARAGO: 1,0-2,0 Kg. intervenendo in pre-emergenza.
DISERBO DELLA RAPA: 1,2-2,0 Kg. intervenendo in pre-emergenza.

DISERBO DELLA SQUA E DEL GIRASOLE: 0,8-1,4 Kg. intervenendo in pre-emergenza.

DISERBO DEL FRUMENTO, CRZO, SEGALE: 0,6-1,0 Kg. intervenendo in pre-emergenza.

DISERBO DEL MAIS: 1 Kg. nei terreni di medio impasto in miscela con altri p.a. per evitare fitofitocenosi. Con altri p.a. per evitare fitofitocenosi (pendentia) - 1,2 Kg. nei terreni fertili e argillosi, intervenendo in pre-emergenza.

Le dosi minime consigliate si riferiscono a terreni leggeri, sabbiosi e moderatamente dotati di sostanza organica, quelle massime a terreni pesanti, argillosi e ricchi di sostanza organica.

L'apposizione delle dosi di prodotto va prima sempre in acqua e quindi diluita al volume desiderato (esempio 100 litri d'acqua per ettaro) agitando energicamente. Prima di procedere al trattamento è opportuno lavare e smuovere bene la superficie del terreno, irregolare e uniformemente, tenendo in costante agitazione la miscela dentro la pompa.

Evitare di effettuare i trattamenti in periodi molto caldi o su terreni molto sabbiosi e secchi. L'azione del diserbante risulta favorita da una leggera pioggia o irrigazione.

Terminati i trattamenti, lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili usati adoperarli per la diluizione e l'impiego del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Lo STIURON wdg non è compatibile con gli anticongelanti e gli insetticidi; può invece essere miscelato con altri diserbanti a base di Pendimetalin, Trifluralin, Clorox ed Estazolam.

Avvertenza: In caso di miscela con altri farmaci deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di fitotoxicazione intrinseca il medico della micobiotica compari.

FITOTOSSICITÀ

Lo STIURON wdg può causare fitotossicità per colture non indicate in etichetta.

SOCCORRERE IL TRATTAMENTO

60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni causati da un impiego del prodotto. Il riparo della presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alla pianta, alle persone o agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONSERVARE IL PRODOTTO IN LUOGO ASCIUTTO E FRESCO.

Ditta: S I V A M

Principio attivo:

LINURON

Presidio sanitario:

**MALERTOX LURON FLUID
MALERTOX PREMERG TL**

Ditta: VISCHIM

Principio attivo:

CLOROTALONIL

Presidio sanitario:

VISCLOR 54 L

VISCLOR 54 L

Fungicida flowable per la difesa di pomacee, drupacee, ortaggi, patata, colture floreali ed ornamentali.

COMPOSIZIONE

- * Clorotoloni puro 54 g (x 720 g/l)
- * Coadiuvanti e inerti q. b. a 100

VISCHIM S.r.l.

Via privata Vasto, 3 - MILANO

Officina di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Adria - Cavacella Po (RO)

Registrazione n. 7502 del 7/6/1988 - Ministero Sanità

FRASI DI RISCHIO

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare adeguati protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrarli l'etichetta). In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

PARTITA N.:

1 Litro



CLASSE I

TOSSICO

CARATTERISTICHE

Il prodotto è efficace per la difesa preventiva di pomacee, drupacee, ortaggi, patata e colture floreali ed ornamentali da Peronospora, Oidiosporiosi, Septoria, Botrite, Cercospora, Sclerotinia, Alternaria, Antracnosi, Ruggine, Turchioblasta MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi con pompie a volume normale sulle sottocoscate colture.

COLTURE ORTICOLE

Pescedero 150-225 ml/ml (1,5-2 l/ha) Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi e Septoria intervallare effettuando 3 trattamenti ad intervalli regolari nel corso della stagione iniziandosi prima della comparsa dei sintomi della malattia. Per i trattamenti in serra contro le stesse malattie sono consigliati 5 trattamenti.

Sedano 150-225 ml/ml (1,5-2 l/ha) Contro Septoria, Cercospora, Alternaria, Sclerotinia, intervallare prima della comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento altre 2 volte in caso di necessità.

Cucurbitacee (Melone, Anguria, Cetriolo) 150-225 ml/ml (1,5-2 l/ha) Contro Peronospora, Botrite, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi effettuare 3 trattamenti sia in serra sia in pieno campo ad intervalli regolari iniziandosi prima della comparsa dei sintomi.

Capolla 150-225 ml/ml (1,5-2 l/ha) Contro Peronospora, Ruggine, Botrite intervallare tempestivamente prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità.

Leguminose (fagiolo, fagiolino, pisello) 150-200 ml/ml (1,5 l/ha) Contro Antracnosi, Ruggine, Septoria, Botrite intervallare prima della comparsa dei sintomi. Ripetere il trattamento in caso di necessità.

PATATA 1,5-2 l/ha Contro Peronospora ed Alternaria intervallare effettuando il trattamento prima della comparsa dei sintomi e ripetendolo in caso di necessità.

FRUTTIFERI

Melo, Pero 150 ml/ml (0,8-1,2 l/ha) Contro Turchioblasta, Canci zmeati ed Alternaria del pero intervenire solo in pieno campo, sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, quali triazoli, o di contatto quali rame, al massimo 4 volte per stagione. In caso di miscela con prodotti rameici occorre seguire le avvertenze sulla sensibilità al rame di alcune cultivars di Melo e di Pero.

Pesce, Squalo 70-150 ml/ml (1-1,2 l/ha) Contro Botrytis, Botla, Sclerotinia, Rizopus, Gloeosporium, Penicillium. Monitorare intervallare sempre in miscela con altri fungicidi sistemici, quali triazoli, benzimidazoli, o dicarbossimidi al massimo 4 volte per stagione.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI (rosa, grofano, crisantemo, gladiolo) 200-250 ml/ml Contro Peronospora, Septoria, Ruggine, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi e Turchioblasta intervallare prima della comparsa dei sintomi, ripetendo il trattamento in caso di necessità. Si consiglia di effettuare saggi preliminari di sensibilità varietale prima di trattare tutta la superficie, soprattutto nel caso di colture in serra.

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura. Agitare energicamente la confezione prima dell'uso.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti, ad eccezione dei prodotti alcalini (poltiglie bordoles, polioctari).

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati devono essere rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: nel caso di colture da fiore effettuare saggi preliminari su piccole superfici. Può indurre rugginicità su mele del gruppo Golden.

Sospensione i trattamenti 14 giorni prima della raccolta in colture orticole e patata, 21 giorni prima della raccolta su pomacee e su drupacee.

Tempo di rientro nell'impiego: 12 ore in pieno campo; 24 ore in serra.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è vietato. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle procedure istruttive è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SEUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Non riutilizzare il contenitore

UFFICINE DI PRODUZIONE:

CAFFARO S.p.A. - ADRIA Cavacella Po (RO)

SIFCAM S.p.A. - Salernno s/ Lambro (MI)

CONTENUTO Litri 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10

AVVERTENZE

Nella preparazione delle miscele murari di guanti e di facciale filtrante. Preparare le miscele in recipienti appositi, possibilmente all'aperto, in locali aerei diversi da quelli adatti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito di mangimi. Non riutilizzare gli introcchi che abbiano contenuto il fitofarmaco. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Lo smaltimento delle eventuali confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato, deve avvenire secondo le norme in vigore.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritazione per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed epatici.

Terapia: sintomatica.

Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice direttore*



* 4 1 1 2 0 0 4 4 0 9 2 *

L. 19.500