

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Austria, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Rimbel 25 WG

Erbicida solfonilureico di post-emergenza
selettivo per mais, patata e pomodoro
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro..... g 25
Coformulanti q.b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S3) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S3/32)

INDICAZIONI PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o di malassorbimento consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Non sono noti casi di intossicazione dell'uomo. Terapia: sintomatica.

CONSULENZA UN CENTRO ANTIVENE O CHIAMARE IL 112

Titolare della registrazione

Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH
Du Pont Strasse 1, D-41382 Bad Homburg (Germania)

Numero di Registrazione: n. 2476

Fabbricato da:

Du Pont de Nemours (France)
82, rue de Wittelsheim F-68701 Cernay

Importato dall'Austria da:

Genetti srl, Via Parini 4/A - 39012 Merano (BZ)

Officina di riconfezionamento / rietichettatura

Menora GmbH - Mettenhofgasse 30 - 6020 Graz (Austria)

Officina di sola rietichettatura:

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE)

Distribuito da:

Verde Bio S.r.l. - V.le della Vittoria 14/b - Montebelluna (TV)

Registrazione n. xxxxx/ I.P. Ministero della salute del xxxxxx

CARATTERISTICHE D'AZIONE

RIMBEL 25 WG è un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili ai sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5-10 giorni dall'applicazione. RIMBEL 25 WG erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché RIMBEL 25 WG non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

Infestanti graminacee sensibili: *Avena* spp. (*Avena sativa*), *Digitaria* spp. (*Sanguinella*), *Echinochloa* spp. (*Giovane*), *Panicum dichotomiflorum* (*Panico delle risaie*), *Pennisetum polystachyon* (*Panico coltivato*), *Phalaris* spp. (*Scagliola*), *Setaria* spp. (*Panicastrella*), *Sorghum bicolor* e *Sorghum halepense* da seme a de rizoma (*Sorgho*).

Infestanti a foglia larga sensibili: *Abrutium theophrasti* (*Cencio nolle*), *Amaranthus* spp. (*Amaranto*), *Ambrosia* spp. (*Ambrosia*), *Anethum majus* (*Visnaga maggiore*), *Bidens bipinnata* (*Portulaca*), *Capsella bursa-pastoris* (*Bussapastore*), *Convolvulus arvensis* (*Vilucchio*), *Catalpa septima* (*Vilucchio parico*), *Dipsacis* spp. (*Portula violacea*), *Fumaria officinalis* (*Fumaria*), *Galinsoga parviflora* (*Galinsoga*), *Helianthus tuberosus* (*Tapiambur*), *Matricaria chamomilla* (*Camomilla comune*), *Mentha arvensis* (*Menta campastre*), *Picris echinoides* (*Asparagino comune*), *Ranunculus* spp. (*Ranuncolo*), *Rapistrum rugosum* (*Miegro peloso*), *Sinapis arvensis* (*Sinape svizzera*), *Gonchus* spp. (*Crespine*) e *Xanthium* spp. (*Nappa*).

Epoca d'impiego: post-emergenza della coltura e delle infestanti

DOSE D'IMPIEGO:

Mais: 50-60 g/ha addizionato con bagnante Trend allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore è consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi del loro sviluppo; la dose maggiore è consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali già sviluppate e *Digitaria*. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (*Abrutium theophrasti*, *Cyperaceae*, *Digitaria* spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti può essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. Non applicare RIMBEL 25 WG sulla coltura precedentemente trattata con Forate, Terbutolo, Isoterbuto, Paratone, in presenza di *Chenopodium* spp. (*Farnello*), *Datura stramonium* (*Siringio comune*), *Polygonum* spp. (*Correggiola*) e *Solanum nigrum* (*Erba morella*) è consigliata la miscela con un prodotto ad attività dicotiledonocida efficace contro queste malerbe.

Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante allo 0,2% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza di *Solanum nigrum* applicare 50 g/ha di RIMBEL 25 WG + Trend allo 0,2% entro o non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di *Chenopodium* spp. (*Farnello*), *Polygonum* spp. (*Correggiola*) e *Portulaca oleracea* (*Erba porcellana*) è opportuna la miscela con "Merazlin DF" alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela può essere applicata, alle dosi più basse di metribuzin, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di *Echinochloa* spp. (*Giovane*) applicare 50-60 g/ha di RIMBEL 25 WG + bagnante Trend allo 0,2%, effettuando, in caso

di infestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di RIMBEL 25 WG + bagnante Trend allo 0,2% a distanza di 7-10 giorni.

Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento può essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di RIMBEL 25 WG + bagnante Trend allo 0,2%.

Volume di innaffiatura: 200-400 l/ha. Utilizzare ugelli a ventaglio e medio-basse pressioni di esercizio.

Preparazione della polverina: RIMBEL 25 WG, alla dose stabilita deve essere disciolto nell'innaffiatura riempita circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend nella quantità necessaria dopo aver inserito RIMBEL 25 WG.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Effettuare i trattamenti con temperatura compresa tra 13 e 25 °C.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi parassitari o asfissia radicale.
- È importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare RIMBEL 25 WG. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con RIMBEL 25 WG è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
 - 1) svuotare il serbatoio e risciacquare internamente; lavare il serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente;
 - 2) riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere una soluzione detergente (0,5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora;
 - 3) ripetere le istruzioni indicate al punto 2;
 - 4) risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra;
 - 5) filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:

- applicazioni su nuove varietà;
- applicazioni in miscela o in sequenza con altri prodotti fitosanitari.

Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

In caso di necessità di diserbo nei terreni già precedentemente trattati con RIMBEL 25 WG, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di RIMBEL 25 WG non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione. Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione, possono compromettere l'attività erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: Non miscelare RIMBEL 25 WG con prodotti contenenti bentazone, 2,4-D, Cyenazina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Allo scopo di ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di RIMBEL 25 WG su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 60 giorni prima della raccolta del mais.

ATTENZIONE: da impiegare in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alla pianta, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO: NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Contenuto netto: 100 g

PARTITA N.