GRIFON FL
Sospensione concentrata
Anticrittogamico rameico

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Rame metallo
(50% da ossicloruro tetrarame(II) e 50% da idrossido) g 20 (=272 g/l)
Coformulanti ..... q.b. a g 100

Contiene solfato rameico: dall'1-3-bentazinzolinone: può causare una reazione allergica.

Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 4 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO
Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (aut. Qualità)
Distribuzione commerciale: Siapa S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO

Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).
Contenuto netto: 0.15 - 0.2 - 0.25 - 0.5 - 0.7 - 1 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17.5 - 18 - 20 - 25 l
Partita N° .....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi (irritazione delle *scrotche* con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi, Vomito con sangue e di materiali di colore verde, brividi gastroesofagei, diarrea ematica, colichc addominali, febre e malessere, ittero e epatite, insufficienza epatica e renale, coma alcoli, collasso. Edema da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolisi con soluzione *bicarbonatica* fresca, se coprovia elevata usare diuretici, predellitanim se la visionale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE
Il prodotto è un anticrittogamico in sospensione concentrata a base di ossicloruro o idrossido di rame. GRIFON FL è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree. Il prodotto si utilizza anche per il contenimento delle alghe e dei molluschi della risaia.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le quantità indicate si intendono per 100 litri di acqua, se non diversamente specificato, e per trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume acido, Melanosi, Bonsore prevendemmiale: intervenire preventivamente alla dose di 200-300 ml (pari a 2-3 litri per ettaro), ripetendo i trattamenti preferibilmente ogni 7-8 giorni. Nel caso di elevata pressione infettiva o condizioni atmosferiche particolarmente piovose, può essere utile aumentare la dose a 400 ml (pari a 4 litri per ettaro).
AGRUMI - Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Alternaria, Marciume o gommosi del colletto, Batteriosi - azione collaterale nei confronti di Punaggine. Intervenire mensilmente alla dose di 400-450 ml a partire dalla fine di Gennaio.
POMACEE (melo, pero, cotogno)
- trattamenti autunno invernali
  - Ticchiolatura, Moniliia, Batteriosi ..... 500 - 900 ml/hl
  - Necrosi ..... 220 - 250 ml/hl
- trattamenti primaverili estivi contro Ticchiolatura, Monilia, Septoriosi del pero, Batteriosi: 250 - 400 ml/hl, in funzione delle condizioni climatiche (piogge, temperature, bagnatura), della pressione infettiva e dello sviluppo vegetativo della coltura.

Marciume del colletto: 700-800 ml per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Pero - Colpo di fuoco: Trattamenti primaverili-estivi ed autunnali alla dose di 250-450 ml per 100 litri d'acqua.
Mandorlo - Cancro, Monilia, - trattamenti invernali alla dose di 700-900 ml per 100 litri d'acqua. Cancro batterico: 600-700 ml alla caduta delle foglie.
Albicocco - Cloisco, Monilia - trattamenti invernali alla dose di 700-900 ml per 100 litri d'acqua. Cancro batterico: 600-700 ml alla caduta delle foglie.
Ciliegio - Monilia, Bolla - trattamenti invernali alla dose di 700-900 ml per 100 litri d'acqua. Cancro batterico: 600-700 ml alla caduta delle foglie. Marciume del colletto: 700-800 ml per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Pesco, Nettarine e Percoche - Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla - trattamenti invernali alla dose di 700-900 ml per 100 litri d'acqua. Cancro batterico: 600-700 ml alla caduta delle foglie.
Susino - Corineo, Monilia, Macchiatura batterica - trattamenti invernali alla dose di 700-900 ml per 100 litri d'acqua.
Fragola - Vaiolatura, Marciume del colletto, Batteriosi: trattamenti autunnali, invernali e alla ripresa vegetativa alla dose di 350-400 ml.
Ulivo - Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio e occhio di pavone: intervenire durante il periodo autunno-invernale alla dose di 450 ml.
Actinidia - Marciume del colletto: 700-800 ml per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno) e fruttiferi minori : Cancri rameali, antracnosi e batteriosi : trattamenti autunno-invernali alla dose di 600 ml, trattamenti primaverili - estivi alla dose di 450-550 ml.
ORTAGGI
Pomodoro - Peronospora: intervenire alla dose di 200-300 ml (pari a 1,2-2,4 l/ha) iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (piogge, bagnature, elevata umidità) e ripetendoli preferibilmente ogni 7-8 giorni. In caso di grave rischio elevare la dose a ml 400.
Altri ortaggi:
Intervenire alla dose di 350-400 ml iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Bietola da orto, Bietola rossa - Cercospora, Ruggine; **Carota** - Alternariosi; **Rapa, Ravanello** - Ruggine bianca delle cruciferee, Peronospora; **Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno** - Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume batterico; **Pomodoro** - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Marciume acido, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Peperone** - Antracnosi, Cancrena pedale, Morìa delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico, Alternariosi; **Melanzana** - Antracnosi, Morìa delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino** - Macchiatura angolare, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico; **CAVOLI** - Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, azione collaterale su: Muffa grigia - Alternariosi; **Asparago** - Ruggine, Azione collaterale su: Muffa grigia; **Carciofo, Cardo** - Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Finocchio, Sedano, Prezzemolo** - Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Altre orticole** - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.
COLTURE INDUSTRIALI
Barbabietola da zucchero - Cercospora, Peronospora, Ruggine: intervenire alla dose di 3,5-4 l/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Tabacco - contro Batteriosi (*Pseudomonas tabaci*), antracnosi, peronospora: 3,5 - 4 l/ha, intervenire in semenzaio ed al trapianto effettuando 2-3 trattamenti ogni 8-10 giorni.
FLORALI, ORNAMENTALI - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi: intervenire alla dose di 450 ml iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 900-1400 ml quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
ALTRI IMPIEGHI
Lotta contro le Alghe e i Molluschi della Risaia: intervenire alla dose di 3,5-4 l per ha effettivamente trattato.
COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con formulati alcalini (polisolfuri, ecc.) e quelli contenenti Thiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela usata compiuta.
FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero suscettibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo suscettibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morlendult, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, cosmopolita.
Varietà di pero suscettibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Annecies, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorite di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floricole ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER ORTAGGI A FOGLIA, 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER FRAGOLA, ALTRI ORTAGGI, PATATA, 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LE ALTRE COLTURE FRUTTI
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE