

Conservazione del farmaco

Come per tutti gli altri farmaci, tenere EPIVIR fuori della portata dei bambini.

Conservare EPIVIR Soluzione orale tra 2 e 25 °C.

Non utilizzare dopo 1 mese dalla prima apertura.

11. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE

2 dicembre 1996

Da ricordare

Questo farmaco è per il paziente per il quale è prescritto. Non deve essere assunto da altri, in quanto può risultare ad essi dannoso, anche se presentano i medesimi sintomi.

Questo Foglio Illustrativo non fornisce tutte le informazioni riguardanti il farmaco. Per qualsiasi richiesta di chiarimenti o dubbio, rivolgersi al proprio medico o farmacista.

Non gettare questo Foglio Illustrativo finché non sia stato terminato il farmaco, poiché si potrebbe presentare la necessità di consultarlo ancora.

Per qualsiasi informazione relativa a questo prodotto, prego contattare il locale rappresentante del Titolare dell'Immissione in Commercio:

Belgique/ België	Boulevard du triomphe 172 Triomflaan 1160 Bruxelles/Brussel	02/676.57.11
Danmark	Nykær 68 DK2605 Brøndby	36 75 90 00
Deutschland	Industriestraße 32 - 36 23843 Bad Oldesloe	040 415 230
Eire	PO Box No. 700 Grange Road Rathfarnham Dublin 16	(01) 298 4733
Ελλάς	Λεωφ. Κηφισίας 266 152 32 Χαλκίδας	6882100-200-300
España	Parque Tecnológico de Madrid c/ Dr. Severo Ochoa 2 28760 Tres Cantos Madrid	91 80 70 30 1