

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

RINAPYR 200

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite, nocciolo, mais dolce e per la lotta alla drosila della patata. Appartiene alla famiglia chimica delle antinilamidi ed è caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve, compromettendone la funzionalità. RINAPYR 200 agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto, provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

Soluzione Concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono
Chlorantraniliprole 18,4 g (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100 g

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fogliature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

Titolare della Registrazione in Germania:

Dupont de Nemours GmbH - Hugenottenallee 173-175
63263 Neu-Isenburg (Germany)
N° di registrazione: 6336-00

Importato dalla Germania da:

Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
Registrazione n. 15469/JIP Ministero della Salute del 10/07/2012

Officine di rielaborazione / riconfezionamento:

Phytosop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay
SIFC - Rue J. Coste - F-59562 Courcillelles

Contenuto Netto: ml 50-100-150-200-250-300-500-600-900-1000

Partita n.: vedi fondo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

- Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di 15 metri per melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, susino, nocce e nocciolo e 10 metri per vite da vino e da tavola, arancio, limone e mandarino.
- Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di ingestione: non indurre il vomito, tenere la bocca aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente un medico. In caso di inalazione: allontanarsi dal luogo di esposizione, prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. In caso di contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE IL MEDICO ANCHE IN CASO DI INCOSCENZA. TERAPIA: SINTOMATICA.

RINAPYR 200

1/2

MODALITA' D'AZIONE

RINAPYR 200 è un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti pomacee, drupacee, vite, agrumi, mais, mais dolce e per la lotta alla drosila della patata. Appartiene alla famiglia chimica delle antinilamidi ed è caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve, compromettendone la funzionalità. RINAPYR 200 agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto, provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

SPETTRO D'AZIONE

Cydia pomonella (capocarpa), Adoxophyes orana (capua reticulata), Agrotis taenialis (culla), Pandemis heparyana (torricole verde), Pandemis cerasana (torricole gialloverde), Phyllosticta (torricole delle pomacee), Phyllosticta coryliella (torricole con mina a placca), Leucophaea scitella (torricole della patata), Ostrinia nubilalis (piralide), Cydia molesta (figuola orientale), Anarsia lineatella (anarsia), Cydia funebrana (figuola del susino), Operophtera brumata (chermida), Lobesia botrana (figuola della vite), Eupoecilia ambiguella (figuola della vite), Curculio nucum (balanino del nocciolo), Phyllocnistis citrella (minatrice serpentina degli agrumi), Lepidoptera decemlineata (dorifora), Sesamia spp. (sesamia), Helioverpa armigera (nottua gialla del pomodoro), Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis (nottua piccola e nottua mediterranea).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO

Effettuare le applicazioni ad un intervallo di 12-14 giorni su pomacee e 10-14 giorni su drupacee, nocce, nocciolo e vite da tavola, posizionando il primo trattamento durante la fase di ovideposizione ed utilizzando l'intervallo più breve e i dosaggi più alti raccomandati in caso di elevata pressione dei parassiti.

Su vite da vino effettuare 1 applicazione per anno; su tutte le altre colture in etichetta (inclusa vite da tavola) il numero massimo di applicazioni consentite è di 2 per anno.

Melo e Pero: può essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra l'allegagione e la maturazione. Per il controllo di Cydia pomonella, Adoxophyes orana, Agrotis taenialis, Pandemis spp., Ostrinia nubilalis, Cydia molesta, Cydia funebrana, Operophtera brumata e 15-20 mli (160-270 mli) per A. lineatella, intervenendo in fase di ovideposizione prima della chiusura delle uova e della penetrazione delle prime larve.

Vite da vino e da tavola: utilizzare 15-18 mli (150-270 mli) per la vite da vino e 150-216 mli per la vite da tavola per il controllo di E. ambiguella, L. botrana, A. pulchellana. Intervenire in fase di ovideposizione prima della chiusura uova utilizzando la dose più alta in caso di forte pressione o infestazione prevalente di E. ambiguella.

Nocce e Nocciolo: può essere impiegato per il controllo di C. pomonella e C. nucum nelle fasi fenologiche comprese fra l'allegagione e la maturazione. Utilizzare 18-20 mli (180-300 mli), intervenendo durante l'ovideposizione prima della chiusura delle prime uova.

Arancio, limone, mandarino - Applicare solo su colture non ancora in produzione: può essere impiegato a partire dall'allungamento dei germogli. Utilizzare 10-15 mli (50-75 mli) per il controllo di P. citrella intervenendo in fase di ovideposizione o alla comparsa delle primissime larve prima che siano visibili le mine sulle foglie.

Patata: utilizzare 50-60 mli per il controllo di Lepidoptera decemlineata. Intervenire in fase di ovideposizione o quando sono visibili le primissime erosioni. Nel caso si rendesse necessaria una seconda applicazione, adottare un intervallo di 14-21 giorni dal primo trattamento.

Mais e Mais Dolce: utilizzare 100-150 mli per il controllo di Ostrinia nubilalis e lepidotteri notturni quali ad esempio H. armigera, S. exigua, S. littoralis, Sesamia spp. Intervenire in fase di ovideposizione o quando sono visibili le primissime erosioni, nel caso si rendesse necessaria una seconda applicazione, intervenire a distanza di 10-21 giorni. Su mais dolce, in presenza di elevata pressione dei parassiti, utilizzare la dose più elevata e l'intervallo più breve sopra indicati.

ATTENZIONE: per tutte le colture, le dosi indicate sono riferite a volumi normali e precisamente 10-15 hl/ha per pomacee, drupacee, nocce e nocciolo, 8-15 hl/ha per vite da vino, 8-12 hl/ha per vite da tavola, 5 hl/ha per agrumi non ancora in produzione, 3-6 hl/ha per la patata, 2-6 hl/ha per mais e mais dolce, indipendentemente dai volumi di acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate, si raccomanda di rispettare la dose di prodotto ad ettaro (minima e massima) indicata per ciascuna coltura e per ciascun parassita.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

RINAPYR 200 possiede un nuovo meccanismo di azione e va considerato come una nuova opportunità per contrastare il fenomeno della resistenza.

Si può impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenza mediante l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, uniformemente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico.

Etichetta autorizzata con d.d. 10 luglio 2012

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

RINAPYR 200 secondo lo schema IRAC appartiene al Gruppo 28 Insetticidi (modulatore dei recettori rianodinici). Il numero massimo di applicazioni di RINAPYR 200 consentite è pari a 2 per anno (esclusa vite da vino).

AVVERTENZE AGRONOMICHE: si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Riempi il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere RINAPYR 200 alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. In caso di miscela si consiglia di introdurre RINAPYR 200 dopo i prodotti in formulazione di polvere bagnabile e/o granulari e prima di altri prodotti liquidi. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita, il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA'

RINAPYR 200 non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA'

RINAPYR 200 è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varietà si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Vite da vino: 30 giorni - Noce, nocciolo: 21 giorni - Melo, pero, pesco, nectarine, albicocco, susino, patata: 14 giorni - Mais e mais dolce: 7 giorni - Vite da tavola: 3 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.



RINAPYR 200

2/2

Etichetta autorizzata con d.d. 10 luglio 2012

