

TEER

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERÒ), DRUPACEE
(PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO E SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)
Sospensione Concentrata

COMPOSIZIONE

g 100 di prodotto contengono:
g 4,35 di Tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

Frase di Rischio: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali e schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SHARDA WORLDWIDE EXP. PVT. LTD
Domnie Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione: **CHEMIA Spa** - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE) // **CHEMARK Kft** H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria // Zakłady Chemiczne "**ORGANIKA-SARZYNA**" Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia // **IRCA SERVICE Spa** - S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) // **LUQSA SA** - Adueras, s/n 25173 Sudanel, Lleida (Spagna) // **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIAN Spa** - via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA) // **SPACHEM SL** - Polígono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 50, 100

Partita N°:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua col prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tuberculocerosi renale acuta ed epatocerosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e confusione, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prioritariamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11 5 OTT. 2012

13A00699

