







ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **mancozeb** per i quali viene confermata la ri-registrazione alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier MANFIL 75 WG di All. III **fino al 30 giugno 2018** ai sensi del Regolamento (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013.


|   | N. reg.ne | Nome prodotto | Data reg.ne | Impresa                | Nuova classificazione stabilita dall'impresa titolare  |
|---|-----------|---------------|-------------|------------------------|--|
| 1.  | 11106     | MANFIL 75 WG  | 29/11/2001  | INDOFIL INDUSTRIES LTD | <br>ATTENZIONE<br>H317-H319-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P264-P280-P302+P352-P305+P351-P338-P308+P313-P391-P405-P501   |
| <b>Modifiche autorizzate:</b>   |           |               |             |                        |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici</u></li> <li>- <u>Estensione allo stabilimento di distribuzione: Bayer Cropscience S.r.l. – Viale Certosa, 130 – 20156 Milano</u></li> <li>- <u>Rinuncia al distributore: Certis Europe B.V. Filiale Italiana – Via J.M.E. de Balaguer 6 – Saronno (VA)</u></li> <li>- <u>Estensione alla taglia: 8Kg</u></li> </ul> |           |               |             |                        |  |
| 2.  | 12931     | FUNGI MZ DF   | 09/01/2006  | INDOFIL INDUSTRIES LTD | <br>ATTENZIONE<br>H317-H319-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P264-P280-P302+P352-P305+P351-P338-P308+P313-P391-P405-P501 |
| <b>Modifiche autorizzate:</b>   |           |               |             |                        |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici</u></li> </ul>   |           |               |             |                        |  |



s.a. mancozeb conferma Ri-reg. secondo principi uniformi a seguito degli studi senza pregiudizio




|   |       |                             |            |                                  |  |
|---|-------|-----------------------------|------------|----------------------------------|--|
| 3.  | 13147 | GEOZEB WG                   | 09/09/2006 | AGROWIN<br>BIOSCIENCES<br>S.r.l. | <br>ATTENZIONE<br>H317-H319-H316d-H400-<br>H411, EUH401; P201-P202-<br>P261-P264-P280-P302+P352-<br>P305+P351-P338-P308+P313-<br>P391-P405-P501   |
| <b>Modifiche autorizzate:</b>   |       |                             |            |                                  |  |
| - <u>Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici</u> |       |                             |            |                                  |  |
| 4.  | 10638 | MANCOZEB<br>MANICA 75<br>WG | 06/12/2000 | MANICA<br>S.p.A.                 | <br>ATTENZIONE<br>H317-H319-H316d-H400-H411<br>EUH401; P201-P202-P261-<br>P264-P280-P302+P352-<br>P305+P351-P338-P308+P313-<br>P391-P405-P501     |
| <b>Modifiche autorizzate:</b>   |       |                             |            |                                  |  |
| - <u>Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici</u> |       |                             |            |                                  |  |
| 5.  | 13783 | MANTIR 75<br>WG             | 02/05/2007 | GOWAN<br>ITALIA S.p.A.           | <br>ATTENZIONE<br>H317-H319-H316d-H400-<br>H411, EUH401; P201-P202-<br>P261-P264-P280-P302+P352-<br>P305+P351-P338-P308+P313-<br>P391-P405-P501 |
| <b>Modifiche autorizzate:</b>   |       |                             |            |                                  |  |
| - <u>Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici</u> |       |                             |            |                                  |  |

s.a. mancozeb conferma Ri-reg. secondo principi uniformi a seguito degli studi senza pregiudizio




|   |       |                   |            |  |   |
|---|-------|-------------------|------------|--|---|
| 6.  | 11931 | MANZEB 75<br>WG   | 27/01/2004 | CHEMIA S.p.A                             | <br><b>ATTENZIONE</b><br>H317-H319-H316d-H400-H411<br>EUH401; P201-P202-P261-<br>P264-P280-P302+P352-<br>P305+P351-P338-P308+P313-<br>P391-P405-P501 |
| <b>Modifiche autorizzate:</b>   |       |                   |            |  |   |
| - <u>Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici</u> |       |                   |            |  |   |
| 7.  | 10938 | MANCOSIM 75<br>DF | 17/05/2001 | ARYSTA<br>LIFESCIENCE<br>BENELUX<br>SPRL | <br><b>ATTENZIONE</b><br>H317-H319-H316d-H400-H411<br>EUH401; P201-P202-P261-<br>P264-P280-P302+P352-<br>P305+P351-P338-P308+P313-<br>P391-P405-P501 |
| <b>Modifiche autorizzate:</b>   |       |                   |            |  |   |
| - <u>Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici</u> |       |                   |            |  |   |

s.a. mancozeb conferma Ri-reg. secondo principi uniformi a seguito degli studi senza pregiudizio



Etichetta e foglietto illustrativo

| <b>MANFIL 75 WG</b>  |  |
|--|--|
| Fungicida preventivo<br>Granuli idrodispersibili   |  |
| <b>Composizione:</b><br>- Mancozeb puro g. 75<br>- Coformulanti q.b. a g. 100<br>Contiene Hexamethylene tetramine<br><b>INDICAZIONI DI PERICOLO</b><br>H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare;<br>H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.<br><b>CONSIGLI DI PRUDENZA</b><br>P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare la polvere; P264: Lavare accuratamente dopo l'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale | <b>ATTENZIONE</b><br> |
| <b>INDOFIL INDUSTRIES LIMITED</b><br>Kalpataru Square, 4 <sup>th</sup> Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)<br>Telefono: 0091 22 66637373<br>Telefono di emergenza: 0039 02 66101029<br><b>Officine di produzione:</b> INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India<br><b>Distribuito da:</b> Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa, 130 - 20156 Milano<br>Registrazione n. 11106 del 29-11-2001 del Ministero della Salute<br>Peso netto: kg 0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 5 - 8 - 10 - 25 <span style="float: right;">Partita n.: .....</span>   |  |

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveneni

#### CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il MANFIL 75 WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).

| Coltura    | Parassiti   | Dose                             | N° massimo di trattamenti per stagione | Intervallo di sicurezza (giorni) |
|------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Vite       | Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> ), Escoriosi ( <i>Phomopsis viticola</i> ), Marciume nero ( <i>Guignardia bidwellii</i> ), Rossore parassitaria ( <i>Pseudopeziza tracheiphila</i> )                             | 200-220 g/hL<br>(max 2.13 kg/ha) | 2                                      | 28                               |
| Melo, Pero | Ticchiolatura ( <i>Venturia</i> sp.), Septoria ( <i>Mycosphaerella pyri</i> ), Ruggine ( <i>Gymnosporangium</i> sp.), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.)   | 150-200 g/hL<br>(max 3.2 kg/ha)  | 1                                      | 28                               |
| Pomodoro   | Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> ), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.), Septoria ( <i>Septoria lycopersici</i> ), Antracnosi ( <i>Colletotrichum coccodes</i> ), Cladosporiosi ( <i>Cladosporium fulvum</i> ) | 200-220 g/hL<br>(max 2.13 kg/ha) | 5                                      | 3                                |
| Patata     | Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )   | 200-220 g/hL<br>(max 2.13 kg/ha) | 8                                      | 7                                |

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni per pomodoro e patata.

#### DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

**COMPATIBILITÀ:** non è raccomandata la miscelazione di Manfil 75 WG con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.


**FITOTOSSICITÀ:** Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Annella, Butira Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpì, Zucchermana.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile



**6 DIC. 2016**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....




Etichetta e foglietto illustrativo


degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.



6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....



| <b>MANFIL 75 WG</b>  |  |
|--|--|
| Fungicida preventivo<br>Granuli idrodispersibili   |  |
| <b>Composizione:</b><br>- Mancozeb puro g. 75<br>- Coformulanti q.b. a g. 100<br>Contiene <i>Hexamethylene tetramine</i>   |  |
| <b>INDICAZIONI DI PERICOLO</b><br>H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.<br><b>CONSIGLI DI PRUDENZA</b><br>P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare la polvere; P264: Lavare accuratamente dopo l'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale | <b>ATTENZIONE</b><br> |
| <b>INDOFIL INDUSTRIES LIMITED</b><br>Kalpataru Square, 4 <sup>th</sup> Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)<br>Telefono: 0091 22 66637373<br>Telefono di emergenza: 0039 02 66101029<br><b>Officine di produzione:</b> INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India<br><b>Distribuito da:</b> Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa, 130 – 20156 Milano<br>Registrazione n. 11106 del 29-11-2001 del Ministero della Salute<br>Peso netto: kg 0.1  |  |
| Partita n. ....  |  |

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irradiazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiche, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveneni

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**


**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**



**6 DIC. 2016**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....



# FUNGI MZ DF

FUNGICIDA PREVENTIVO  
GRANULI IDRODISPERSIBILI

## FUNGI MZ DF

### Composizione:

Mancozeb puro g 75

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene Hexamethylene tetramine

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Sospettato di nuocere al feto. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Evitare di respirare gli aerosol. Lavare accuratamente le mani, il viso e gli avambracci dopo l'uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.** Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.



ATTENZIONE

### INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)  
Tel. 0039 02 66101029

**Stabilimenti di produzione:** INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

**Distribuito da:** S.I.V.A.M. S.p.A - Via XXV Aprile, n°4 – 26841 – Casalpusterlengo (LO) Tel. 0377/8341

**Registrazione Ministero della Sanità n. 12931 del 09/01/2006**

**Taglie:** kg 1-5-10-20

**Partita n°**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irradiazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflexia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleeni

### USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

**FUNGI MZ DF** è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).

| Coltura    | Parassiti   | Dose                             | N° massimo di trattamenti per stagione | Intervallo di sicurezza (giorni) |
|------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Vite       | Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> ), Escoriosi ( <i>Phomopsis viticola</i> ), Marciume nero ( <i>Guignardia bidwellii</i> ), Rossore parassitaria ( <i>Pseudopeziza tracheiphila</i> )                             | 200-220 g/hL<br>(max 2.13 kg/ha) | 2                                      | 28                               |
| Melo, Pero | Ticchiolatura ( <i>Venturia</i> sp.), Septoria ( <i>Mycosphaerella pyri</i> ), Ruggine ( <i>Gymnosporangium</i> sp.), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.)   | 150-200 g/hL<br>(max 3.2 kg/ha)  | 1                                      | 28                               |
| Pomodoro   | Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> ), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.), Septoria ( <i>Septoria lycopersici</i> ), Antracnosi ( <i>Colletotrichum coccodes</i> ), Cladosporiosi ( <i>Cladosporium fulvum</i> ) | 200-220 g/hL<br>(max 2.13 kg/ha) | 5                                      | 3                                |
| Patata     | Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )   | 200-220 g/hL<br>(max 2.13 kg/ha) | 8                                      | 7                                |

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni per pomodoro e patata.

### DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE


**COMPATIBILITÀ:** non è raccomandata la miscelazione di FUNGI MZ DF con altri prodotti fitosanitari.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

6 DIC. 2016




**FITOTOSSICITÀ:** Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpì, Zucchermana.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non venderci sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.



6 DIC. 2016





# GEOZEB WG

FUNGICIDA  
GRANULI IDRODISPERSIBILI

**Composizione**

100 g di prodotto contengono:  
MANCOZEB puro g 75  
Coformulanti q.b. a g 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare le polveri/fumi/gli aerosol; P264: Lavare accuratamente la pelle e gli occhi dopo l'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P305 + P351 +P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico; P391: Raccogliere la fuoriuscita; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

**AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.**

Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo - Tel. 0331 440977  
Registrazione n. 13147 Ministero della Salute del 09/09/2006

**Stabilimenti di produzione:**

Indofil Industries Limited - Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India  
Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/28, Sez.Dahje Limited, Sez.Dahje, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat. 392 130, India

Taglie: Kg 1 - 5 - 10 - 20 Kg Parità n°: Vedere sulla confezione

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmaticiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia;

**effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o progressiva assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotesione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.  
**Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveneni

**CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Il GEOZEB WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).

| Coltura    | Parassiti*   | Dose                                  | N° massimo di trattamenti per stagione | Intervallo di sicurezza (giorni) |
|------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Vite       | Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> ),<br>Escoriosi ( <i>Phomopsis viticola</i> ),<br>Marciume nero ( <i>Guignardia bidwellii</i> ), Rosore parasitario ( <i>Pseudopeziza tracheiphila</i> )                                      | 200-220 g/hl<br>massimo<br>2,13 kg/ha | 2                                      | 28                               |
| Melo, Pero | Ticchiolatura ( <i>Venturia</i> sp.),<br>Septoria ( <i>Mycosphaerella pyri</i> ),<br>Ruggine ( <i>Gymnosporangium</i> sp.),<br>Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.)   | 150-200 g/hl<br>massimo<br>3,2 kg/ha  | 1                                      | 28                               |
| Pomodoro   | Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> ),<br>Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.),<br>Septoria ( <i>Septoria lycopersici</i> ),<br>Antraconosi ( <i>Colletotrichum coccodes</i> ),<br>Cladosporiosi ( <i>Cladosporium fulvum</i> ) | 200-220 g/hl<br>massimo<br>2,13 kg/ha | 5<br>intervallo<br>7-10 giorni         | 3                                |
| Patata     | Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )  | 200-220 g/hl<br>massimo<br>2,13 kg/ha | 8<br>intervallo<br>7-10 giorni         | 7                                |

\* Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia

**DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA  
DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE**

**COMPATIBILITÀ:** non è raccomandata la miscelazione di GEOZEB WG con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non venderli sfuso. Smaltire le confezioni/contenitori secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Oppure in assenza di vento

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.....



Etichetta/foglio illustrativo

# MANCOZEB MANICA 75 WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)  
Fungicida preventivo

MANCOZEB MANICA 75 WG - Registrazione Ministero della Sanità n. 10638 del 06/12/2000

|   |            |
|---|------------|
| COMPOSIZIONE  | Partita n. |
| MANCOZEB puro   | g. 75      |
| Coformulanti q.b. a<br>Contiene Hexamethylene tetramine | g. 100     |

## MANICA Spa

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464 433705

Stabilimenti di produzione:

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India  
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Plot No. Z7-1/Z8, Sez. Dahej Limited, Sez. Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

Contenuto: 100-200-500 g. 1-2-5-10-25 Kg.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare la polvere. P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irruzione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO  
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. Effetto antitubese si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.  
Terapia: sintomatica  
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

| Cultura    | Parassiti   | Epoca di impiego  | Dose                             | N° max di trattamenti per stagione | Intervallo di sicurezza |
|------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| VITE       | Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> ), Escoriosi ( <i>Phomopsis viticola</i> ), Marciume nero ( <i>Girgania bidwellii</i> ), Rossone parassitario ( <i>Pseudopeziza tracheiphila</i> )                               | nelle epoche più favorevoli alle malattie                         | 200-220 g/hL<br>(max 2,13 Kg/ha) | 2                                  | 28 giorni               |
| MELO, PERO | Ticchiolatura ( <i>Venturia</i> sp.), Septoria ( <i>Mycosphaerella pyr</i> ), Ruggine ( <i>Gymnosporangium</i> sp.), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.)  | nell'epoca più favorevole alle malattie                           | 150-200 g/hL<br>(max 3,2 Kg/ha)  | 1                                  | 28 giorni               |
| POMODORO   | Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> ), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.), Septoria ( <i>Septoria lycopersici</i> ), Antracnosi ( <i>Colletotrichum coccodes</i> ), Cladosporiosi ( <i>Cladosporium fulvum</i> ) | quando si verificano le condizioni favorevoli per l'infezione     | 200-220 g/hL<br>(max 2,13 Kg/ha) | 5<br>(7-10 giorni)                 | 3 giorni                |
| PATATA     | Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )   | quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie | 200-220 g/hL<br>(max 2,13 Kg/ha) | 8<br>(7-10 giorni)                 | 7 giorni                |

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANCOZEB MANICA 75 WG con altri prodotti fitosanitari.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Falel, Armella, Butirra Precoca Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentili Bianca, Gentiliana, Giardina, Mbra, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpì, Zeccherma.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA  
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE  
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO



6 DIC. 2016

.....

Etichetta formato ridotto

**MANCOZEB MANICA 75 WG**  
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)  
Fungicida a vasto spettro d'azione, attivo per contatto.

| <b>MANCOZEB MANICA 75 WG</b> Registrazione Ministero della Sanità n. 10638 del 06/12/2000  |              | <br><b>ATTENZIONE</b> |                 |       |                       |        |   |  |                     |
|--|--------------|---|-----------------|-------|-----------------------|--------|---|--|---------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">COMPOSIZIONE</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- MANCOZEB puro</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">g. 75</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- Coformulanti q.b. a</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">g. 100</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;"><i>Contiene Hexamethylene tetramine</i></td> </tr> </table>  | COMPOSIZIONE |   | - MANCOZEB puro | g. 75 | - Coformulanti q.b. a | g. 100 | <i>Contiene Hexamethylene tetramine</i> |  | Contenuto:<br>100 g |
| COMPOSIZIONE   |              |   |                 |       |                       |        |   |  |                     |
| - MANCOZEB puro  | g. 75        |   |                 |       |                       |        |   |  |                     |
| - Coformulanti q.b. a  | g. 100       |   |                 |       |                       |        |   |  |                     |
| <i>Contiene Hexamethylene tetramine</i>  |              |   |                 |       |                       |        |   |  |                     |
| <b>MANICA Spa</b><br>Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)<br>Tel. 0464 433705  |              |   |                 |       |                       |        |   |  |                     |
| Stabilimenti di produzione:<br><b>INDOFIL INDUSTRIES LIMITED</b><br>Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India<br><b>INDOFIL INDUSTRIES LIMITED</b><br>Plot No. Z7-1/28, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India   |              |   |                 |       |                       |        |   |  |                     |
| <b>INDICAZIONI DI PERICOLO:</b> H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.<br><b>CONSIGLI DI PRUDENZA:</b> P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare la polvere. P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare. P308+P313 In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. |              |   |                 |       |                       |        |   |  |                     |

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO


IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE



6 DIC. 2016



| <b>MANTIR 75 WG</b>  |  |
|--|--|
| Fungicida preventivo - Granuli idrodispersibili  |  |
| <b>MANTIR 75 WG - Composizione:</b><br>- Mancozeb puro .g. 75<br>- Coformulanti q.b. a g. 100  | <b>ATTENZIONE</b><br> |
| <b>INDICAZIONI DI PERICOLO</b><br>H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare;<br>H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  |  |
| <b>CONSIGLI DI PRUDENZA</b><br>P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare la polvere; P264: Lavare accuratamente dopo l'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale |  |
| <b>GOWAN ITALIA S.r.L.</b><br>Via Morgagni, 68 – Faenza (RA) – Tel. 0546/629911<br>NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): CHEMTREC +1.703.527.3887<br>Officina di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India<br>Autorizzazione Ministero della Salute n. 13783 del 02.05.2007<br>Peso netto: kg 0.2 – 0.5 – 1 – 5 – 10 – 25   |  |
| Partita n.: .....  |  |

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmaticiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotesione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveneni

#### CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Mantir 75 WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).

| Coltura    | Parassiti   | Dose                             | N° massimo di trattamenti per stagione | Intervallo di sicurezza (giorni) |
|------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Vite       | Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> ), Escoriosi ( <i>Phomopsis viticola</i> ), Marciume nero ( <i>Guignardia bidwellii</i> ), Rossore parassitaria ( <i>Pseudopeziza tracheiphila</i> )                             | 200-220 g/hL<br>(max 2.13 kg/ha) | 2                                      | 28                               |
| Melo, Pero | Ticchiolatura ( <i>Venturia</i> sp.), Septoria ( <i>Mycosphaerella pyri</i> ), Ruggine ( <i>Gymnosporangium</i> sp.), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.)   | 150-200 g/hL<br>(max 3.2 kg/ha)  | 1                                      | 28                               |
| Pomodoro   | Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> ), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.), Septoria ( <i>Septoria lycopersici</i> ), Antracnosi ( <i>Colletotrichum coccodes</i> ), Cladosporiosi ( <i>Cladosporium fulvum</i> ) | 200-220 g/hL<br>(max 2.13 kg/ha) | 5                                      | 3                                |
| Patata     | Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )   | 200-220 g/hL<br>(max 2.13 kg/ha) | 8                                      | 7                                |

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni per pomodoro e patata.

#### DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE


**COMPATIBILITÀ:** non è raccomandata la miscelazione di Mantir 75 WG con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpì, Zucchermana.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del...



Etichetta / Foglio illustrativo

# Manzeb 75 WG

Fungicida preventivo  
Granuli idrodispersibili

MANZEB 75 WG

Composizione:  
Mancozeb puro g 75  
Coformulanti q.b. a g 100  
Contiene Hexamethylene tetramine



Attenzione

**Indicazioni di pericolo:**

(H317) Può provocare una reazione allergica della pelle; (H361d) Sospettato di nuocere al feto;  
(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;  
(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

**Consigli di Prudenza:**

(P273) Non disperdere nell'ambiente; (P280) Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; (P302+P352) IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; (P333+P308+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle, di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico; (P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto; (P405) Conservare sotto chiave; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale



**Officine di Produzione :**

Griffin de Colombia S.A. - Via 40 No. 85-85 - Barranquilla - Colombia - Tel. +57 (5) 3616200  
Indofil Chemical Company - Thane, Maharashtra (India) - Tel. +91 22 2496 0000  
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA) - Tel. +39 0545 992455  
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46 - Tel. +39 0532 848477

Reg. n. 11931 del 27/01/2004 del Ministero della Salute

Contenuto netto: g 50 - 100 - 150 - 200; kg 1 - 5 - 10 - 25

Partita n.:

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno: 12 m da corpi idrici superficiali per vite: 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Sintomi :** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, bronca-patia asmaticiforme, sensibilizzazione; S.N.C.: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. **Effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica. **Consultare un Centro Antiveneni**

**CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO**

Il MANZEB 75 WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non da origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte.

Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali):

| Coltura    | Parassiti   | Dose   | N° massimo di trattamenti per stagione* | Intervallo di sicurezza (giorni) |
|------------|---|--|---|----------------------------------|
| Vite       | Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> ), Escoriosi ( <i>Phomopsis viticola</i> ), Marciume nero ( <i>Guignardia bidwellii</i> ), Rossore parassitario ( <i>Pseudopeziza tracheiphila</i> )                             | 200-220 g/hl massimo<br>2,13 kg/ha per trattamento | 2                                       | 28                               |
| Pomodoro   | Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> ), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.), Septoria ( <i>Septoria lycopersici</i> ), Antracnosi ( <i>Colletotrichum coccodes</i> ), Cladosporiosi ( <i>Cladosporium fulvum</i> ) |  | 5<br>(intervallo 7-10 giorni)           | 3                                |
| Patata     | Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> ), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.)  |  | 8<br>(intervallo 7-10 giorni)           | 7                                |
| Melo, Pero | Ticchiolatura ( <i>Venturia</i> sp.) Septoria ( <i>Mycosphaerella pyri</i> ), Ruggine ( <i>Gymnosporangium</i> sp.), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.)  | 150-200 g/hl massimo<br>3,2 kg/ha per trattamento  | 1                                       | 28                               |


\* Effettuare i trattamenti nelle epoche più favorevoli allo sviluppo della malattia

**DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE**

**COMPATIBILITÀ:** non è raccomandata la miscelazione di MANZEB 75 WG con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precocoe Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpì, Zecchermanna

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Il produttore è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego; Operare in assenza di vento; il contenitore non può essere riutilizzato



6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del....



# Manzeb 75 WG

Fungicida preventivo  
Granuli Idrodispersibili

MANZEB 75 WG

**Composizione:**

Mancozeb puro g 75  
Coformulanti q.b. a g 100

Contiene Hexamethylene tetramine



**Indicazioni di pericolo:**

(H317) Può provocare una reazione allergica della pelle; (H361d) Sospettato di nuocere al feto;  
(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

**Consigli di Prudenza:**

(P273) Non disperdere nell'ambiente; (P280) Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; (P302+P352) IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; (P333+P308+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle, di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico; (P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto; (P405) Conservare sotto chiave; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

**Attenzione**



**Officine di Produzione :**

Griffin de Colombia S.A. - Via 40 No. 85-85 - Barranquilla - Colombia - Tel. +57 (5) 3616200

Indofil Chemical Company - Thane, Maharastra (India) - Tel. +91 22 2496 0000

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA) - Tel. +39 0545 992455

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46 - Tel. +39 0532 848477

Reg. n. 11931 del 27/01/2004 del Ministero della Salute

Contenuto netto: g 50 - 100


Partita n.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE



76 DIC. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...



# MANCOSIM 75 DF

FUNGICIDA PREVENTIVO – GRANULI IDRODISPERSIBILI

## MANCOSIM 75 DF

### Composizione:

Mancozeb puro g 75

Coformulanti q. b. a g 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H361d: Sospettato di nuocere al feto. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

### ARYSTA LifeScience Benelux SPRL

Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO)

Telefono +32 4 385 97 11

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet,

Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot

No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

### PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione n° 10938 del 17/05/2001 del Ministero della Sanità

Distribuito da: ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.R.L. - CENTO (FE).

Peso netto 1 - 5 - 10 - 25 Kg Partita n°

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno, 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, ipoflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveneni

### CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MANCOSIM 75 DF è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).

**VITE:** contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL

Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nelle epoche più favorevoli alle malattie somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

**MELO - PERO:** contro Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL

Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3.2 kg di formulato per ettaro.

**POMODORO:** contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL

Iniziare le irrorazioni quando si verificano le condizioni favorevoli per l'infezione, trattando ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

**PATATA:** contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) g 200-220/hL

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

### DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

**COMPATIBILITÀ:** non è raccomandata la miscelazione di MANCOSIM 75 DF con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpì, Zeccheranna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro e 28 giorni per tutte le altre colture

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.



ATTENZIONE



6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del \_\_\_\_\_

