



**Il/la paziente è cirrotico?**

- No  
 Sì  
 In classe Child-Pugh A  
 In classe Child-Pugh B/C

**Prescrizione OCALIVA (acido obeticolico)**

- Dosaggio:  Numero di compresse:

Specificare se si tratta di:

- Prima prescrizione  Prosecuzione di terapia

*Paziente con insufficienza epatica classe Child-Pugh B/C: dosaggio iniziale è 5 mg una volta alla settimana. Dopo 3 mesi, se non si è ottenuta una riduzione adeguata di ALP e/o BT ed il pz tollera il medicinale, aumentare la dose a 5 mg due volte alla settimana\* e successivamente a 10 mg due volte alla settimana\* a seconda della risposta e della tollerabilità (\*almeno tre giorni di distanza tra le somministrazioni).*

*Prosecuzione di terapia dopo 12 mesi: se non è stata osservata una riduzione di almeno il 15% dei valori di ALP rispetto al basale considerare attentamente se sia utile proseguire la terapia, in particolare nei pazienti con un livello non particolarmente elevato di ALP prima dell'inizio della terapia.*

**NOTA BENE**

Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico dell'acido obeticolico nella popolazione pediatrica per il trattamento della PBC.

Il clinico deve prendere visione delle controindicazioni e precauzioni d'impiego riportate in RCP (cfr. par. 4.3-4.4-4.5-4.6-4.7).

Data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma del Medico specialista prescrittore

\_\_\_\_\_

17A05919

