

IMPRESA

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

METIS®
(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE

METIS®**COMPOSIZIONE**

Esfenvalerate* puro g. 5,54 (= 50,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
* p.a. della SUMITOMO Chemical Co. Ltd.

®Marchio della Caffaro S.p.A.

Registrazione Ministero della Sanità
n° 8054 del 08.04.1992

Contenuto: 0,100 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 L Partita n°



SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)
2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano
SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zeson, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (Latina)

CMIPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle. - Irritante per gli occhi e per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione. I solventi presenti nel formulato possono provocare broncopneumoniti chimiche, aritmie cardiache.

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce rapidamente e con buona persistenza per contatto ed ingestione su un'ampia gamma di fitofagi. La modalità di azione richiede una uniforme bagnatura delle parti della pianta da proteggere. Resiste bene al dilavamento ed è poco degradabile dalla luce solare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si impiega, secondo le dosi e modalità indicate, per la protezione delle seguenti colture dai relativi fitofagi:

COLTURE	FITOFAGI	DOSE in ml/hl di acqua
PERO E MELO	AFIDI	30-50 ml/hl
	RICAMATRICI	40-50 ml/hl
	FILLOMINATORI	80-100 ml/hl
	PSILLA a fine inverno	80-100 ml/hl
	a inizio attacco	150-200 ml/hl
VITE	TIGNOLA E TIGNOLETTA	20-30 ml/hl
	CICALINE	20-30 ml/hl
POMODORO	AFIDI	30-50 ml/hl
	DORIFORA	20-40 ml/hl
	MOSCA BIANCA (Aleurodide)	40-60 ml/hl

TABACCO	AFIDI TRIPIDI Epithrix hirtipennis NOTTUE	30-50 ml/hl 55-60 ml/hl 1 litro/ha 110-120 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	AFIDI ALFICA NOTTUE	250-350 ml/ha 1 litro/ha 1 litro/ha
ORZO, FRUMENTO E SEGALE	AFIDI	250-350 ml/ha
PATATA	AFIDI DORIFORA	30-50 ml/hl 20-40 ml/hl
COLZA	AFIDI Ceuthorrhynchus e MELIGETE PIERIS SPP.	250-350 ml/ha 150-200 ml/ha 350-450 ml/ha
ERBA MEDICA	CAVALLETTE (neanidi e adulti) (solo adulti)	100-150 ml/hl 55-100 ml/hl
FLOREALI ED ORNAMENTALI	AFIDI MOSCA BIANCA (Aleurodide)	30-50 ml/hl 150 ml/hl (ripetuto ogni 7-8 giorni)
COTONE	AFIDI NOTTUE	250-350 ml/ha 1 litro/ha
PIOPPO	AFIDI CRIPITORINCO	30-50 ml/hl 30-50 ml/hl
FORESTALI IN VIVAIO	AFIDI	30-50 ml/hl

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, impiegando 18-20 ettolitri di acqua per ettaro su colture arboree e 6-8 su erbacee. Quando si effettuano interventi con pompe a volume ridotto, (somministrando una minore quantità di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Alle dosi consigliate e sulle colture indicate il prodotto si è dimostrato perfettamente selettivo. Impieghi ripetuti e a cadenza ravvicinata possono provocare fenomeni di fitotossicità sul fiore di gerbera.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è molto tossico per pesci, tossico per le api. Non trattare in fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PERO, MELO, POMODORO, PATATA; 14 GIORNI PER VITE; 21 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO E SEGALE; 30 GIORNI PER COLZA E TABACCO; 40 GIORNI PER ERBA MEDICA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Sciogliere a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

Smaltire secondo le norme vigenti

Foglio illustrativo

METIS®
(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce rapidamente e con buona persistenza per contatto ed ingestione su un'ampia gamma di fitofagi. La modalità di azione richiede una uniforme bagnatura delle parti della pianta da proteggere. Resiste bene al dilavamento ed è poco degradabile dalla luce solare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si impiega, secondo le dosi e modalità indicate, per la protezione delle seguenti colture dai relativi fitofagi:

COLTURE	FITOFAGI	DOSE in ml/hl di acqua
PERO E MELO	AFIDI	30-50 ml/hl
	RICAMATRICI	40-50 ml/hl
	FILLOMINATORI	80-100 ml/hl
	PSILLA a fine inverno	80-100 ml/hl
	a inizio attacco	150-200 ml/hl
VITE	TIGNOLA e TIGNOLETTA	20-30 ml/hl
	CICALINE	20-30 ml/hl
POMODORO	AFIDI	30-50 ml/hl
	DORIFORA	20-40 ml/hl
	MOSCA BIANCA	40-60 ml/hl
	(Aleurodide)	
TABACCO	AFIDI	30-50 ml/hl
	TRIPIDI	55-60 ml/hl
	Epithrix hirtipennis	1 litro/ha
	NOTTUE	110-120 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	AFIDI	250-350 ml/ha
	ALTICA	1 litro/ha
	NOTTUE	1 litro/ha
ORZO, FRUMENTO E SEGALE	AFIDI	250-350 ml/ha
PATATA	AFIDI	30-50 ml/hl
	DORIFORA	20-40 ml/hl
COLZA	AFIDI	250-350 ml/ha
	Ceuthorrhyncus e MELIGETE	150-200 ml/ha
	PIERIS SPP.	350-450 ml/ha
ERBA MEDICA	CAVALLETTE (neanidi e adulti)	100-150 ml/hl
	(solo adulti)	55-100 ml/hl
FLOREALI ED ORNAMENTALI	AFIDI	30-50 ml/hl
	MOSCA BIANCA (Aleurodide)	150 ml/hl (ripetuto ogni 7-8 giorni)
COTONE	AFIDI	250-350 ml/ha
	NOTTUE	1 litro/ha
PIOPPO	AFIDI	30-50 ml/hl
	CRIPTORRINCO	30-50 ml/hl
FORESTALI IN VIVAIO	AFIDI	30-50 ml/hl

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, impiegando 18-20 ettolitri di acqua per ettaro su colture arboree e 6-8 su erbacee. Quando si effettuano interventi con pompe a volume ridotto, (somministrando una minore quantità di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Alle dosi consigliate e sulle colture indicate il prodotto si è dimostrato perfettamente selettivo. Impieghi ripetuti e a cadenza ravvicinata possono provocare fenomeni di fitotossicità sul fiore di gerbera.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Il prodotto è molto tossico per pesci, tossico per le api. Non trattare in fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PERO, MELO, POMODORO, PATATA; 14 GIORNI PER VITE; 21 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO E SEGALE; 30 GIORNI PER COLZA E TABACCO; 40 GIORNI PER ERBA MEDICA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Sciogliere a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

Smaltire secondo le norme vigenti

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)
2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

METIS® (CONCENTRATO EMULSIONABILE) INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE		
METIS® COMPOSIZIONE Esfenvalerate* puro g 5,54 (= 50,5 g/l) Coformulanti q.b. a g 100 * p.a. della SUMITOMO Chemical Co. Ltd. ®Marchio della Caffaro S.p.A. Registrazione Ministero della Sanità n° 8054 del 08.04.1992 Contenuto: 100 ml Partita n°		SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A. Parc d'Affaires de Crécy (Télébase) 2, Rue Claude Chappe 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia) distribuito da: CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano Stabilimenti di produzione: CAFFARO S.p.A. - Aprilia (Latina) CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)
FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle. - Irritante per gli occhi e per la pelle. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO		

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione. I solventi presenti nel formulato possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Consultare un Centro Antiveneni.

AVVERTENZA:

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

METIS® DUO
(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE

METIS® DUO**COMPOSIZIONE**

Esfenvalerate* puro g. 11 (= 103 g/l)

Coformulanti q.b. a g. 100

* p.a. della SUMITOMO Chemical Co. Ltd., Osaka - Giappone

*Marchio della Caffaro SpA

Registrazione Ministero della Sanità
n° 8055 del 08.04.1992

Contenuto: 0,100 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 L

Partita n°.....



SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)
2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano
SACAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zexon, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (Latina)**CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)****FRASI DI RISCHIO:** Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e la pelle.**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO****NORME PRECAUZIONALI**

Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocco la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

I solventi presenti nel formulato possono provocare broncopulmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce rapidamente e con buona persistenza per contatto ed ingestione su un'ampia gamma di fitofagi. La modalità di azione richiede una uniforme bagnatura delle parti della pianta da proteggere. Resiste bene al dilavamento ed è poco degradabile dalla luce solare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si impiega, secondo le dosi e modalità indicate, per la protezione delle seguenti colture dai relativi fitofagi:

COLTURE	FITOFAGI	DOSE IN ml/hl di acqua
PERO' E MELO	AFIDI	15-25 ml/hl
	RICAMATRICI	20-25 ml/hl
	FILLOMINATORI	40-50 ml/hl
	PSILLA a fine inverno	40-50 ml/hl
	a inizio attacco	75-100 ml/hl
VITE	TIGNOLA E TIGNOLETTA	10-15 ml/hl
	CICALINE	10-15 ml/hl
POMODORO	AFIDI	15-25 ml/hl
	DORIFORA	10-20 ml/hl
	MOSCA BIANCA (Aleurodide)	20-30 ml/hl

TABACCO	AFIDI	15-25 ml/hl
	TRIPIDI <i>Epithrix hirtipennis</i>	27,5-30 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	AFIDI	50-80 ml/hl (0,5 l/ha)
	ALTICA	55-60 ml/hl
FRUMENTO, ORZO E SEGALE	AFIDI	125-175 ml/ha
	NOTTUE	500 ml/ha
PATATA	AFIDI	125-175 ml/ha
COLZA	AFIDI	15-25 ml/hl
	DORIFORA	10-20 ml/hl
ERBA MEDICA	AFIDI	125-175 ml/ha
	<i>Ceuthorrhynchus</i> e <i>MELIGETE</i>	75-100 ml/ha
FLOREALI ED ORNAMENTALI	PIERIS SPP.	175-225 ml/ha
	CAVALLETTE (neanidi e adulti) (solo adulti)	50-75 ml/hl
COTONE	AFIDI	27,5-50 ml/hl
	NOTTUE	15-25 ml/hl
PIOPPO	MOSCA BIANCA (Aleurodide)	75 ml/hl
	(ripetuto ogni 7-8 giorni)	
FORESTALI IN VIVAIO	AFIDI	125-175 ml/ha
	NOTTUE	0,5 l/ha
PIOPPO	AFIDI	15-25 ml/hl
	CRIFTORRINCO	15-25 ml/hl
FORESTALI IN VIVAIO	AFIDI	15-25 ml/hl

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, impiegando 18-20 ettolitri di acqua per ettaro su colture arboree e 6-8 su erbacee. Quando si effettuano interventi con pompe a volume ridotto, (somministrando una minore quantità di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Alle dosi consigliate e sulle colture indicate il prodotto si è dimostrato perfettamente selettivo. Impieghi ripetuti e a cadenza ravvicinata possono provocare fenomeni di fitotossicità sul fiore di gerbera.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è molto tossico per pesci, tossico per le api. Non trattare in fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PERO, MELO, POMODORO, PATATA; 14 GIORNI PER VITE; 21 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO E SEGALE; 30 GIORNI PER COLZA E TABACCO; 40 GIORNI PER ERBA MEDICA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Foglio illustrativo

METIS® DUO
(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce rapidamente e con buona persistenza per contatto ed ingestione su un'ampia gamma di fitofagi. La modalità di azione richiede una uniforme bagnatura delle parti della pianta da proteggere. Resiste bene al dilavamento ed è poco degradabile dalla luce solare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si impiega, secondo le dosi e modalità indicate, per la protezione delle seguenti colture dai relativi fitofagi:

COLTURE	FITOFAGI	DOSE IN ml/ht di acqua
PERO E MELO	AFIDI	15-25 ml/ht
	RICAMATRICI	20-25 ml/ht
	FILLOMINATORI	40-50 ml/ht
	PSILLA a fine inverno	40-50 ml/ht
	a inizio attacco	75-100 ml/ht
VITE	TIGNOLA E TIGNOLETTA	10-15 ml/ht
	CICALINE	10-15 ml/ht
POMODORO	AFIDI	15-25 ml/ht
	DORIFORA	10-20 ml/ht
	MOSCA BIANCA (Aleurodide)	20-30 ml/ht
TABACCO	AFIDI	15-25 ml/ht
	TRIPIDI	27,5-30 ml/ht
	Epithrix hirtipennis	50-80 ml/ht (0,5 l/ha)
	NOTTUE	55-60 ml/ht
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	AFIDI	125-175 ml/ha
	ALTICA	500 ml/ha
	NOTTUE	500 ml/ha
FRUMENTO, ORZO E SEGALE	AFIDI	125-175 ml/ha
PATATA	AFIDI	15-25 ml/ht
	DORIFORA	10-20 ml/ht
COLZA	AFIDI	125-175 ml/ha
	Ceuthorrhynchus e MELIGETE	75-100 ml/ha
	PIERIS SPP.	175-225 ml/ha
ERBA MEDICA	CAVALLETTE (neanidi e adulti)	50-75 ml/ht
	(solo adulti)	27,5-50 ml/ht
FLOREALI ED ORNAMENTALI	AFIDI	15-25 ml/ht
	MOSCA BIANCA (Aleurodide)	75 ml/ht (ripetuto ogni 7-8 giorni)
COTONE	AFIDI	125-175 ml/ha
	NOTTUE	0,5 l/ha
PIOPPO	AFIDI	15-25 ml/ht
	CRIPTORRINCO	15-25 ml/ht
FORESTALI IN VIVAIO	AFIDI	15-25 ml/ht

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, impiegando 18-20 ettolitri di acqua per ettaro su colture arboree e 6-8 su erbacee. Quando si effettuano interventi con pompe a volume ridotto, (somministrando una minore quantità di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Alle dosi consigliate e sulle colture indicate il prodotto si è dimostrato perfettamente selettivo. Impieghi ripetuti e a cadenza ravvicinata possono provocare fenomeni di fitotossicità sul fiore di gerbera.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è molto tossico per pesci, tossico per le api. Non trattare in fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PERO, MELO, POMODORO, PATATA; 14 GIORNI PER VITE; 21 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO E SEGALE; 30 GIORNI PER COLZA E TABACCO; 40 GIORNI PER ERBA MEDICA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)
2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

Etichetta formato ridotto

METIS® DUO (CONCENTRATO EMULSIONABILE) INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE		
METIS® DUO COMPOSIZIONE Esfenvalerate* puro g. 11 (= 103 g/l) Coformulanti q.b. a g. 100 * p.a. della SUMITOMO Chemical Co. Ltd. Osaka - Giappone *Marchio della Caffaro SpA Registrazione Ministero della Sanità n° 8055 del 08.04.1992 Contenuto: 100 ml Partita n°.....		SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A. Parc d'Affaires de Crécy (Télébase) 2, Rue Claude Chappe 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia) distribuito da: CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zexon, 5 - Milano Stabilimenti di produzione: CAFFARO S.p.A. - Aprilia (Latina) CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)
FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e la pelle. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO		

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

I solventi presenti nel formulato possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Consultare un Centro Antiveneni.

AVVERTENZA:

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

RIZOLEX® 10 PS**(POLVERE SECCA)****FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE FUNGINE
DEL TERRENO E DELLA PARTE AEREA****COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:

Tolclofos metile puro.....g. 10

Coformulanti.....q.b. a g. 100

Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**NATURA DEL RISCHIO:** Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.**NORME DI SICUREZZA:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHEIl RIZOLEX 10 PS è un fungicida organico per il controllo di funghi terricoli quali: *Rhizoctonia solani*, *Sclerotium spp.*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia trifoliorum*, ecc., *Corticium rolfsii*.

RIZOLEX 10 PS si dimostra notevolmente efficace nei confronti di miceti resistenti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si utilizza sulle seguenti colture in concia o mediante trattamenti al terreno. Dopo ogni trattamento al terreno effettuare un'irrigazione od una lavorazione superficiale.

LATTUGA, MELANZANA, RADICCHIO, FAGIOLO, COCOMERO, CAROTA, FAGIOLINO, CAVOLI, CAVOLFIORE, POMODORO, PEPERONE (contro marciumi del colletto - *Rhizoctonia spp.*, *Sclerotinia*, *Sclerotium spp.*):

- Trattamenti al terreno (in pieno campo od in semenzaio):

pre-trapianto o pre-semina: 10-20 g/mq fino a 25-40 g/mq nelle cv. più sensibili.

BARBABIETOLA (contro attacchi di marciume radicale dovuti a *Corticium rolfsii*):

- Trattamento al terreno: 5-15 g/mq.

FLOREALI ED ORNAMENTALI (contro marciumi da *Corticium rolfsii* e *Rhizoctonia solani*):

- Trattamento al terreno: 10-20 g/mq fino a 50 nelle condizioni più difficili.

Aglio e cipolla (contro *Rhizoctonia solani* e *Sclerotium spp.*):

- Trattamento al terreno (in assenza della coltura): 10-20 g/mq.

- Concia del materiale di propagazione: 5-10 g/kg di materiale.

PATATA (contro *Rhizoctonia solani*):

- Concia dei tuberi: 100-300 g/100 Kg di tuberi all'atto della semina.

AVVERTENZA

I semi trattati e residui dalla semina delle colture citate non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Tuttavia, data la formulazione, è consigliabile usarlo da solo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER CAVOLI E CAVOLFIORE; 30 GIORNI PER LATTUGA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, RADICCHIO, FAGIOLO, CAROTA, FAGIOLINO, BARBABIETOLA; 60 GIORNI PER IL COCOMERO.****ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**DA NON VENDERSI SFUSO****IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI****SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.****Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)****2, Rue Claude Chappe****69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)**

distribuito da:

**CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano
SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano**

Stabilimenti di produzione:

Caffaro S.p.A. - Aprilia (LT)**CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)**

Registrazione Ministero della Sanità n° 7969 del 22.03.1991

Contenuto: 0,100 - 0,250 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 25 Kg

Partita n.

Foglio illustrativo per confezioni di formato ridotto

RIZOLEX® 10 PS

(POLVERE SECCA)

**FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE FUNGINE
DEL TERRENO E DELLA PARTE AEREA****CARATTERISTICHE**

Il RIZOLEX 10 PS è un fungicida organico per il controllo di funghi terricoli quali: *Rhizoctonia solani*, *Sclerotium spp.*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia trifoliorum*, ecc., *Corticium rolfsii*.

RIZOLEX 10 PS si dimostra notevolmente efficace nei confronti di miceti resistenti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si utilizza sulle seguenti colture in concia o mediante trattamenti al terreno. Dopo ogni trattamento al terreno effettuare un'irrigazione od una lavorazione superficiale.

LATTUGA, MELANZANA, RADICCHIO, FAGIOLO, COCOMERO, CAROTA, FAGIOLINO, CAVOLI, CAVOLFIORÉ, POMODORO, PEPERONE (contro marciumi del colletto - *Rhizoctonia spp.*, *Sclerotinia*, *Sclerotium spp.*):

- Trattamenti al terreno (in pieno campo od in semenzaio):

pre-trapianto o pre-semina: 10-20 g/mq fino a 25-40 g/mq nelle cv. più sensibili.

BARBABIETOLA (contro attacchi di marciume radicale dovuti a *Corticium rolfsii*):

- Trattamento al terreno: 5-15 g/mq.

FLOREALI ED ORNAMENTALI (contro marciumi da *Corticium rolfsii* e *Rhizoctonia solani*):

- Trattamento al terreno: 10-20 g/mq fino a 50 nelle condizioni più difficili.

Aglio e cipolla (contro *Rhizoctonia solani* e *Sclerotium spp.*)

- Trattamento al terreno (in assenza della coltura): 10-20 g/mq.

- Concìa del materiale di propagazione: 5-10 g/kg di materiale.

PATATA (contro *Rhizoctonia solani*):

- Concìa dei tuberi: 100-300 g/100 Kg di tuberi all'atto della semina.

AVVERTENZA

I semi trattati e residuati dalla semina delle colture citate non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Tuttavia, data la formulazione, è consigliabile usarlo da solo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER CAVOLI E CAVOLFIORÉ; 30 GIORNI PER LATTUGA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, RADICCHIO, FAGIOLO, CAROTA, FAGIOLINO, BARBABIETOLA; 60 GIORNI PER IL COCOMERO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)
2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

Etichetta per confezioni di formato ridotto

RIZOLEX® 10 PS
(POLVERE SECCA)
**FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
FUNGINE DEL TERRENO E DELLA PARTE AEREA**

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono: Contenuto: 0,100 g

Tolclofos metile puro g. 10

Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

¹Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)**SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.**

Parc d'Affairs de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

Caffaro S.p.A.

Aprilia (LT)

CMPA

Z.I. Béziers Cédex (Francia)

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

Registrazione Ministero della Sanità n° 7969 del 22.03.1991

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.
NORME DI SICUREZZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA:**PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

RIZOLEX® 50 PB

(POLVERE BAGNABILE)

FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DEI FUNGHI PATOGENI
DEL TERRENO E DELLA PARTE AEREA, NONCHÉ PER LA CONCIA DI BULBI E TUBERI

® Marchio Sumitomo Chemical Giappone

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Tolclofos-Metile puro.....g. 50

Coformulantiq.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il RIZOLEX 50 PB è un fungicida organico per il controllo di funghi terricoli quali: *Rhizoctonia spp.*, *Corticium spp.*, *Sclerotium spp.*, *Sclerotinia spp.*, *Alternaria spp.*, *Botrytis spp.*

RIZOLEX 50 PB si dimostra notevolmente efficace nei confronti di miceli resistenti ai normali prodotti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si utilizza sulle seguenti colture nelle modalità sottoindicate. Dopo ogni trattamento al terreno effettuare un'irrigazione od una lavorazione superficiale.

LATTUGA (contro *Rhizoctonia solani* e *Sclerotinia sclerotiorum*):

- Trattamenti al terreno: 2-4 fino a 5-8 g/mq.
- Trattamenti alla parte aerea (applicazioni ogni 2-3 settimane): 1-2 Kg/ha.

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, RADICCHIO, FAGIOLO, FAGIOLINO, ZUCCHINO, CAROTA, COCOMERO, CAVOLI, CAVOLFIORE (contro *Rhizoctonia solani*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Corticium rolfii*, *Alternaria spp.*, *Botrytis spp.*):

- Trattamenti al terreno: 2-4 g/mq.
- Trattamenti alla parte aerea (applicazioni ogni 2-3 settimane): 1-2 Kg/ha.
- Concia sementi: 1-2 g/Kg di materiale.

PATATA (contro *Rhizoctonia solani*):

- Concia dei tuberi tramite immersione od aspersione: 200-300 g/ha.
- Trattamento al terreno: 10-20 Kg/ha.
- Trattamento localizzato nei solchi: 80-120 g/100 m lineari.

BARBABUETOLA (contro *Corticium rolfii* e *Rhizoctonia spp.*):

- Trattamento al terreno: 1-3 g/mq.
- Concia dei semi: 80 g/100 kg di seme.

Aglio e cipolla (contro *Rhizoctonia solani* e *Sclerotium spp.*):

- Trattamento al terreno (in assenza della coltura): 2-4 g/mq.
- Concia del materiale di propagazione: 1-2 g/kg di materiale.

FLOREALI ED ORNAMENTALI (contro *Rhizoctonia spp.* e *Corticium spp.*):

- Trattamento al terreno: 3-5 g/mq.
- Concia bulbi, tuberi e rizomi: 1-2 g/Kg di materiale.

FRUMENTO (contro *Rhizoctonia cerealis*):

Trattamento alla parte aerea (fine accostimento): 1-2 Kg/ha.

DISINFEZIONE DEL TERRENO (contro *Rhizoctonia solani*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Corticium rolfii*, *Alternaria solani*): 200-250 g/mc.

AVVERTENZA

CONCIA DELLE SEMENTI DELLE COLTURE CITATE: I semi trattati e residui dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER CAVOLI E CAVOLFIORE; 30 GIORNI PER LATTUGA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, RADICCHIO, FAGIOLO, FAGIOLINO, CAROTA, BARBABUETOLA; 45 GIORNI PER LO ZUCCHINO; 60 GIORNI PER IL COCOMERO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Smaltire secondo le norme vigenti

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano
SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (LT)

CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 7963 del 22.03.1991

Contenuto: 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 25 Kg

Partita n°.....

Etichetta per confezioni di formato ridotto**RIZOLEX® 50 PB**

(POLVERE BAGNABILE)

**FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DEI FUNGHI PATOGENI
DEL TERRENO E DELLA PARTE AEREA, NONCHÉ PER LA CONCIA DI BULBI E TUBERI****COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:

Tolclofos-Metile puro g. 50

Coformulanti q.b. a g. 100

[®]Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)**SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.****Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)****2, Rue Claude Chappe****69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)**

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano**SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zeson, 5 - Milano****Registrazione Ministero della Sanità n° 7963 del 22.03.1991****ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A

Aprilia (LT)

CMPA

Z.I. Béziers Cédex (Francia)

Contenuto: 50 - 100 g

Partita n°.....

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.**NORME DI SICUREZZA:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA:**PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

RIZOLEX 50 PB

(POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)
FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DEI FUNGHI
PATOGENI DEL TERRENO E DELLA PARTE AEREA, NONCHÉ PER LA CONCIA
DI BULBI E TUBERI

COMPOSIZIONE

Toiclofos-Metile puro g 50
Coformulanti q.b. a g.100

**ATTENZIONE: MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da :

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano
SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zeson, 5 - Milano

Contenuto del sacchetto: 250 - 500 g

Registrazione Ministero della Sanità n°7963 del 22.03.1991

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (Latina)

CMFA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione.

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

**DA SCIogliere IN ACQUA SENZA
ROMPERE L'INVOLUCRO**

Foglio illustrativo per confezioni di formato ridotto

RIZOLEX® 50 PB

(POLVERE BAGNABILE)

FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DEI FUNGHI PATOGENI DEL TERRENO E DELLA PARTE AEREA, NONCHÉ PER LA CONCIA DI BULBI E TUBERI

CARATTERISTICHE

Il RIZOLEX 50 PB è un fungicida organico per il controllo di funghi terricoli quali: *Rhizoctonia spp.*, *Corticium spp.*, *Sclerotium spp.*, *Sclerotinia spp.*, *Alternaria spp.*, *Botrytis spp.*.

RIZOLEX 50 PB si dimostra notevolmente efficace nei confronti di miceti resistenti ai normali prodotti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si utilizza sulle seguenti colture nelle modalità sottoindicate. Dopo ogni trattamento al terreno effettuare un'irrigazione od una lavorazione superficiale.

LATTUGA (contro *Rhizoctonia solani* e *Sclerotinia sclerotiorum*):

- Trattamenti al terreno: 2-4 fino a 5-8 g/mq.
- Trattamenti alla parte aerea (applicazioni ogni 2-3 settimane): 1-2 Kg./ha.

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, RADICCHIO, FAGIOLO, FAGIOLINO, ZUCCHINO, CAROTA, COCOMERO, CAVOLI, CAVOLFIORE (contro *Rhizoctonia solani*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Corticium rolfsii*, *Alternaria spp.*, *Botrytis spp.*):

- Trattamenti al terreno: 2-4 g/mq.
- Trattamenti alla parte aerea (applicazioni ogni 2-3 settimane): 1-2 Kg/ha.
- Concia sementi: 1-2 g/Kg di materiale.

PATATA (contro *Rhizoctonia solani*):

- Concia dei tuberi tramite immersione od aspersione: 200-300 g/hl.
- Trattamento al terreno: 10-20 Kg/ha.
- Trattamento localizzato nei solchi: 80-120 g/100 m lineari.

BARBABIETOLA (contro *Corticium rolfsii* e *Rhizoctonia spp.*):

- Trattamento al terreno: 1-3 g/mq.
- Concia dei semi: 80 g/100 kg di seme.

Aglio e cipolla (contro *Rhizoctonia solani* e *Sclerotium spp.*)

- Trattamento al terreno (in assenza della coltura): 2-4 g/mq.
- Concia del materiale di propagazione: 1-2 g/kg di materiale.

FLOREALI ED ORNAMENTALI (contro *Rhizoctonia spp.* e *Corticium spp.*):

- Trattamento al terreno: 3-5 g/mq.
- Concia bulbi, tuberi e rizomi: 1-2 g/Kg di materiale.

FRUMENTO (contro *Rhizoctonia cerealis*):

Trattamento alla parte aerea (fine accestimento): 1-2 Kg/ha.

DISINFEZIONE DEL TERRENO (contro *Rhizoctonia solani*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Corticium rolfsii*, *Alternaria solani*): 200-250 g/mc.

AVVERTENZA

CONCIA DELLE SEMENTI DELLE COLTURE CITATE: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER CAVOLI E CAVOLFIORE; 30 GIORNI PER LATTUGA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, RADICCHIO, FAGIOLO, FAGIOLINO, CAROTA, BARBABIETOLA; 45 GIORNI PER LO ZUCCHINO; 60 GIORNI PER IL COCOMERO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Smaltire secondo le norme vigenti

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)
2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

RIZOLEX® 50 PB

(POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)
FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DEI FUNGHI PATOGENI
DEL TERRENO E DELLA PARTE AEREA, NONCHÉ PER LA CONCIA DI BULBI E TUBERI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Tolclofos-Metile puro.....g. 50

Coformulanti.....q.b. a g. 100

¹Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il RIZOLEX 50 PB è un fungicida organico per il controllo di funghi terricoli quali: *Rhizoctonia spp.*, *Corticium spp.*, *Sclerotium spp.*, *Sclerotinia spp.*, *Alternaria spp.*, *Botrytis spp.*

RIZOLEX 50 PB si dimostra notevolmente efficace nei confronti di miceli resistenti ai normali prodotti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si utilizza sulle seguenti colture nelle modalità sotto indicate. Dopo ogni trattamento al terreno effettuare un'irrigazione od una lavorazione superficiale. Per la preparazione della sospensione vedere gli appositi pittogrammi.

LATTUGA (contro *Rhizoctonia solani* e *Sclerotinia sclerotiorum*):

- Trattamenti al terreno: 2-4 fino a 5-8 g/mq.
- Trattamenti alla parte aerea (applicazioni ogni 2-3 settimane): 1-2 Kg/ha.

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, RADICCHIO, FAGIOLO, FAGIOLINO, ZUCCHINO, CAROTA, COCOMERO, CAVOLI, CAVOLFIORE (contro *Rhizoctonia solani*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Corticium rolfsii*, *Alternaria spp.*, *Botrytis spp.*):

- Trattamenti al terreno: 2-4 g/mq.
- Trattamenti alla parte aerea (applicazioni ogni 2-3 settimane): 1-2 Kg/ha.
- Concia sementi: 1-2 g/Kg di materiale.

PATATA (contro *Rhizoctonia solani*):

- Concia dei tuberi tramite immersione od asperzione: 200-300 g/ha.
- Trattamento al terreno: 10-20 Kg/ha.
- Trattamento localizzato nei spicchi: 80-120 g/100 m lineari.

BARBABIETOLA (contro *Corticium rolfsii* e *Rhizoctonia spp.*):

- Trattamento al terreno: 1-3 g/mq.
- Concia dei semi: 80 g/100 kg di seme.

Aglio e cipolla (contro *Rhizoctonia solani* e *Sclerotium spp.*):

- Trattamento al terreno (in assenza della coltura): 2-4 g/mq.
- Concia del materiale di propagazione: 1-2 g/kg di materiale.

FLOREALI ED ORNAMENTALI (contro *Rhizoctonia spp.* e *Corticium spp.*):

- Trattamento al terreno: 3-5 g/mq.
- Concia bulbi, tuberi e rizomi: 1-2 g/Kg di materiale.

FRUMENTO (contro *Rhizoctonia cerealis*):

Trattamento alla parte aerea (fine accostimento): 1-2 Kg/ha.

DISINFEZIONE DEL TERRENO (contro *Rhizoctonia solani*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Corticium rolfsii*, *Alternaria solani*): 200-250 g/mc.

AVVERTENZA

CONCIA DELLE SEMENTI DELLE COLTURE CITATE: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati

all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER CAVOLI E CAVOLFIORE; 30 GIORNI PER LATTUGA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, RADICCHIO, FAGIOLO, FAGIOLINO, CAROTA, BARBABIETOLA; 45 GIORNI PER LO ZUCCHINO; 60 GIORNI PER IL COCOMERO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano


Stabilimenti di produzione:

Caffaro S.p.A. - Aprilia (Latina)

CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili



Registrazione Ministero della Sanità n° 7963 del 22.03.1991

Contenuto: 1 Kg (4 s.i. da 250 g) - 1 Kg (2 s.i. da 500 g)

Partita n°.....

RIZOLEX® FIORI**(POLVERE BAGNABILE)****FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI
DA RHIZOCTONIA E CORTICIUM DEL TERRENO****COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:

Tolclofos-metil puro g. 50

Coformulanti q.b. a g. 100

^cMarchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA****NATURA DEL RISCHIO:** Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHEIl RIZOLEX FIORI è un fungicida in grado di controllare gli attacchi di Rizoctoniosi (*Rhizoctonia solani*) ed i marciumi radicali portati da *Corticium rolsii* in varie colture floreali quali: rose, garofani, crisantemi, gerbera, fnesia, lillium e bulbose varie.Il RIZOLEX FIORI possiede nei confronti dei patogeni suddetti una azione fungicida notevolissima, controllando efficacemente anche ceppi di *Rhizoctonia solani* e *Corticium rolsii* resistenti ai comuni fungicidi.**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Il prodotto può essere impiegato sia in pre-semina che in post-semina, oppure nel caso di colture che si propagano per via vegetativa (talea, rizoma, tubero o bulbo) in pre o post trapianto. Il RIZOLEX FIORI va distribuito uniformemente sul terreno. Per ottenere una buona distribuzione è consigliabile far seguire al trattamento una irrigazione prolungata.

Dosi consigliate: 30-50 kg/ha e fino a 140 per colture particolarmente sensibili ai suddetti parassiti (lillium, gerbera).

Il RIZOLEX FIORI può essere usato, per la concia a secco, alla dose di 1g/kg di tuberi, bulbi o rizomi, da conciare.

Qualora si preferisca effettuare la concia umida, si prepari una sospensione usando 200 g/hl di RIZOLEX FIORI immergendovi il materiale da conciare per 10 minuti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**Istruzioni per l'eliminazione del prodotto e del suo imballaggio: **SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI****SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.**

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezion, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (Latina)

CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 6378 del 06.05.1985

Contenuto: 0,05 - 0,1 - 1 Kg Partita n°.....

RIZOLEX® FIORI**(POLVERE BAGNABILE)****FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA RHIZOCTONIA E CORTICIUM DEL TERRENO****CARATTERISTICHE**

Il RIZOLEX FIORI è un fungicida in grado di controllare gli attacchi di Rizoctoniosi (*Rhizoctonia solani*) ed i marciumi radicali portati da *Corticium rolsii* in varie colture floreali quali: rose, garofani, crisantemi, gerbera, fresia, lillium e bulbose varie.

Il RIZOLEX FIORI possiede nei confronti dei patogeni suddetti una azione fungicida notevolissima, controllando efficacemente anche ceppi di *Rhizoctonia solani* e *Corticium rolsii* resistenti ai comuni fungicidi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto può essere impiegato sia in pre-semina che in post-semina, oppure nel caso di colture che si propagano per via vegetativa (talea, rizoma, tubero o bulbo) in pre o post trapianto. Il RIZOLEX FIORI va distribuito uniformemente sul terreno. Per ottenere una buona distribuzione è consigliabile far seguire al trattamento una irrigazione prolungata.

Dosi consigliate: 30-50 kg/ha e fino a 140 per colture particolarmente sensibili ai suddetti parassiti (lillium, gerbera).

Il RIZOLEX FIORI può essere usato, per la concia a secco, alla dose di 1g/kg di tuberi, bulbi o rizomi, da conciare.

Qualora si preferisca effettuare la concia umida, si prepari una sospensione usando 200 g/hl di RIZOLEX FIORI immergendovi il materiale da conciare per 10 minuti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

Istruzioni per l'eliminazione del prodotto e del suo imballaggio: **SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

RIZOLEX® FIORI

(POLVERE BAGNABILE)

**FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DELLE
INFEZIONI DA RHIZOCTONIA E CORTICIUM DEL TERRENO****COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono: Contenuto: 50 – 100 g

Tolclofos-metil puro g. 50

Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n°

¹Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company – Osaka (Giappone)**SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.**

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A.

Aprilia (Latina)

CMPA

Z.I. Béziers Cédex (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 6378 del 06.05.1985

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA:**PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

RIZOLEX® P

(POLVERE BAGNABILE)

FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DEI FUNGHI PATOGENI DEL TERRENO E DELLA PARTE AEREA, NONCHÉ PER LA CONCIA DI BULBI E TUBERI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Procimidone purog. 15

Tolclofos metile purog. 30

Coformulantiq.b. a g. 100

Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il RIZOLEX P è un fungicida organico per il controllo di funghi terricoli quali: *Rhizoctonia solani*, *Sclerotium spp.*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Corticium rolfsii*, *Alternaria spp.*, *Botrytis spp.*

RIZOLEX P si dimostra notevolmente efficace nei confronti di miceti resistenti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si utilizza sulle seguenti colture in concia o mediante trattamenti al terreno. Dopo ogni trattamento al terreno effettuare un'irrigazione od una lavorazione superficiale.

POMODORO, PEPERONE (contro Marciumi del colletto - *Rhizoctonia spp.*, *Sclerotinia spp.*, *Sclerotium spp.*):

- Trattamenti al terreno (in campo ed in sementaio: pre-trapianto o pre-semina: 4-8 g/mq.
- Trattamenti localizzati sulla fila (in campo): 1-2 g/metro lineare.

FLOREALI (contro Marciumi da *Corticium rolfsii* e *Rhizoctonia solani*):

- Trattamento al terreno: 50 Kg/Ha fino a 100 Kg/ha nelle condizioni più difficili.
- Concia bulbi, tuberi e rizomi: 1-2 g/Kg di materiale.

AGLIO E CIPOLLA (contro *Rhizoctonia solani* e *Sclerotium spp.*)

- Trattamento al terreno (in assenza della coltura): 2-4 g/mq.

AVVERTENZA

I semi trattati e residui dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezion, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (LT)

CMFA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 7968 del 22.03.1991

Contenuto: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 25 Kg

Partita n°.....

Foglio illustrativo per confezioni di formato ridotto

RIZOLEX[®] P

(POLVERE BAGNABILE)

FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DEI FUNGHI PATOGENI
DEL TERRENO E DELLA PARTE AEREA, NONCHÉ PER LA CONCIA DI BULBI E TUBERI

CARATTERISTICHE

Il RIZOLEX P è un fungicida organico per il controllo di funghi terricoli quali: *Rhizoctonia solani*., *Sclerotium spp.*, *Sclerotinia sclerotiorum*., *Corticium rolfsii*, *Alternaria spp.*, *Botrytis spp.*.

RIZOLEX P si dimostra notevolmente efficace nei confronti di miceti resistenti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si utilizza sulle seguenti colture in concia o mediante trattamenti al terreno. Dopo ogni trattamento al terreno effettuare un'irrigazione od una lavorazione superficiale.

POMODORO, PEPERONE (contro Marciumi del colletto - *Rhizoctonia spp.* , *Sclerotinia spp.*, *Sclerotium spp.*):

- Trattamenti al terreno (in campo ed in semenzaio:
pre-trapianto o pre-semina: 4-8 g/mq.

- Trattamenti localizzati sulla fila (in campo): 1-2 g/metro lineare.

FLOREALI (contro Marciumi da *Corticium rolfsii* e *Rhizoctonia solani*):

- Trattamento al terreno: 50 Kg/ha fino a 100 Kg/ha nelle condizioni più difficili.

- Concina bulbi, tuberi e rizomi: 1-2 g/Kg di materiale.

AGLIO E CIPOLLA (contro *Rhizoctonia solani* e *Sclerotium spp.*)

- Trattamento al terreno (in assenza della coltura): 2-4 g/mq.

AVVERTENZA

I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)
2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

Etichetta per confezioni di formato ridotto**RIZOLEX[®] P****(POLVERE BAGNABILE)****FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DEI FUNGHI
PATOGENI DEL TERRENO E DELLA PARTE AEREA, NONCHÉ PER LA
CONCIA DI BULBI E TUBERI****COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono: Contenuto: 100 g

Procimidone puro g. 15

Tolclofos metile puro... g. 30

Partita n°.....

Coformulanti..... q.b. a g. 100

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da :

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezion, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A

Aprilia (LT)

CMPA

Z.I. Béziers Cédex (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 7968 del 22.03.1991

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.
NORME DI SICUREZZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA:**PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

SIALEX®**POLVERE BAGNABILE****FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA, DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI E FLOREALI****COMPOSIZIONE**

Procimidone puro.....g. 50

Coformulanti.....q.b. a g. 100

*Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**NATURA DEL RISCHIO:** Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.**NORME DI SICUREZZA:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHEIl SIALEX è un fungicida particolarmente attivo nei confronti della *Botrytis cinerea*, della *Sclerotinia* ed altri funghi che affliggono le colture eduli e floreali.**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (1500-1800 l per ettaro per i fruttiferi, 1000 l per ettaro per la vite e 800-800 l per ettaro per le colture erbacee). Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

VITE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Intervenire alla dose di 80-150 g di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: fine fioritura, pre-chiusura grappolo, invaiatura, tre settimane prima del raccolto. In annate di normale pressione infettiva sono sufficienti due trattamenti, il primo in pre-chiusura grappolo ed il secondo all'invaiatura. Nel caso di varietà particolarmente suscettibili (Pinot, Tocai, Merlot, Riesling, Verdicchio, Schiava, Barbera, Moscato bianco), è opportuno intervenire anche in fine fioritura.

Trattamenti polverulenti: il prodotto può anche essere somministrato tal quale, miscelato allo zolfo polverulento, in ragione di 500 g di SIALEX ogni 10 Kg di zolfo in trattamenti su tutta la vegetazione o di 1000 g ogni 10 Kg di zolfo nel caso di trattamenti localizzati nella zona dei grappoli. I criteri per la scelta dell'epoca di intervento sono uguali a quelli adottati per i trattamenti liquidi.

FRAGOLA: contro Muffa grigia:

Intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: inizio fioritura, quando il 10-20% dei fiori sono aperti, alla sfioritura. È indispensabile un'ottima bagnatura della pianta.

POMODORO: contro Muffa grigia:

Intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 l di acqua a partire dalla fioritura del primo paio di fiori ripetendoli ogni 15 giorni.

LATTUGA E INDIVIA: contro Muffa grigia e *Sclerotinia*:

Applicare 1,5-2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto. Il trattamento può essere ripetuto ogni 10-12 giorni. Nel caso di colture non trapiantate intervenire quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Non effettuare più di due trattamenti per stagione.

TABACCO: contro Muffa grigia e *Sclerotinia*:

Applicare 1,5 - 2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto.

GIRASOLE:- Concia (contro *Sclerotinia*): 100-200 g per 100 Kg di seme.- Trattamenti alla parte aerea (contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia*): intervenire alla dose di 100 g per 100 l di acqua effettuando uno-due trattamenti prima della fioritura.**FLOREALI** in serra ed in campo (escluso il ciclamino):- contro *Botrytis* intervenire alla dose di g 40-80 per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, ripetendo eventualmente i trattamenti ogni 10-14 giorni.- contro *Rhizoctonia* e *Sclerotinia*: 4 g/mq di superficie in 5-10 l di acqua, dopo la crisi di trapianto.**PESCO, ALBICOCCO, SUSINO:** contro Marciume bruno (*Monilia*):

- Marciume dei fiori: effettuare due o tre trattamenti nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di g 150-200 di prodotto ogni 100 l di acqua.

- Marciume dei frutti: intervenire alla dose di 100-150 g per 100 l di acqua 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta.

MANDORLO: contro Marciume bruno (*Monilia*):

- Marciume dei fiori: intervenire nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di g 150-200 di prodotto ogni 100 l di acqua.

PEPERONE e MELANZANA: contro Muffa grigia e *Sclerotinia*:

Trattamenti alla parte aerea: 80-100 g per 100 l di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegazione dei primi frutti. (Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Su MELANZANA e PEPPERONE non effettuare rispettivamente più di tre ed un intervento per stagione).

AGLIO: contro *Botrytis* spp. e *Sclerotium cepivorum*:

- Trattamento ai bulbi: 30 g/100 Kg di materiale.

- Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4ª foglia.

CIPOLLA: contro *Botrytis* spp.:

- Trattamento al seme: 1 g per Kg di seme

- Trattamenti alla parte aerea: 100-150 g per 100 l di acqua avendo cura di utilizzare attrezzature a basso volume, a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4ª foglia.

COLZA: contro *Sclerotinia sclerotiorum*:

Intervenire ad inizio fioritura alla dose di 1-1,5 Kg/ha.

CETRIOLO: contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia sclerotiorum*:

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegazione dei primi frutti.

FAGIOLINO: contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia sclerotiorum*:

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegazione dei primi frutti.

ACTINIDIA: contro Muffa grigia e *Sclerotinia*:

Trattamenti in pre-raccolta:

Applicare 75-100 g per 100 l di acqua alla fine della fioritura-inizio caduta petali ed eventualmente prima della raccolta.

Difesa in post-raccolta:

Trattamenti con doccia (drencher): utilizzare una sospensione allo 0,012% (12 g di prodotto/ogni 100 l di acqua). Trattamenti mediante immersione: immergere il materiale in una sospensione allo 0,012% (12 g di prodotto ogni 100 l di acqua).

NOCCILO: contro Marciume bruno:

Applicare 75-100 g per 100 l di acqua in prossimità dell'allegazione.

PERO: contro Maculatura bruna:

Intervenire alla dose di 100-150 g per 100 l di acqua a partire dalla fine della fioritura, ogni 7-10 giorni, in funzione del pericolo di infezione. Le dosi possono essere dimezzate utilizzando il prodotto in miscela con formulati a base di Tiram o di Mancozeb, avendo cura di intensificare la cadenza dei trattamenti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto, alle dosi e modalità di etichetta, non è fitotossico. Sulle colture floreali, data la grande variabilità di specie e cultivars, è consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PESCO, PERO, FRAGOLA, CETRIOLO, POMODORO, PEPPERONE, ACTINIDIA, MELANZANA, LATTUGA, INDIVIA, FAGIOLINO, ALBICOCCO; 21 GIORNI PER VITE, SUSINO, GIRASOLE; 45 GIORNI PER COLZA; 60 GIORNI PER ACTINIDIA POST-RACCOLTA.**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**DA NON VENDERSI SFUSO**

Il contenitore non può essere riutilizzato

Smaltire secondo le norme vigenti

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano**SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano**

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (Latina)**CMPA - Z.I. Béziers Cedex (Francia)**

Registrazione Ministero della Sanità n° 4662 del 05.02.1982

Contenuto: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 Kg

Partita n°

SIALEX®

POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI
FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA,
DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI E FLOREALI

COMPOSIZIONE

Proclimidone puro g. 50

Coformulanti q.b. a g. 100

* Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il SIALEX è un fungicida particolarmente attivo nei confronti della *Botrytis cinerea*, della Sclerotinia ed altri funghi che affliggono le colture eduli e floreali. La confezione in sacchetti idrosolubili rende l'utilizzo del prodotto particolarmente semplice e sicuro.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto è confezionato in sacchetti idrosolubili da 100 g ciascuno. Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (1500-1800 l per ettaro per i fruttiferi, 1000 l per ettaro per le viti e 600-800 l per ettaro per le colture erbacee). Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

VITE: contro *Botrytis cinerea*. Intervenire alla dose di 80-150 g di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: - fine fioritura; - pre-chiusura grappolo; - invaiatura; - tre settimane prima del raccolto. In annate di normale pressione infettiva sono sufficienti due trattamenti, il primo in pre-chiusura grappolo ed il secondo all'invaiatura. Nel caso di varietà particolarmente suscettibili (Pinot, Tocai, Merlot, Riesling, Verdicchio, Schiava, Barbera, Moscato bianco), è opportuno intervenire anche in fine fioritura.

Trattamenti polverulenti: Il prodotto può anche essere somministrato tal quale, miscelato allo zolfo polverulento, in ragione di 500 g di SIALEX ogni 10 Kg di zolfo in trattamenti su tutta la vegetazione o di 1000 g ogni 10 Kg di zolfo nel caso di trattamenti localizzati nella zona dei grappoli. I criteri per la scelta dell'epoca di intervento sono uguali a quelli adottati per i trattamenti liquidi.

FRAGOLA: contro *Muffa grigia*. Intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: - inizio fioritura; - quando il 10-20% dei fiori sono aperti; - alla sfioritura. È indispensabile un'ottima bagnatura della pianta.

POMODORO: contro *Muffa grigia* e *Sclerotinia*. Intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 l di acqua a partire dalla fioritura del primo palco fiorato ripetendoli ogni 15 giorni.

LATTUGA E INDIVIA: contro *Muffa grigia* e *Sclerotinia*. Applicare 1,5-2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto. Il trattamento può essere ripetuto ogni 10-12 giorni. Nel caso di colture non trapiantate intervenire quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Non effettuare più di due trattamenti per stagione.

TABACCO: contro *Muffa grigia* e *Sclerotinia*. Applicare 1,5 - 2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto.

GIRASOLE: Concia (contro *Sclerotinia*): 100-200 g per 100 Kg di seme. Trattamenti alla parte aerea (contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia*): intervenire alla dose di 100 g per 100 l di acqua effettuando uno-due trattamenti prima della fioritura.

FLOREALI in serra ed in campo (escluso il ciclamino): contro *Botrytis* intervenire alla dose di g 40-80 per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, ripetendo eventualmente i trattamenti ogni 10-14 giorni. Contro *Rhizoctonia* e *Sclerotinia*: 4 g/mq di superficie in 5-10 l di acqua, dopo la crisi di trapianto.

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO: contro *Marciume bruno* (*Monilia*):

Marciume dei fiori: Effettuare due o tre trattamenti nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di g 150-200 di prodotto ogni 100 l di acqua.

Marciume dei frutti: Intervenire alla dose di 100-150 g per 100 l di acqua 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta.

MANDORLO: contro *Marciume bruno* (*Monilia*): **Marciume dei fiori:** Intervenire nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di g 150-200 di prodotto ogni 100 l di acqua.

PEPERONE e MELANZANA: contro *Muffa grigia* e *Sclerotinia*. Trattamenti alla parte aerea: 80-100 g per 100 l di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. (Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Su MELANZANA e PEPERONE non effettuare rispettivamente più di tre ed un intervento per stagione).

AGLIO: contro *Botrytis spp.* e *Sclerotium cephalorum*. Trattamento ai bulbilli: 30 g/100 Kg di materiale. Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4ª foglia.

CIPOLLA: contro *Botrytis spp.*. Trattamento al seme: 1 g per Kg di seme. Trattamenti alla parte aerea: 100-150 g per 100 l di acqua avendo cura di utilizzare attrezzature a basso volume, a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4ª foglia.

COLZA: contro *Sclerotinia sclerotiorum*. Intervenire ad inizio fioritura alla dose di 1-1,5 Kg/ha.

CETRILOLO: contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia sclerotiorum*. Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

FAGIOLINO: contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia sclerotiorum*. Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

ACTINIDIA: contro *Muffa grigia* e *Sclerotinia*. Trattamenti in pre-raccolta: Applicare 75-100 g per 100 l di acqua alla fine della fioritura-inizio caduta petali ed eventualmente prima della raccolta. Difesa in post-raccolta: Trattamenti con doccia (drencher): utilizzare una

sospensione allo 0,012% (12 g di prodotto ogni 100 l di acqua). Trattamenti mediante immersione: immergere il materiale in una sospensione allo 0,012% (12 g di prodotto ogni 100 l di acqua).

NOCCIOLO: contro *Marciume bruno*: Applicare 75-100 g per 100 l di acqua in prossimità dell'allegagione.

PERO: contro *Meculatura bruna*: Intervenire alla dose di 100-150 g per 100 l di acqua a partire dalla fine della fioritura, ogni 7-10 giorni, in funzione del pericolo di infezione. Le dosi possono essere dimezzate utilizzando il prodotto in miscela con formulati a base di Tiram o di Mancozeb, avendo cura di intensificare la cadenza dei trattamenti.

PREPARAZIONE DEI TRATTAMENTI AL TERRENO ED ALLA PARTE AEREA

Per un'ottimale preparazione della sospensione da irrorare, occorre seguire alcuni semplici accorgimenti: - riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione; - immettere la giusta quantità di sacchetti idrosolubili (i quali non devono essere aperti) direttamente all'interno del serbatoio stesso; - completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione per circa 5-10 minuti il meccanismo di agitazione dell'irroratrice, onde facilitare la solubilizzazione della confezione e l'omogeneizzazione della miscela. Utilizzando acque particolarmente fredde, il tempo necessario alla solubilizzazione ed all'omogeneizzazione della miscela può aumentare.

PREPARAZIONE SOSPENSIONE CONCIANTE

Immergere i sacchetti idrosolubili in una quantità di acqua pari a 0,5-1,5 l/100 Kg. di materiale da trattare (in funzione delle dimensioni dello stesso) e mescolare fino alla completa omogeneizzazione della miscela. La sospensione ottenuta può essere miscelata direttamente alla semente oppure spruzzata mediante apposite apparecchiature.

AVVERTENZA: Il materiale trattato o residuo dalla semina non deve essere destinato all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione del materiale conciato non riutilizzabile devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici e nocivi.

PREPARAZIONE TRATTAMENTI POST-RACCOLTA

Immergere i sacchetti idrosolubili nel quantitativo di acqua che si intende utilizzare e curare molto la solubilizzazione dei sacchetti e l'omogeneizzazione della miscela.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto, alle dosi e modalità di etichetta, non è fitotossico. Sulle colture floreali, data la grande variabilità di specie e cultivars, è consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENSORE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PESCO, PERO, FRAGOLA, CETRILOLO, POMODORO, PEPPERONE, ACTINIDIA, MELANZANA, LATTUGA, INDIVIA, FAGIOLINO, ALBICOCCO; 21 GIORNI PER VITE, SUSINO, GIRASOLE; 45 GIORNI PER COLZA; 60 GIORNI PER ACTINIDIA POST-RACCOLTA.

ATTENZIONE: Impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore non può essere riutilizzato

Smaltire secondo le norme vigenti

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (Latina)

CMPA - Z.I. Béziers Cedex (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 4662 del 05.02.1982

Contenuto: 1 Kg (10 s.i. da 100 g)

Partita n°

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili



1
Riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3



2
Introdurre il numero previsto di sacchetti idrosolubili chiusi (come da etichetta) nell'irroratrice. Mettere in



3
Attendere lo scioglimento dei sacchetti (5-10 minuti) ed...



4
... aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

Foglio illustrativo per confezioni di formato ridotto

SIALEX®

(POLVERE BAGNABILE)

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA, DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI E FLOREALI**CARATTERISTICHE**

Il SIALEX è un fungicida particolarmente attivo nei confronti della *Botrytis cinerea*, della Sclerotinia ed altri funghi che affliggono le colture eduli e floreali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (1500-1800 l per ettaro per i fruttiferi, 1000 l per ettaro per la vite e 600-800 l per ettaro per le colture erbacee). Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

VITE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Intervenire alla dose di 80-150 g di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: fine fioritura, pre-chiusura grappolo, invaiatura, tre settimane prima del raccolto. In annate di normale pressione infettiva sono sufficienti due trattamenti, il primo in pre-chiusura grappolo ed il secondo all'invaiatura. Nel caso di varietà particolarmente suscettibili (Pinot, Tocal, Merlot, Riesling, Verdicchio, Schiava, Barbera, Moscato bianco), è opportuno intervenire anche in fine fioritura.

Trattamenti polverulenti: il prodotto può anche essere somministrato tal quale, miscelato allo zolfo polverulento, in ragione di 500 g di SIALEX ogni 10 Kg di zolfo in trattamenti su tutta la vegetazione o di 1000 g ogni 10 Kg di zolfo nel caso di trattamenti localizzati nella zona dei grappoli. I criteri per la scelta dell'epoca di intervento sono uguali a quelli adottati per i trattamenti liquidi.

FRAGOLA: contro Muffa grigia:

Intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: inizio fioritura, quando il 10-20% dei fiori sono aperti, alla sfioritura. È indispensabile un'ottima bagnatura della pianta.

POMODORO: contro Muffa grigia:

Intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 l di acqua a partire dalla fioritura del primo palco florale ripetendoli ogni 15 giorni.

LATTUGA E INDIVIA: contro Muffa grigia e Sclerotinia:

Applicare 1,5-2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto. Il trattamento può essere ripetuto ogni 10-12 giorni. Nel caso di colture non trapiantate intervenire quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Non effettuare più di due trattamenti per stagione.

TABACCO: contro Muffa grigia e Sclerotinia:

Applicare 1,5 - 2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto.

GIRASOLE:

- Concia (contro Sclerotinia): 100-200 g per 100 Kg di seme.

- Trattamenti alla parte aerea (contro *Botrytis cinerea* e Sclerotinia): intervenire alla dose di 100 g per 100 l di acqua effettuando uno-due trattamenti prima della fioritura.

FLOREALI in serra ed in campo (escluso il ciclamino):

- contro *Botrytis* intervenire alla dose di g 40-60 per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, ripetendo eventualmente i trattamenti ogni 10-14 giorni.

- contro *Rhizoctonia* e Sclerotinia: 4 g/mq di superficie in 5-10 l di acqua, dopo la crisi di trapianto.

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO: contro Marciume bruno (Monilia):

- Marciume dei fiori: effettuare due o tre trattamenti nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di g 150-200 di prodotto ogni 100 l di acqua.

- Marciume dei frutti: intervenire alla dose di 100-150 g per 100 l di acqua 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta.

MANDORLO: contro Marciume bruno (Monilia):

Marciume dei fiori: intervenire nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di g 150-200 di prodotto ogni 100 l di acqua.

PEPERONE e MELANZANA: contro Muffa grigia e Sclerotinia:

Trattamenti alla parte aerea: 80-100 g per 100 l di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. (Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Su MELANZANA e PEPPERONE non effettuare rispettivamente più di tre ed un intervento per stagione).

AGLIO: contro *Botrytis* spp. e *Sclerotium cepivorum*:

- Trattamento ai bulbilli: 30 g/100 Kg di materiale.

- Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4ª foglia.

CIPOLLA: contro *Botrytis* spp.:

- Trattamento al seme: 1 g per Kg di seme

- Trattamenti alla parte aerea: 100-150 g per 100 l di acqua avendo cura di utilizzare attrezzature a basso volume, a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4ª foglia.

COLZA: contro Sclerotinia sclerotiorum:

Intervenire ad inizio fioritura alla dose di 1-1,5 Kg/ha.

CETRIOLO: contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia sclerotiorum*:

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

FAGIOLINO: contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia sclerotiorum*:

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

ACTINIDIA: contro Muffa grigia e Sclerotinia:

Trattamenti in pre-raccolta:

Applicare 75-100 g per 100 l di acqua alla fine della fioritura-inizio caduta petali ed eventualmente prima della raccolta.

Difesa in post-raccolta:

Trattamenti con doccia (drencher): utilizzare una sospensione allo 0,012% (12 g di prodotto ogni 100 l di acqua). Trattamenti mediante immersione: immergere il materiale in una sospensione allo 0,012% (12 g di prodotto ogni 100 l di acqua).

NOCCIOLO: contro Marciume bruno:

Applicare 75-100 g per 100 l di acqua in prossimità dell'allegagione.

PERO: contro Maculatura bruna:

Intervenire alla dose di 100-150 g per 100 l di acqua a partire dalla fine della fioritura, ogni 7-10 giorni, in funzione del pericolo di infezione. Le dosi possono essere dimezzate utilizzando il prodotto in miscela con formulati a base di Tiram o di Mancozeb, avendo cura di intensificare la cadenza dei trattamenti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto, alle dosi e modalità di etichetta, non è fitotossico. Sulle colture floreali, data la grande variabilità di specie e cultivars, è consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PESCO, PERO, FRAGOLA, CETRIOLO, POMODORO, PEPPERONE, ACTINIDIA, MELANZANA, LATTUGA, INDIVIA, FAGIOLINO, ALBICOCCO; 21 GIORNI PER VITE, SUSINO, GIRASOLE; 45 GIORNI PER COLZA; 60 GIORNI PER ACTINIDIA POST-RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VERSARSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase) - 2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

SIALEX®

(POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)
FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA
MUFFA GRIGIA, DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI
DI NUMEROSE COLTURE EDULI E FLOREALI

COMPOSIZIONE

Procimidone puro g 50

Coformulanti q.b. a g.100

®Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company
Osaka (Giappone)

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da :

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano**SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano**

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (Latina)**CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)**

Registrazione Ministero della Sanità n° 4662 del 05.02.1982

Contenuto del sacchetto: 100 g

Partita n.

**AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione
DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA
CONFEZIONE**

**DA SCIogliere IN ACQUA SENZA
ROMPERE**

Etichetta per confezioni in formato ridotto

SIALEX[®]
(POLVERE BAGNABILE)
**FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA,
DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI E FLOREALI**

COMPOSIZIONE

Procimidone puro g. 50
Coformulanti q.b. a g. 100

Contenuto: 100 g**Partita n°**

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

[®]Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da :

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. Aprilia (Latina)**CMPA**

Z.I. Béziers Cédex (Francia)

**Registrazione Ministero della Sanità
n° 4662 del 05.02.1982****NATURA DEL RISCHIO:** Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.**NORME DI SICUREZZA:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA:**PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

SIALEX® 50 WDG
GRANULI IDRODISPERSIBILI
FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA,
DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI E FLOREALI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Procimidone puro g. 50

Coformulanti q.b. a g. 100

*Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**NATURA DEL RISCHIO:** Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.**NORME DI SICUREZZA:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHEIl SIALEX 50 WDG è un fungicida particolarmente attivo nei confronti della *Botrytis cinerea*, della Sclerotinia ed altri funghi che affliggono le colture eduli e floreali.**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (2000 l per ettaro per le pomacee e le drupacee, 1000 l per ettaro per la vite e 600-800 l per ettaro per le altre colture).

Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

VITE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Intervenire alla dose di 80-150 g. di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: fine fioritura, pre-chiusura grappolo, invaiatura, tre settimane prima del raccolto. In annate di normale pressione infettiva sono sufficienti due trattamenti, il primo in pre-chiusura grappolo ed il secondo all'invaiatura. Nel caso di varietà particolarmente suscettibili (Pinot, Tocai, Merlot, Riesling, Verdicchio, Schiava, Barbera, Moscato bianco), è opportuno intervenire anche in fine fioritura.

FRAGOLA: contro Muffa grigia

Intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: inizio fioritura, quando il 10-20% dei fiori sono aperti, alla sfioritura. È indispensabile un'ottima bagnatura della pianta.

POMODORO: contro Muffa grigia

Intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 l di acqua a partire dalla fioritura del primo palco florale ripetendoli ogni 15 giorni.

LATTUGA, INDIVIA: contro Muffa grigia e Sclerotinia

Applicare 1,5-2 Kg/Ha dopo il superamento della crisi di trapianto. Il trattamento può essere ripetuto ogni 10-12 giorni. Nel caso di colture non trapiantate intervenire quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Non effettuare più di due trattamenti per stagione.

TABACCO: contro Muffa grigia e Sclerotinia

Applicare 1,5 - 2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto.

GIRASOLE:

- Concina (contro Sclerotinia): 100-200 g per 100 Kg di seme.

- Trattamenti alla parte aerea (contro *Botrytis cinerea* e Sclerotinia): intervenire alla dose di 100 g per 100 l di acqua effettuando uno-due trattamenti prima della fioritura.**FLOREALI** in serra ed in campo (escluso il ciclamino):- contro *Botrytis* intervenire alla dose di g. 40-80 per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, ripetendo eventualmente i trattamenti ogni 10-14 giorni.- contro *Rhizoctonia* e Sclerotinia: 4 g/mq di superficie in 5-10 l di acqua, dopo la crisi di trapianto.**PESCO, ALBICOCCO, SUSINO:** contro Marciume bruno (*Monilia*)

- Marciume dei fiori: effettuare due o tre trattamenti nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di g. 150-200 di prodotto ogni 100 l di acqua.

- Marciume dei frutti: intervenire alla dose di 100-150 g per 100 l di acqua 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta.

MANDORLO: contro Marciume bruno (*Monilia*)

Marciume dei fiori: intervenire nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di g. 150-200 di prodotto ogni 100 l di acqua.

PEPERONE e MELANZANA: contro Muffa grigia e Sclerotinia

Trattamenti alla parte aerea: 80-100 g per 100 l di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. (Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Su MELANZANA e PEPERONE non effettuare rispettivamente più di tre ed un intervento per stagione).

AGLIO: contro *Botrytis* spp. e *Sclerotium cepivorum*

- Trattamento ai bulbilli: 30 g/100 Kg di materiale.

- Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4ª foglia.

CIPOLLA: contro *Botrytis* spp.

- Trattamento al seme: 1 g per Kg di seme

- Trattamenti alla parte aerea: 100-150 g per 100 l di acqua avendo cura di utilizzare attrezzature a basso volume, a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4ª foglia.

COLZA: contro *Sclerotinia sclerotiorum*

Intervenire ad inizio fioritura alla dose di 1-1,5 Kg/Ha.

CETRIOLO: contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia sclerotiorum*

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

FAGIOLINO: contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia sclerotiorum*

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

ACTINIDIA: contro Muffa grigia e Sclerotinia

Trattamenti in pre-raccolta: applicare 75-100 g per 100 l di acqua alla fine della fioritura-inizio caduta petali ed eventualmente prima della raccolta.

Difesa in post-raccolta: trattamenti con doccia (drencher): utilizzare una sospensione allo 0,012% (12 g di prodotto ogni 100 l di acqua). Trattamenti mediante immersione: immergere il materiale in una sospensione allo 0,012% (12 g di prodotto ogni 100 l di acqua).

NOCCIOLO: contro Marciume bruno

Applicare 75-100 g per 100 l di acqua in prossimità dell'allegagione.

PERO: contro Marciumatura bruna: Intervenire alla dose di 100-150 g per 100 l di acqua a partire dalla fine della fioritura, ogni 7-10 giorni, in funzione del pericolo di infezione. Le dosi possono essere dimezzate utilizzando il prodotto in miscela con formulati a base di Tiram o di Mancozeb, avendo cura di intensificare la cadenza dei trattamenti.**AVVERTENZA PER LA CONCIA DELLE SEMENTI**

I semi trattati e residui dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto è miscibile con i più comuni fitofarmaci utilizzati in agricoltura.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Sulle colture floreali, data la grande variabilità di specie e cultivars, è consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PESCO, PERO, FRAGOLA, CETRIOLO, POMODORO, PEPERONE, ACTINIDIA, MELANZANA, LATTUGA, INDIVIA, FAGIOLINO, ALBICOCCO; 21 GIORNI PER VITE, SUSINO, GIRASOLE; 45 GIORNI PER COLZA; 60 GIORNI PER ACTINIDIA POST-RACCOLTA.**ATTENZIONE:** impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore non può essere riutilizzato

Smaltire secondo le norme vigenti

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano**SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano**

Stabilimenti di produzione:

SUMITOMO CHEMICAL CO. - Ohita (Giappone)**CAFFARO S.p.A - Aprilia (LT)****A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)**

Stabilimenti di confezionamento:

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Torrenieri - Montalcino (SI)**Società BAM di Benazzi e Urtini S.n.c. - San Patrizio di Conselice (RA)****STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)****Registrazione Ministero della Sanità n° 8325 del 15.06.1993**

Contenuto: 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25 Kg

Partita n°.....

SIALEX® 50 WDG

GRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI
FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA,
DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI E FLOREALI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Procimidone puro g. 50

Coformulanti q.b. a g. 100

Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il SIALEX 50 WDG è un fungicida particolarmente attivo nei confronti della *Botrytis cinerea*, della Sclerotinia ed altri funghi che affliggono le colture eduli e floreali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto è confezionato in sacchetti idrosolubili da 250 e 500 g ciascuno. Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (2000 l per ettaro per le pomacee e le drupacee, 1000 l per ettaro per le viti e 600-800 l per ettaro per le altre colture). Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

VITE: contro Muffa grigia (Botrytis cinerea)

Intervenire alla dose di 80-150 g di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: fine fioritura, pre-chiusura grappolo, invaiatura, tre settimane prima del raccolto. In annate di normale pressione infettiva sono sufficienti due trattamenti, il primo in pre-chiusura grappolo ed il secondo all'invaiatura. Nel caso di varietà particolarmente suscettibili (Pinot, Tocai, Merlot, Riesling, Verdicchio, Schiava, Barbera, Moscato bianco), è opportuno intervenire anche in fine fioritura.

FRAGOLA: contro Muffa grigia

Intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: inizio fioritura, quando il 10-20% dei fiori sono aperti, alla sfioritura. È indispensabile un'ottima bagnatura della pianta.

POMODORO: contro Muffa grigia

Intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 l di acqua a partire dalla fioritura del primo palco florale ripetendoli ogni 15 giorni.

LATTUGA, INDIVIA: contro Muffa grigia e Sclerotinia

Applicare 1,5-2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto. Il trattamento può essere ripetuto ogni 10-12 giorni. Nel caso di colture non trapiantate intervenire quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Non effettuare più di due trattamenti per stagione.

TABACCO: contro Muffa grigia e Sclerotinia

Applicare 1,5 - 2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto.

GIRASOLE:

- Concia (contro Sclerotinia): 100-200 g per 100 Kg di seme
- Trattamenti alla parte aerea (contro Botrytis cinerea e Sclerotinia): intervenire alla dose di 100 g per 100 l di acqua effettuando uno-due trattamenti prima della fioritura.

FLOREALI in serra ed in campo (escluso il ciclamino):

- contro Botrytis intervenire alla dose di g. 40-80 per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, ripetendo eventualmente i trattamenti ogni 10-14 giorni
- contro Rhizoctonia e Sclerotinia: 4 g/mq di superficie in 5-10 l di acqua, dopo la crisi di trapianto.

PESCO, ALBICOCCO e SUSINO: contro Marciume bruno (Monilia)

- Marciume dei fiori: Effettuare due o tre trattamenti nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di g. 150-200 di prodotto ogni 100 l di acqua.
- Marciume dei frutti: Intervenire alla dose di 100-150 g per 100 l di acqua 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta.

MANDORLO: contro Marciume bruno (Monilia)

Marciume dei fiori: Intervenire nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di g. 150-200 di prodotto ogni 100 l di acqua.

PEPERONE e MELANZANA: contro Muffa grigia e Sclerotinia

Trattamenti alla parte aerea: 80-100 g per 100 l di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. (Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Su MELANZANA e PEPERONE non effettuare rispettivamente più di tre ed un intervento per stagione).

AGLIO: contro Botrytis spp. e Sclerotium cepivorum

- Trattamento ai bulbi: 30 g/100 Kg di materiale
- Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4ª foglia.

CIPOLLA: contro Botrytis spp.

- Trattamento al seme: 1 g per Kg di seme
- Trattamenti alla parte aerea: 100-150 g per 100 l di acqua avendo cura di utilizzare attrezzature a basso volume, a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4ª foglia.

GOLZA: contro Sclerotinia sclerotiorum

Intervenire all'inizio fioritura alla dose di 1-1,5 Kg/ha.

CETRILO: contro Botrytis cinerea e Sclerotinia sclerotiorum

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

FAGIOLINO: contro Botrytis cinerea e Sclerotinia sclerotiorum

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

ACTINIDIA: contro Muffa grigia e Sclerotinia

Trattamenti in pre-raccolta: Applicare 75-100 g per 100 l di acqua alla fine della fioritura-inizio caduta petali ed eventualmente prima della raccolta.

Difesa in post-raccolta: Trattamenti con doccia (drencher): utilizzare una sospensione allo 0,012% (12 g di prodotto ogni 100 l di acqua). Trattamenti mediante immersione:

immergere il materiale in una sospensione allo 0,012% (12 g di prodotto ogni 100 l di acqua).

NOCCIOLO: contro Marciume bruno: Applicare 75-100 g per 100 l di acqua in prossimità dell'allegagione.

PERO: contro Maculatura bruna

Intervenire alla dose di 100-150 g per 100 l di acqua a partire dalla fine della fioritura, ogni 7-10 giorni, in funzione del pericolo di infezione. Le gios possono essere dimezzate utilizzando il prodotto in miscela con formulati a base di Tiram o di Mancozeb, avendo cura di intensificare la cadenza dei trattamenti.

AVVERTENZA PER LA CONCIA DELLE SEMENTI

I semi trattati e residui dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Per un'ottimale preparazione della sospensione da irrorare, occorre seguire alcuni semplici accorgimenti.

Riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione, "immettere la giusta quantità di sacchetti idrosolubili (i quali non devono essere aperti) direttamente all'interno del serbatoio stesso; "completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione per circa 5-10 minuti il meccanismo di agitazione dell'irroratrice, onde facilitare la solubilizzazione della confezione e l'omogeneizzazione della miscela.

Utilizzando acque particolarmente fredde, il tempo necessario alla solubilizzazione ed all'omogeneizzazione della miscela può aumentare.

Concia. Il prodotto va utilizzato esclusivamente per la concia "slurry". Riempire un recipiente od il serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per la concia con 2/3 del quantitativo di acqua che si prevede di utilizzare; immettere la giusta quantità di sacchetti idrosolubili (i quali non devono essere aperti) direttamente all'interno del serbatoio stesso; completare il riempimento del serbatoio mantenendo in costante agitazione la sospensione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**AVVERTENZE D'USO**

Nel caso di miscela con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscelabile con i più comuni fitofarmaci utilizzati in agricoltura.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Sulle colture floreali, data la grande variabilità di specie e cultivars, è consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PESCO, PERO, FRAGOLA, CETRILO, POMODORO, PEPPERONE, ACTINIDIA, MELANZANA, LATTUGA, INDIVIA, FAGIOLINO, ALBICOCCO; 21 GIORNI PER VITE, SUSINO, GIRASOLE; 46 GIORNI PER COLZA; 60 GIORNI PER ACTINIDIA POST-RACCOLTA.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI****IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO****SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.**

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (LT)

Stabilimento di produzione (formulazione): A.D.I.C.A. Srl - Nara Monfaro (TR)

Stabilimenti di confezionamento:

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Torrenieri - Montalcino (SI)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n° 8325 del 15.06.1993

Contenuto: 1 Kg (4 s.r. da 250 g) - 1 Kg (2 s.r. da 500 g)

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili



1. Riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3

2. Introdurre il numero previsto da sacchetti idrosolubili chiusi (come da etichetta) nell'irroratrice. Mettere in funzione l'agitatore.

3. Attendere lo scioglimento dei sacchetti (5-10 minuti) ed...

4. ...aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

Foglio illustrativo per confezioni di formato ridotto

SIALEX® 50 WDG

GRANULI IDRODISPERSIBILI

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA, DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI E FLOREALI**CARATTERISTICHE**

Il SIALEX 50 WDG è un fungicida particolarmente attivo nei confronti della *Botrytis cinerea*, della Sclerotinia ed altri funghi che affliggono le colture eduli e floreali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (2000 l per ettaro per le pomacee e le drupacee, 1000 l per ettaro per la vite e 600-800 l per ettaro per le altre colture).

Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

VITE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Intervenire alla dose di 80-150 g di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: fine fioritura, pre-chiusura grappolo, invaiatura, tre settimane prima del raccolto. In annate di normale pressione infettiva sono sufficienti due trattamenti, il primo in pre-chiusura grappolo ed il secondo all'invaiatura. Nel caso di varietà particolarmente suscettibili (Pinot, Tocai, Merlot, Riesling, Verdicchio, Schiava, Barbera, Moscato bianco), è opportuno intervenire anche in fine fioritura.

FRAGOLA: contro Muffa grigia

Intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: inizio fioritura, quando il 10-20% dei fiori sono aperti, alla sfioritura. È indispensabile un'ottima bagnatura della pianta.

POMODORO: contro Muffa grigia

Intervenire alla dose di 80-100 g di prodotto per 100 l di acqua a partire dalla fioritura del primo palco florale ripetendoli ogni 15 giorni.

LATTUGA, INDIVIA: contro Muffa grigia e Sclerotinia

Applicare 1,5-2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto. Il trattamento può essere ripetuto ogni 10-12 giorni. Nel caso di colture non trapiantate intervenire quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Non effettuare più di due trattamenti per stagione.

TABACCO: contro Muffa grigia e Sclerotinia

Applicare 1,5 - 2 Kg/ha dopo il superamento della crisi di trapianto.

GIRASOLE:

- Concina (contro Sclerotinia): 100-200 g per 100 Kg di seme.

- Trattamenti alla parte aerea (contro *Botrytis cinerea* e Sclerotinia): intervenire alla dose di 100 g per 100 l di acqua effettuando uno-due trattamenti prima della fioritura.

FLOREALI in serra ed in campo (escluso il ciclamino):

- contro *Botrytis* intervenire alla dose di g. 40-80 per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, ripetendo eventualmente i trattamenti ogni 10-14 giorni.

- contro *Rhizoctonia* e Sclerotinia: 4 g/mq di superficie in 5-10 l di acqua, dopo la crisi di trapianto.

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO: contro Marciume bruno (*Monilia*)

- Marciume dei fiori: effettuare due o tre trattamenti nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di g. 150-200 di prodotto ogni 100 l di acqua.

- Marciume dei frutti: intervenire alla dose di 100-150 g per 100 l di acqua 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta.

MANDORLO: contro Marciume bruno (*Monilia*)

Marciume dei fiori: intervenire nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di g. 150-200 di prodotto ogni 100 l di acqua.

PEPERONE e MELANZANA: contro Muffa grigia e Sclerotinia

Trattamenti alla parte aerea: 80-100 g per 100 l di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. (Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Su MELANZANA e PEPPERONE non effettuare rispettivamente più di tre ed un intervento per stagione).

AGLIO: contro *Botrytis* spp. e *Sclerotium cepivorum*

- Trattamento ai bulbilli: 30 g/100 Kg di materiale.

- Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4ª foglia.

CIPOLLA: contro *Botrytis* spp.

- Trattamento al seme: 1 g per Kg di seme

- Trattamenti alla parte aerea: 100-150 g per 100 l di acqua avendo cura di utilizzare attrezzature a basso volume, a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla 4ª foglia.

COLZA: contro *Sclerotinia sclerotiorum*

Intervenire ad inizio fioritura alla dose di 1-1,5 Kg/ha.

CETRIOLO: contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia sclerotiorum*

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

FAGIOLINO: contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia sclerotiorum*

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 100-150 g per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

ACTINIDIA: contro Muffa grigia e Sclerotinia

Trattamenti in pre-raccolta: applicare 75-100 g per 100 l di acqua alla fine della fioritura-inizio caduta petali ed eventualmente prima della raccolta.

Difesa in post-raccolta: trattamenti con doccia (drencher): utilizzare una sospensione allo 0,012% (12 g di prodotto ogni 100 l di acqua). Trattamenti mediante immersione: immergere il materiale in una sospensione allo 0,012% (12 g di prodotto ogni 100 l di acqua).

NOCCILO: contro Marciume bruno

Applicare 75-100 g per 100 l di acqua in prossimità dell'allegagione.

PERO: contro Maculatura bruna: Intervenire alla dose di 100-150 g per 100 l di acqua a partire dalla fine della fioritura, ogni 7-10 giorni, in funzione del pericolo di infezione. Le dosi possono essere dimezzate utilizzando il prodotto in miscela con formulati a base di Tiram o di Mancozeb, avendo cura di intensificare la cadenza dei trattamenti.

AVVERTENZA PER LA CONCIA DELLE SEMENTI

I semi trattati e residui dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto è miscibile con i più comuni fitofarmaci utilizzati in agricoltura.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Sulle colture floreali, data la grande variabilità di specie e cultivars, è consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PESCO, PERO, FRAGOLA, CETRIOLO, POMODORO, PEPPERONE, ACTINIDIA, MELANZANA, LATTUGA, INDIVIA, FAGIOLINO, ALBICOCCO; 21 GIORNI PER VITE, SUSINO, GIRASOLE; 45 GIORNI PER COLZA; 60 GIORNI PER ACTINIDIA POST-RACCOLTA.

ATTENZIONE: Impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore non può essere riutilizzato

Smaltire secondo le norme vigenti

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
Parc d'Affaires de Crècy (Télébase) - 2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

SIALEX 50 WDG

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA, DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI E FLOREALI GRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Procimidone puro g. 50

Coformulanti q.b. a g. 100

Contenuto del sacchetto:

250 - 500 g

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano**SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zeson, 5 - Milano**

Registrazione Ministero della Sanità n° 8325 del 15.06.1993

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (LT)

Stabilimento di formulazione:

A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)

Stabilimenti di confezionamento:

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.

Torrenieri - Montalcino (SI)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.

Cotignola (RA)

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione**DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE****DA SCIOLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE**

Etichetta per confezioni di formato ridotto

SIALEX® 50 WDG
GRANULI IDRODISPERSIBILI
**FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA,
DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI E FLOREALI**

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono: Contenuto: 100 g

Procimidone puro g. 50

Partita n°

Coformulanti q.b. a g. 100

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

®Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano**SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano****Registrazione Ministero della Sanità****n° 8325 del 15.06.1993**

Stabilimenti di produzione:

A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)**SUMITOMO CHEMICAL CO.**

Ohita (Giappone)

CAFFARO S.p.A - Aprilia (LT)

Stabilimenti di confezionamento:

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.

Torrenieri - Montalcino (SI)

Società BAM di Benazzi e Uttini S.n.c.**San Patrizio di Conselice (RA)****STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.**

Cotignola (RA)

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.**NORME DI SICUREZZA:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA:**PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

SIALEX C

SOSPENSIONE CONCENTRATA

FUNGICIDA ORGANICO PER LE MALATTIE DEL POMODORO E DELLE PIANTE FLOREALI

SIALEX® C

COMPOSIZIONE

Clorotalonil puro g. 30 (=377 g/l)

Procimidone puro g. 15 (=189 g/l)

Coformulanti q.b. a g. 100

¹Marchio registrato Sumitomo Chemical Company, Osaka (Giappone)Registrazione del Ministero della Sanità
n. 6086 del 24.10.1984

Contenuto: 1 - 5 L Partita n°.....

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano**SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano**

Stabilimenti di produzione:

Caffaro S.p.A. - Aprilia (Latina)**CMFA - Z.I. Béziers Cedex (Francia)**Frase di rischio: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
Possibilità di effetti irreversibiliConsigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO****NORME PRECAUZIONALI**

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotalonil 30%, Procimidone 15%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CLOROTALONIL. Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.**PROCIMIDONE.** --

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è frutto dell'associazione di due principi attivi ad azione di copertura e dotati di alta resistenza al dilavamento: Clorotalonil e Procimidone. SIALEX C è attivo contro moltissime malattie (ad eccezione dell'oidio) ed è dotato di azione acaro-frenante.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione d'impiego in modo da mantenere

costante la quantità di prodotto per unità di superficie.

Pomodoro (in campo ed in serra) contro Peronospora (*Phytophthora spp.*), Alternariosi (*Alternaria solani*), Septoriosi (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Sclerotinia e Rhizoctonia spp.: ml 200-250/ha d'acqua.**Floreali** (ad eccezione del ciclamino) contro Peronospora (*Peronospora spp.*), Ruggine (*Puccinia spp.*), Alternaria (*Alternaria sp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium spp.*) e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), *Ascochyta spp.*, ecc.: ml 200-250/ha d'acqua.**AVVERTENZE**

Su pomodoro non superare i tre trattamenti annui in pieno campo e cinque in serra.

Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorse rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI****COMPATIBILITÀ**

Il prodotto è compatibile con i più diffusi fitofarmaci utilizzati in agricoltura ad eccezione degli oli bianchi e dei concimi fogliari a base di boro.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**FITOTOSSICITÀ**

Il prodotto, alle dosi e modalità di etichetta non è fitotossico. Tuttavia sulle ornamentali è consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari su varietà di nuova introduzione.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smettere secondo le norme vigenti

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Sciogliere a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

SIALEX® FIORI

(POLVERE BAGNABILE)

FUNGICIDA ORGANICO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA CONTRO LA MUFFA GRIGIA, LA SCLEROTINIA E LA RHIZOCTONIA DELLE COLTURE FLORICOLE PER IMPIEGO IN PIENO CAMPO ED IN SERRA

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Procymidone puro g. 50

Coformulanti q.b. a g. 100

[®]Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il SIALEX FIORI è un fungicida ad azione preventiva e curativa. Per la sua efficacia viene particolarmente consigliato sulle colture floricole e sulle piante ornamentali contro le seguenti malattie:

- Muffa grigia del Garofano, Rosa, Gerbera, Ciclamino, Tulipano
- Rhizoctonia del garofano ed altre ornamentali
- Sclerotinia e Muffa grigia dei bulbi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- Contro la Muffa grigia del Garofano, Rosa, Gerbera e Tulipano si impiega alla dose di 40-80 g/hl. Per il ciclamino si consiglia di impiegare il SIALEX FIORI ad una dose non superiore a 50 g/hl. I trattamenti andranno ripetuti ogni 8-10 giorni durante il periodo di attacco della malattia, avendo cura di irrorare uniformemente ed abbondantemente le piante.
- Contro la Rhizoctonia del Garofano ed altre ornamentali, si impiegano 2 g di SIALEX FIORI disciolti in 5-10 litri di acqua per metro quadrato di superficie. Intervenire 10 giorni circa dopo la messa a dimora, superata la crisi di trapianto. Se necessario, ripetere il trattamento dopo circa 30 giorni.
- Contro la Sclerotinia e Muffa grigia dei bulbi, il prodotto si impiega alla dose di 0,5 Kg per ogni 100 Kg di bulbi, avendo cura di inumidirli leggermente al fine di aumentare l'adesività del prodotto. Se necessario si eseguono interventi successivi, a pieno campo, impiegando il prodotto alla dose di 100 g/hl, bagnando abbondantemente il piede delle piante ed il terreno.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi; si consiglia comunque di fare la miscelazione poco prima dell'impiego, diluendo in poca acqua ed aggiungendo la restante a volume voluto. Comunque, dato che le formulazioni dei vari prodotti possono variare, si consiglia di effettuare prima dell'intervento, un saggio preliminare, soprattutto con prodotti di recente commercializzazione.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Prima di eseguire trattamenti su varietà di recente commercializzazione, o poco conosciute, è bene eseguire saggi preliminari. Particolare attenzione dovrà essere posta per le colture in serra.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore non può essere riutilizzato

Smaltire secondo le norme vigenti

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

Caffaro S.p.A. - Aprilia (Latina)

CMPA - Z.I. Béziers Cedex (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 4664 del 05/02/1982

Contenuto: 0,5 - 1 Kg

Partita n.

SIALEX® PASTA

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA, DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI E FLOREALI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Proclimidone puro g. 50 (600 g/l)

Coformulanti q.b. a g. 100

* Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il SIALEX PASTA è un fungicida particolarmente attivo nei confronti della *Botrytis cinerea*, della *Sclerotinia* ed altri funghi che affliggono le colture eduli e floreali.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (2000 l per ettaro per le pomacee e le drupacee, 1000 l per ettaro per la vite e 600-1000 l per ettaro per le colture erbacee).

Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

POMODORO - contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Intervenire alla dose di 70-85 ml di prodotto per 100 l di acqua a partire dalla fioritura del primo palco florale ripetendoli ogni 15 giorni.

PEPERONE e MELANZANA - contro Muffa grigia e Sclerotinia

Trattamenti alla parte aerea: 70-80 ml di prodotto per 100 l di acqua ogni 10-14 giorni a partire dall'allegagione dei primi frutti.

FAGIOLINO - contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia sclerotiorum*

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 80-125 ml per 100 l di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

CETRIOLO - contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia sclerotiorum*

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 80-125 ml per 100 l di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

AGLIO - contro *Botrytis spp.* e *Sclerotium cepivorum*

Trattamento ai bulbilli: 375-420 ml/100 Kg di materiale.

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 80-170 ml per 100 litri di acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi.

CIPOLLA - contro *Botrytis spp.*

Trattamento al seme: 80 ml per 100 Kg di seme.

Trattamenti alla parte aerea: 80-125 ml per 100 l di acqua, avendo cura di utilizzare attrezzature a basso volume, ogni 10-14 giorni a partire dalla prima comparsa dei sintomi.

LATTUGA, INDIVIA e TABACCO - contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*)

Applicare 1,25-2,5 l/ha dopo il superamento della crisi di trapianto. Il trattamento può essere ripetuto ogni 10-12 giorni. Non effettuare più di due trattamenti per stagione. Nel caso di colture non trapiantate intervenire quando la stagione decorre particolarmente piovosa.

FRAGOLA - contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Intervenire alla dose di 70-85 ml di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: inizio fioritura, quando il 10-20% dei fiori sono aperti, alla sfioritura.

È indispensabile assicurare la massima uniformità del trattamento.

VITE - contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Intervenire alla dose di 70-125 ml di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione: fine fioritura, pre-chiusura grappolo, invaiatura, tre settimane prima del raccolto.

In annate di normale pressione infettiva sono sufficienti due trattamenti, il primo in pre-chiusura grappolo ed il secondo all'invaiatura. Nel caso di varietà particolarmente suscettibili (Pinot, Tocai, Merlot, Riesling, Verdicchio, Schiava, Barbera, Moscato bianco), è opportuno intervenire anche in fine fioritura.

PESCO, ALBICOCCO e SUSINO - contro marciume bruno (Monilia)

- Marciume dei fiori: effettuare due o tre trattamenti nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni floreali e la piena fioritura, alla dose di ml 125-160 di prodotto ogni 100 l di acqua.

- Marciume dei frutti: intervenire alla dose di 80-125 ml per 100 l di acqua 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta.

NOCCIOLO - contro Marciume bruno

Applicare 60-80 ml per 100 l di acqua in prossimità dell'allegagione. Ripetere eventualmente l'intervento durante l'accrescimento dei frutti.

PERO - contro Maculatura bruna

Intervenire alla dose di 80-125 ml per 100 l di acqua a partire dalla fine della fioritura, ogni 7-10 giorni, in funzione del pericolo di infezione. Le dosi possono essere dimezzate utilizzando il prodotto in miscela con formulati a base di Tiram o di Mancozeb, avendo cura di intensificare la cadenza dei trattamenti.

ACTINIDIA - contro Muffa grigia e Sclerotinia

Applicare 60-80 ml per 100 l di acqua alla fine della fioritura-inizio caduta petali ed eventualmente prima della raccolta.

GIRASOLE

- Concia (contro *Sclerotinia spp.*): 80-160 ml per 100 Kg di seme.

- Trattamenti alla parte aerea (contro *Botrytis cinerea* e *Sclerotinia*): intervenire alla dose di 80 ml per 100 l di acqua effettuando uno-due trattamenti prima della fioritura.

COLZA - contro *Sclerotinia sclerotiorum*:

Intervenire ad inizio fioritura alla dose di 800-1250 ml/ha.

FLOREALI in serra ed in campo (escluso il ciclamino):

- Contro *Botrytis cinerea* intervenire alla dose di ml 35-70 per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, ripetendo eventualmente i trattamenti ogni 10-14 giorni

- Contro *Rhizoctonia* e *Sclerotinia*: 3-4 ml/mq di superficie in 5-10 l di acqua, dopo la crisi di trapianto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto, alle dosi e modalità di etichetta, non è fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PESCO, PERO, FRAGOLA, CETRIOLO, POMODORO, PEPERONE, ACTINIDIA, MELANZANA, LATTUGA, INDIVIA, FAGIOLINO, ALBICOCCO, 21 GIORNI PER VITE, SUSINO, GIRASOLE, 45 GIORNI PER COLZA

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE

DISPERSO NELL'AMBIENTE

Sciogliere a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

Smaltire secondo le norme vigenti

Il contenitore non può essere riutilizzato

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lion (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (Latina).

CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 5761 del 23.02.1984

Contenuto: 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 L

Partita n°.....

SIALEX® T **POLVERE BAGNABILE** **FUNGICIDA ORGANICO AD AZIONE CURATIVA E PREVENTIVA**

SIALEX® T**COMPOSIZIONE**

Procimidone puro g 12,3
 Tiram puro g 49
 Coformulanti q.b. a g 100

*Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

Contenuto: 1 - 5 Kg

Partita n°.....

Registrazione Ministero della Sanità
 n° 6089 del 12.09.1984

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (Latina)

CMFA - Z.I. Béziers Cedex (Francia)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Procimidone 12,3%, Tiram 4,9%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

PROCIMIDONE. -

TIRAM. Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatica, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il SIALEX T è un fungicida ad azione curativa e preventiva. Per la sua efficacia viene particolarmente consigliato contro le malattie delle seguenti colture: VITE - FRAGOLA - POMODORO - ROSA - GERBERA - GERANIO - CRISANTEMO: Muffa grigia. PESCO: Marciume bruno. PERO: Maculatura bruna. POMODORO - CETRIOLO - PEPERONE: Sclerotinia. POMODORO - CETRIOLO - PEPERONE - GAROFANO - BEGONIA - CRISANTEMO - DALIA - ROSA - GERBERA - FRESIA - LILIUUM: Rhizoctonia. Il SIALEX T è attivo anche contro le forme resistenti ai comuni anticrittogamici.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE contro la muffa grigia: Trattamenti liquidi: g 200-250 di SIALEX T ogni 100 litri di acqua. Compatibilmente alle condizioni climatiche locali e alle caratteristiche varietali, effettuare 3-4 trattamenti nei seguenti periodi: 1) a fine fioritura; 2) quando gli acini presentano il diametro di 3 mm. (alla chiusura del grappolo); 3) 7-8 settimane prima della raccolta (invaiaura); 4) 3-4 settimane prima della raccolta. Aver cura di distribuire un'adeguata quantità di polliglia, in modo da consentire l'uniforme distribuzione del

fungicida, ed adottare la dose più elevata sulle varietà più sensibili specie quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Trattamento a secco: impiegare il SIALEX T in miscela estemporanea con zolfo polverulento alle epoche indicate per i trattamenti liquidi, come segue: a) per trattamenti generalizzati su tutta la vegetazione: miscelare 0,700 Kg di SIALEX T ogni 10 Kg di zolfo; b) per trattamenti localizzati nella zona dei grappoli: miscelare 1,200 Kg di SIALEX T ogni 10 Kg di zolfo. In entrambi i casi applicare le polveri quanto basta per ottenere una buona copertura.

FRAGOLA contro la muffa grigia: 200-250 g di SIALEX T per 100 litri di acqua. Effettuare 3 trattamenti, rispettivamente: 1) all'apertura dei petali; 2) quando il 10-20% dei fiori sono schiusi ed il 3 alla sfioritura. Aver cura di bagnare abbondantemente le piante ed il terreno circostante.

POMODORO contro la Muffa grigia: 200-250 g di SIALEX T per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti dalla fine della fioritura del primo palco florale e ripeterli ogni 15 giorni circa, sino a 14 giorni prima della raccolta.

ROSA contro la Muffa grigia: sulle varietà suscettibili ed in condizioni ambientali favorevoli: 200-250 g di SIALEX T per 100 litri di acqua, impiegando 400-500 litri ogni 1.000 mq. Effettuare almeno 3 trattamenti dalla fase di germogliamento avanzato a quella dell'inizio della fioritura.

GERBERA - GERANIO - CRISANTEMO contro la Muffa grigia: 200-250 g di SIALEX T per 100 litri di acqua. I trattamenti andranno ripetuti ogni 8-10 giorni, durante il periodo di attacco della malattia, avendo cura di irrorare uniformemente ed abbondantemente le piante.

PESCO contro il Marciume bruno (Monilia): a) Monilia dei fiori e dei rami: 200-250 g di SIALEX T per 100 litri di acqua. Effettuare un primo trattamento alla comparsa dei bottoni floreali, un secondo quando il 25% circa dei fiori sono schiusi ed un terzo in piena fioritura. b) Monilia dei frutti: 200-250 g di SIALEX T per 100 litri di acqua. Trattamenti: 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta.

PERO contro la Maculatura bruna: 200-250 g/Hl di prodotto, con trattamenti cadenzati di 7-12 gg per tutto il periodo di vegetazione della coltura.

POMODORO - CETRIOLO - PEPERONE contro il Marciume del colletto (Sclerotinia): 8-10 g di SIALEX T dispersi in 5-10 litri di acqua, per metro quadrato di superficie. Trattare prima della messa a dimora della coltura oppure con coltura in atto, alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

POMODORO - CETRIOLO - PEPERONE - GAROFANO - BEGONIA - CRISANTEMO - DALIA - ROSA - GERBERA - FRESIA - LILIUUM contro la Rhizoctonia: 8-10 g di SIALEX T dispersi in 5-10 litri di acqua/metro quadrato di superficie. Intervenire 10 giorni circa dopo la messa a dimora superata la crisi di trapianto ed alla comparsa dei primi sintomi della malattia; se necessario, ripetere il trattamento dopo circa 30 giorni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi; si consiglia comunque di fare la miscelazione poco prima dell'impiego, diluendo in poca acqua ed aggiungendo poi la restante a volume voluto. Il formulato non è miscibile con i prodotti a base di rame.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Prima di eseguire trattamenti su varietà di recente commercializzazione, o poco conosciute, è bene eseguire saggi preliminari. Può risultare fitotossico per le cultivar di pesco: Red Haven, Cardinal, Dixired e per le seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Armella, Butira Clairgeau, Butira precoce Moretti, Conference, Contessa di Parigi, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpì, Zeccherma.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, il bestiame e gli animali domestici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER LA VITE; 14 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SIALEX® T**POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI
FUNGICIDA ORGANICO AD AZIONE CURATIVA E PREVENTIVA****SIALEX® T****COMPOSIZIONE**

Procimidone puro g 12,3
Tiram puro g 49
Coformulanti q.b. a g 100

*Marchio registrato della Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

Partita n°.....

**Registrazione Ministero della Sanità
n° 6089 del 12.09.1984**

Contenuto: **1 Kg (2 s.i. da 500 g)**

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A. - Aprilia (Latina)

CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Procimidone 12,3%, Tiram 49%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

PROCIMIDONE. -

TIRAM. Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatica, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da puerile diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il SIALEX T è un fungicida ad azione curativa e preventiva. Per la sua efficacia viene particolarmente consigliato contro le malattie delle seguenti colture: VITE - FRAGOLA - POMODORO - ROSA - GERBERA - GERANIO - CRISANTEMO: Muffa grigia. PESCO: Marciume bruno. PERO: Maculatura bruna. POMODORO - CETRIOLO - PEPPERONE: Sclerotinia. POMODORO - CETRIOLO - PEPPERONE - GAROFANO - BEGONIA - CRISANTEMO - DALIA - ROSA - GERBERA - FRESIA - LILIU: Rhizoctonia. Il SIALEX T è attivo anche contro le forme resistenti ai comuni anticrittogamici.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto è confezionato in sacchetti idrosolubili.

VITE contro la muffa grigia: Trattamenti liquidi: g 200-250 di SIALEX T ogni 100 litri di acqua. Compatibilmente alle condizioni climatiche locali e alle caratteristiche varietali, effettuare 3-4 trattamenti nei seguenti periodi: 1) a fine fioritura; 2) quando gli acini presentano il diametro di 3 mm. (alla chiusura del grappolo); 3) 7-8 settimane prima della raccolta (invalitura); 4) 3-4 settimane prima della raccolta. Aver cura di distribuire un'adeguata quantità di poltiglia, in modo da consentire l'uniforme distribuzione del fungicida, ed adottare la dose più elevata sulle varietà più sensibili specie quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Trattamento a secco: impiegare il SIALEX T in miscela estemporanea con zolfo polverulento alle epoche indicate per i trattamenti liquidi, come segue: a) per trattamenti generalizzati su tutta la vegetazione: miscelare 0,700 Kg di SIALEX T ogni 10 Kg di zolfo; b) per trattamenti localizzati nella zona dei grappoli: miscelare 1,200 Kg di SIALEX T ogni 10 Kg di zolfo. In entrambi i casi applicare le polveri quanto basta per ottenere una buona copertura.



FRAGOLA contro la muffa grigia: 200-250 g di SIALEX T per 100 litri di acqua. Effettuare 3 trattamenti, rispettivamente: 1) all'apertura dei petali; 2) quando il 10-20% dei fiori sono schiusi ed il 3 alla sfioritura. Aver cura di bagnare abbondantemente le piante ed il terreno circostante.

POMODORO contro la Muffa grigia: 200-250 g di SIALEX T per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti dalla fine della fioritura del primo palco florale e ripeterli ogni 15 giorni circa, sino a 14 giorni prima della raccolta.

ROSA contro la Muffa grigia: sulle varietà suscettibili ed in condizioni ambientali favorevoli: 200-250 g di SIALEX T per 100 litri di acqua, impiegando 400-500 litri ogni 1.000 mq. Effettuare almeno 3 trattamenti dalla fase di germogliamento avanzato a quella dell'inizio della fioritura.

GERBERA - GERANIO - CRISANTEMO contro la Muffa grigia: 200-250 g di SIALEX T per 100 litri di acqua. I trattamenti andranno ripetuti ogni 8-10 giorni, durante il periodo di attacco della malattia, avendo cura di irrorare uniformemente ed abbondantemente le piante.

PESCO contro il Marciume bruno (Monilia): a) Monilia dei fiori e dei rami: 200-250 g di SIALEX T per 100 litri di acqua. Effettuare un primo trattamento alla comparsa dei bottoni fiorali, un secondo quando il 25% circa dei fiori sono schiusi ed un terzo in piena fioritura. b) Monilia dei frutti: 200-250 g di SIALEX T per 100 litri di acqua. Trattamenti: 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta.

PERO contro la Maculatura bruna: 200-250 g/HI di prodotto, con trattamenti cadenzati di 7-12 gg per tutto il periodo di vegetazione della coltura.

POMODORO - CETRIOLO - PEPPERONE contro il Marciume del colletto (Sclerotinia): 8-10 g di SIALEX T dispersi in 5-10 litri di acqua, per metro quadrato di superficie. Trattare prima della messa a dimora della coltura oppure con coltura in atto, alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

POMODORO - CETRIOLO - PEPPERONE - GAROFANO - BEGONIA - CRISANTEMO - DALIA - ROSA - GERBERA - FRESIA - LILIU contro la Rhizoctonia: 8-10 g di SIALEX T dispersi in 5-10 litri di acqua/metro quadrato di superficie. Intervenire 10 giorni circa dopo la messa a dimora superata la crisi di trapianto ed alla comparsa dei primi sintomi della malattia; se necessario, ripetere il trattamento dopo circa 30 giorni.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Vedere pittogrammi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi; si consiglia comunque di fare la miscelazione poco prima dell'impiego, diluendo in poca acqua ed aggiungendo poi la restante a volume voluto. Il formulato non è miscibile con i prodotti a base di rame.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Prima di eseguire trattamenti su varietà di recente commercializzazione, o poco conosciute, è bene eseguire saggi preliminari. Può risultare fitotossico per le colture di pesco: Red Haven, Cardinal, Dixred e per le seguenti colture di pero: Abate Fetel, Armella, Butira Claireau, Butira precoce Moretini, Conference, Contessa di Parigi, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarp, Zeccheranna.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, il bestiame e gli animali domestici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER LA VITE; 14 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE


ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO


Smaltire secondo le norme vigenti

MODO DI UTILIZZO


Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili



1) Riempire l'atomizzatore con il 20-25% d'acqua.




2) Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi nell'atomizzatore, previsti dalle istruzioni in etichetta.



3) Attendere 3-4 minuti affinché i sacchetti si sciolgano.



4) Mettere in funzione l'agitatore.



5) Aggiungere la restante parte di acqua (come indicato in etichetta).

Etichetta per sacchetto idrosolubile

SIALEX T	
POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI	
FUNGICIDA ORGANICO AD AZIONE CURATIVA E PREVENTIVA	
COMPOSIZIONE	
Procimidone puro g.....	12,3
Tiram puro g.....	49
Coformulanti q.b. a g.....	100
Contenuto del sacchetto: 500 g	
Registrazione Ministero della Sanità n° 6089 del 12.09.1984	
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.	
Parc d'Affaires de Crécy (Télébase) 2, Rue Claude Chappe 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)	
distribuito da:	
CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano	
SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano	
Stabilimenti di produzione: Caffaro S.p.A. - Aprilia (LATINA) CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)	
AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione	
DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE	
DA SCIogliere IN ACQUA SENZA	
ROMPERE L'INVOLUCRO	

SUMICO FL**(SOSPENSIONE CONCENTRATA)****FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI ALCUNE MALATTIE DELLA VITE E DELLE COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI****SUMICO FL****COMPOSIZIONE**

Dietofencarb puro g 22,5 (=250 g/l)

Carbendazim puro g 22,5 (=250 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

Registrazione Ministero della Sanità
n° 8251 del 04.05.1993

Contenuto: 0, 100 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 L

Partita n°.....

**SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.**

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A - Aprilia (Latina)

CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**NORME PRECAUZIONALI**

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dietofencarb puro 22,5%, Carbendazim puro 22,5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

DIETOFENCARB-**CARBENDAZIM:** non si conoscono casi di intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il SUMICO FL è una miscela di due principi attivi sistemici ad azione preventiva, curativa ed eradicante per il controllo della muffa grigia della vite, delle piante floreali ed ornamentali.

Il SUMICO FL si rivela estremamente efficace nei confronti di ceppi di *Botrytis cinerea* tolleranti i prodotti benzimidazolici e dicarbossimidici.**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (1000 l per ettaro per la vite e 600-1000 l per ettaro per le colture ornamentali). Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

VITE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*).

Intervenire alla dose di 200 ml di prodotto per 100 l di acqua (pari a 2 l/ha) nelle epoche di maggior rischio di infezione, in alternanza con formulati a base di Procimidone.

FLOREALI ED ORNAMENTALI in campo - contro *Botrytis cinerea*.

Intervenire alla dose di 100 ml per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, in alternanza con formulati a base di Procimidone, adottando un intervallo tra i trattamenti di 7-14 giorni in funzione della pressione infettiva.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Il formulato si è rivelato non compatibile con prodotti cuprici.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU VITE****ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

Etichetta formato ridotto

SUMICO FL (SOSPENSIONE CONCENTRATA) FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI ALCUNE MALATTIE DELLA VITE E DELLE COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI

SUMICO FL**COMPOSIZIONE**

Dietofencarb puro g 22,5 (=250 g/l)

Carbendazim puro g 22,5 (=250 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

Registrazione Ministero della Sanità
n° 8251 del 04.05.1993

Contenuto: 100 ml

Partita

n°.....

FRASI DI RISCHIO: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.**

Parc d'Affairs de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano**SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano**

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A - Aprilia (Latina)**CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)****NORME PRECAUZIONALI**

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dietofencarb puro 22,5%, Carbendazim puro 22,5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

DIETOFENCARB-**CARBENDAZIM:** non si conoscono casi di intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

AVVERTENZA:**PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Foglio illustrativo

SUMICO FL**(SOSPENSIONE CONCENTRATA)****FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI ALCUNE MALATTIE DELLA VITE E DELLE COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI****CARATTERISTICHE**

Il SUMICO FL è una miscela di due principi attivi sistemici ad azione preventiva, curativa ed eradicante per il controllo della muffa grigia della vite, delle piante floreali ed ornamentali.

Il SUMICO FL si rivela estremamente efficace nei confronti di ceppi di *Botrytis cinerea* tolleranti i prodotti benzimidazolici e dicarbossimidici.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (1000 l per ettaro per la vite e 600-1000 l per ettaro per le colture ornamentali). Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

VITE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*).

Intervenire alla dose di 200 ml di prodotto per 100 l di acqua (pari a 2 l/ha) nelle epoche di maggior rischio di infezione, in alternanza con formulati a base di Procimidone.

FLOREALI ED ORNAMENTALI in campo - contro *Botrytis cinerea*.

Intervenire alla dose di 100 ml per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, in alternanza con formulati a base di Procimidone, adottando un intervallo tra i trattamenti di 7-14 giorni in funzione della pressione infettiva.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**COMPATIBILITÀ**

Il formulato si è rivelato non compatibile con prodotti cuprici.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU VITE

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuo nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.**Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)****2, Rue Claude Chappe****69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)**

SUMICO PB

(POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)
FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI ALCUNE MALATTIE DELLA VITE
E DELLE COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI

SUMICO PB

COMPOSIZIONE

Dietofencarb puro g 25
Carbendazim puro g 25
Coformulanti q.b. a g 100

Registrazione Ministero della Sanità
n° 8250 del 04.05.1993

Contenuto: 0,500 Kg (5 s.i. da 100 g)
1 Kg (10 s.i. da 100 g)

Partita n°.....

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A - Aprilia (Latina)

CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

FRASI DI RISCHIO: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dietofencarb puro 25%, Carbendazim puro 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

DIETOFENCARB: --

CARBENDAZIM: Non si conoscono casi di intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il SUMICO PB è una miscela di due principi attivi sistemici ad azione preventiva, curativa ed eradicante per il controllo della muffa grigia della vite, delle piante floreali ed ornamentali. Il SUMICO PB si rivela estremamente efficace nei confronti di ceppi di *Botrytis cinerea* tolleranti i prodotti benzimidazolici e dicarbossimidici.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (1000 l per ettaro per la vite e 600-1000 l per ettaro per le colture ornamentali). Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.



VITE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*).

Intervenire alla dose di 200 g di prodotto per 100 l di acqua (pari a 2 Kg/ha) nelle epoche di maggior rischio di infezione, in alternanza con formulati a base di Procimidone.

Trattamenti polverulenti:

Somministrare 2 Kg/ha di SUMICO PB mescolato in modo accurato alla quantità di zolfo polverulento che si intende somministrare.

FLOREALI ED ORNAMENTALI in campo - contro *Botrytis cinerea*.

Intervenire alla dose di 100 g per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, in alternanza con formulati a base di Procimidone, adottando un intervallo tra i trattamenti di 7-14 giorni in funzione della pressione infettiva.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

COMPATIBILITÀ

Il formulato si è rivelato non compatibile con prodotti cuprici.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU VITE

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.


Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO


Smaltire secondo le norme vigenti

MODO DI UTILIZZO


Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili



1) Riempire l'atomizzatore con il 20-25% d'acqua.




2) Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi nell'atomizzatore, previsti dalle istruzioni in etichetta.



3) Attendere 3-4 minuti affinché i sacchetti si sciolgano.



4) Mettere in funzione l'agitatore.



5) Aggiungere la restante parte di acqua (come indicato in etichetta).

SUMICO PB

(POLVERE BAGNABILE)

FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI ALCUNE MALATTIE DELLA VITE
E DELLE COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI

SUMICO PB

COMPOSIZIONE

Dietofencarb puro g 25
Carbendazim puro g 25
Coformulanti q.b. a g 100

Registrazione Ministero della Sanità
n° 8250 del 04.05.1993

Contenuto: 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 Kg

Partita n°.....

Stabilimenti di produzione:

CAFFARO S.p.A - Aprilia (Latina)

CMFA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

Parc d'Affaires de Crécy (Télébase)

2, Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

distribuito da:

CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano

SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano

FRASI DI RISCHIO: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO



DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (1000 l per ettaro per la vite e 600-1000 l per ettaro per le colture ornamentali). Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

VITE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*).

Intervenire alla dose di 200 g di prodotto per 100 l di acqua (pari a 2 Kg/ha) nelle epoche di maggior rischio di infezione, in alternanza con formulati a base di Procimidone.

Trattamenti polverulenti.

Somministrare 2 Kg/ha di SUMICO PB mescolato in modo accurato alla quantità di zolfo polverulento che si intende somministrare.

FLOREALI ED ORNAMENTALI in campo - contro *Botrytis cinerea*.

Intervenire alla dose di 100 g per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, in alternanza con formulati a base di Procimidone, adottando un intervallo tra i trattamenti di 7-14 giorni in funzione della pressione infettiva.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il formulato si è rivelato non compatibile con prodotti cuprici.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU VITE

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dietofencarb puro 25%, Carbendazim puro 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

DIETOFENCARB: --

CARBENDAZIM: Non si conoscono casi di intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il SUMICO PB è una miscela di due principi attivi sistemici ad azione preventiva, curativa ed eradicante per il controllo della muffa grigia della vite, delle piante floreali ed ornamentali.

Il SUMICO PB si rivela estremamente efficace nei confronti di ceppi di *Botrytis cinerea* tolleranti i prodotti benzimidazolici e dicarbosimidici.

Etichetta per sacchetto idrosolubile

SUMICO PB POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI ALCUNE MALATTIE DELLA VITE E DELLE COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI		
COMPOSIZIONE		
Dietofencarb puro g.....		25
Carbendazim puro g.....		25
Coformulanti q.b. a g.....		100
Contenuto del sacchetto: 100 g		
Registrazione Ministero della Sanità n° 8250 del 04.05.1993		
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A. Parc d'Affaires de Crécy (Télébase) 2, Rue Claude Chappe 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia) distribuito da: CAFFARO SpA - Via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano SCAE Valent BioSciences Italy Srl - Via Zezon, 5 - Milano		
Stabilimenti di produzione: Caffaro S.p.A. - Aprilia (LATINA) CMPA - Z.I. Béziers Cédex (Francia)		
AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione		
DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO		

IMPRESA

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARBOTECT® 20 S

Anticrittogamico liquido a base di tiabendazolo per la lotta contro l'antracnosi del platano, destinato all'impiego per iniezione al tronco da parte di personale specializzato.

ARBOTECT® 20 S

Composizione

100 g di prodotto contengono:
tiabendazolo puro 19,7 g (= 220 g/litro)
q.b. a 100 g di coformulanti

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.,

Origgio (Varese) SS n. 233 km 20.5

tel. 02/96541

Officina di produzione:

Syngenta Manufacturing B.V., Roosendaal (Olanda)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9401 del 20.10.97

Il contenitore non può essere riutilizzato

® marchio registrato

Partita n.

1 litro

altre confezioni : 5 litri

Officina di produzione:

ELF ATOCHEM AGRI ESPAÑA, S.A., PATERNA-Valencia (Spagna)
Stabilimento di formulazione: Syngenta Manufacturing B.V., Roosendaal (Olanda)/Stabilimento di confezionamento: ELF ATOCHEM AGRI ESPAÑA, S.A., PATERNA-Valencia (Spagna)

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

ARBOTECT 20 S è una specifica formulazione liquida del fungicida tiabendazolo per l'impiego contro Gnomonia platani agente dell'antracnosi del platano.

ARBOTECT 20 S può essere impiegato efficacemente in aiuto ad una azione di controllo dell'antracnosi del platano.

ARBOTECT 20 S deve essere applicato da personale specializzato per iniezione sotto pressione, nel tronco, impiegando appropriate tecniche.

Il movimento del prodotto entro la pianta è dovuto al trasporto della linfa attraverso i vasi.

Dosi, Epoca e Modalità d'impiego

Per ogni 13 cm di diametro del tronco iniettare 12 ml di ARBOTECT 20 S diluito con 0.3-0.6 litri di acqua (una parte di ARBOTECT 20 S e 25/50 parti di acqua).

Per i migliori risultati le iniezioni dovrebbero essere fatte subito prima o dopo il germogliamento, ogni anno e per due anni consecutivi. Può essere necessario ripetere i trattamenti qualora ricomparsa la malattia.

Localizzare i punti di iniezione ad intervalli regolari di 15 - 25 cm intorno al tronco con un diametro massimo dei fori di 13 mm.

I punti di iniezione devono essere localizzati sul tronco all'altezza di 100-120 cm dal terreno.

Gli alberi di diametro inferiore ai 13 cm ad altezza d'uomo non dovrebbero essere trattati. L'iniezione deve essere effettuata a pressione tra 3 e 12 atmosfere.

I fori derivanti dall'iniezione vanno immediatamente richiusi con un mastice atossico.

Non diluire ARBOTECT 20 S con acqua altamente alcalina per il pericolo della formazione di precipitati.

ARBOTECT 20 S va impiegato da personale specializzato mediante adeguato addestramento alle tecniche di iniezione sotto pressione di sostanze pericolose ed all'identificazione della antracnosi.

Compatibilità

ARBOTECT 20 S va impiegato da solo, previa diluizione in acqua alle concentrazioni raccomandate.

Fitotossicità

ARBOTECT 20 S se impiegato correttamente, alle dosi e secondo le modalità raccomandate, non è fitotossico.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente da parte di personale specializzato nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

BION® 50 WG

Attivatore delle autodifese della pianta, in granuli idrosospensibili, per il controllo della peronospora del tabacco e delle batteriosi del nocciolo e del pomodoro.

Composizione

acibenzolar-S-methyl
coformulanti q.b. a 100 g
50 g

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.,

Origgio (Varese)

Strada Statale 233 Km 20.5

Tel. 02-96541

Officina di produzione: SYNGENTA CROP PROTECTION

A.G., Basilea (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n.

Kg

Taglie:

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Usare guanti adatti.

Consultare un Centro Antiveneni.

Bion® è un attivatore delle autodifese della pianta a base di acibenzolar-S-methyl.

Acibenzolar-S-methyl non presenta un'attività diretta sul patogeno ma attiva i meccanismi naturali di difesa della pianta aumentando la resistenza nei confronti di numerose malattie.

Su tabacco incrementa la resistenza della pianta a *Peronospora tabacina*, su nocciolo e pomodoro incrementa la resistenza della pianta nei confronti delle batteriosi. Il prodotto è dotato di attività sistemica, viene assorbito velocemente dalla

vegetazione e traslocato in senso acropeto e basipeto all'interno della pianta. Per il suo particolare meccanismo d'azione, acibenzolar-S-methyl deve essere distribuito prima dell'instaurarsi dell'infezione.

altre officine:

Stabilimento di formulazione: SYNGENTA CROP

PROTECTION AG, Basilea (Svizzera)/

Stabilimento di confezionamento: D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. --

unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista

Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Pian d'Asso,

Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Stabilimento di formulazione: SYNGENTA CROP

PROTECTION AG, Basilea (Svizzera)/

Stabilimento di confezionamento: S.T.I. SOLFOTECNICA

ITALIANA S.p.A., Via Pian d'Asso, Torrenieri

(fraz. di Montalcino - SI)

Stabilimento di formulazione: S.T.I. SOLFOTECNICA

ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2,

Cotignola (RA)/Stabilimento di confezionamento: S.T.I.

SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Pian

d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Dosi e modalità d'impiego

Cultura	Patogeno	Dose g/l	Dose g/ha	Epoca d'impiego
Tabacco	Peronospora (<i>Peronospora tabacina</i>)	2,5-5	25-50	Effettuare trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni iniziando dopo la crisi di trapianto o quando si instaurano le condizioni favorevoli per l'infezione per un massimo di 4 trattamenti.
Nocciolo	Batteriosi (<i>Pseudomonas avellanae</i>)	5	50	Eseguire max 4 interventi a partire dal germogliamento e durante lo sviluppo vegetativo ad intervalli di 3-4 settimane.
Pomodoro	Batteriosi (<i>Pseudomonas tomato</i> , <i>Xanthomonas vesicatoria</i>)	2,5-5	25-50	Alla comparsa delle condizioni favorevoli all'infezione, intervenire preventivamente ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti.

- Utilizzare le dosi più alte e/o gli intervalli più brevi nelle situazioni di alta pressione della malattia

- Su varietà di tabacco sensibili alla peronospora in aree ad elevata pressione di infezione può essere utile la miscela con prodotti antiperonosporici specifici.

- Alle modalità raccomandate contro *Peronospora tabacina*, Bion® manifesta anche una protezione parziale nei confronti di malattie causate da virus e batteri.

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con gli antiparassitari di più comune impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: il formulato contiene sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per tabacco, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per nocciolo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle prodotte istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smallire secondo le norme vigenti

Taglie: kg 0.05-0.2-0.25-0.3-0.5-1

BION® MX

Granuli idrodispersibili.
Fungicida con attivatore delle autofedese per il controllo della Peronospora del tabacco.

Bion® MX

Composizione
metilaxyl-m puro 40 g
acibenzolar-S-methyl 4 g
coformulanti q.b. a 100 g



Irritante per gli occhi

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Proteggere gli occhi e la faccia
In caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.,

Origgio (Varese)

Strada Statale 233 Km 20.5

Tel. 02-96541

Officina di produzione: SYNGENTA CROP PROTECTION
A.G., Basilea (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n.

Kg

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

metilaxyl-m 40%

Acibenzolar-S-methyl 4%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXYL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esofalmo, dispnea, spasmi muscolari.

Terapia sintomatica.

Acibenzolar-S-methyl:

Consultare un Centro Antiveneni.

altre officine:

- Stabilimento di formulazione: SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basilea (Svizzera)
- Stabilimento di confezionamento: D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
- S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
- S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
- Stabilimento di formulazione: SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basilea (Svizzera)
- Stabilimento di confezionamento: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
- Stabilimento di formulazione: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
- Stabilimento di confezionamento: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Taglie: Kg 0.250-0.5

Bion®MX è la miscela di un attivatore delle autofedese della pianta, acibenzolar-S-methyl, e di un fungicida con proprietà sistemiche, metilaxyl-M.

Acibenzolar-S-methyl non presenta attività fungicida diretta sul patogeno, attiva i meccanismi naturali di difesa delle piante e ne aumenta la resistenza a numerose malattie; su tabacco incrementa la resistenza della pianta a Peronospora tabacina. Il prodotto viene assorbito velocemente e traslocato sia in senso ascendente che discendente all'interno della pianta. Per il suo particolare meccanismo d'azione, acibenzolar-S-methyl deve essere distribuito prima dell'instaurarsi dell'infezione.

Metilaxyl-M è un fungicida sistemico che viene rapidamente assorbito dalle parti verdi della pianta, traslocato in senso ascendente e distribuito nella vegetazione nuova. È dotato di una spiccata efficacia contro i funghi patogeni appartenenti alla Peronosporaceae.

Bion®MX, grazie alle due componenti ad elevata azione sistemica ed alle loro modalità d'azione completamente differenti, consente una protezione ottimale contro la Peronospora del tabacco.

Modalità di impiego e dosi

Cultura	Patogeno	dose in grammi per ettoliro	dose in grammi per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Tabacco	Peronospora tabacina	25-30	250-300	Trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni iniziando dopo la crisi di trapianto o quando si instaurano le condizioni favorevoli per l'infezione.

utilizzare le dosi più alte e/o gli intervalli più brevi nelle situazioni di alta pressione della malattia.

Effettuare al massimo 4 applicazioni.

In caso di impiego di volumi di acqua inferiori ai 10 hl, fare riferimento alla dose per ettaro.

Alle modalità raccomandate contro la Peronospora Bion®MX manifesta anche una protezione parziale nei confronti di malattie causate da virus.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con gli antiparassitari di più comune impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: il formulato contiene sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti


syngenta

PRIMO

Regolatore di crescita per tappeti erbosi di graminacee. Riduce la frequenza dei tagli e la quantità di erba falciata, rispetta l'estetica del tappeto erboso. Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili.

Composizione
Timevasec e ille puro
Coformulanti q. b. a

PRIMO

g 25
g 100

Irritante per gli occhi

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A., Origgio (Va)
Sede Sociale 233 Km 20.5 - tel. 02-96541

Officina di produzione: del
Registrazione Ministero della Salute n. del
Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n.

kg

Taglie: kg 2,4 (20 sacchetti da 120 g)

Officina di produzione:

SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)

AVVERTENZE PARTICOLARI

Nel caso di miscela con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai in contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato.

Per evitare lo smaltimento della confezione vuota non richiesta particolari accorgimenti.

(contenitore da g)

1



1
Rimuovere l'etichetta con la
spugna e smaltirla nel
20% di acqua.

2



2
Sverniciare i sacchetti idrosolubili
con acqua e smaltirli come
rifiuti.

3



3
Iniettare nel contenitore il
prodotto e smaltirlo come
rifiuto.

4



4
Mettere la sostanza (liquida o
solida) nel contenitore del
prodotto e smaltirlo come
rifiuto.

5



5
Rimuovere la sostanza (liquida o
solida) dal contenitore del
prodotto e smaltirlo come
rifiuto.

Norme precauzionali

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico

Non si ha un antidoto specifico.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Campo di applicazione

Primo viene utilizzato per rallentare lo sviluppo vegetativo delle graminacee che compongono il tappeto erboso nelle epoche in cui la loro crescita è maggiore. L'impiego di Primo viene indicato per tappeti ben curati (ingrati, concimati regolarmente, ecc.) o incolti. Primo viene consigliato anche su tappeti erbosi poco accessibili (lariceti, rughe, scarpate ecc.) dove lo sfalcio dell'erba diventa problematico. Primo consente di ridurre il numero degli sfalci e la quantità dell'erba falciata.

Modalità e durata d'azione

Primo limita l'allungamento delle cellule inibendo la sintesi delle gibberelline. Così, viene ridotta la crescita delle foglie e degli internodi. Primo persiste nella sostanza verde per un periodo di 4-6 settimane. Il tempo di permanenza è di circa un'ora e, dopo il trattamento, i lavori di manutenzione possono essere ripresi rapidamente (pochi ore dopo per l'irrigazione, 24 ore più tardi per il taglio).

Primo inizia ad agire dal momento in cui viene assorbito dalla pianta. Il rallentamento della crescita del tappeto è più percettibile 4-7 giorni dopo il trattamento. La durata d'azione è di circa 4-6 settimane e dipende dalle condizioni di crescita del tappeto. Primo è efficace su tutte le specie di graminacee che entrano nella composizione del tappeto: Festuca rubra, Agrostis sp., Dactylis glomerata, Paspalum notatum, Zoysia spp., non è attivo sulle dicotiledinee.

Selettività

Primo è selettivo sulle graminacee, che entrano, attualmente nella composizione dei tappeti erbosi come: Festuca rubra, Festuca arundinacea, Lolium perenne, Lolium multiflorum, Poa pratensis, Agrostis sp., Dactylis glomerata, Paspalum notatum, Zoysia spp. Primo non agisce su piante che rallentano la crescita dell'apparato aereo. Lo sviluppo dell'apparato radicale non viene ridotto, anzi, in certi casi, viene favorito. Primo aumenta, sovente, la densità ed il colore verde del manto erboso. Primo può essere utilizzato anche nel periodo di transizione perché non perturba la germinazione e la levatura delle graminacee. Si può applicare su tappeti erbosi impiantati da 3 mesi.

Epoca d'applicazione

Primo si utilizza durante il periodo in cui il tappeto erboso ha una crescita vigorosa:

- in primavera, da aprile a giugno
- in autunno, da settembre ad ottobre

I trattamenti con Primo possono essere ripetuti senza che l'aspetto estetico e la durata del tappeto vengano alterati. Possono essere effettuati 3-4 trattamenti all'anno: 2-3 da aprile a giugno, 1-2 da settembre ad ottobre. L'intervallo tra un trattamento e il successivo è di almeno 24 ore. Il primo trattamento deve essere effettuato prima o dopo lo sfalcio, ma è indispensabile attendere almeno 24 ore tra lo sfalcio e l'eventuale trattamento.

Dosi d'impiego

Primo viene consigliato, nella maggior parte dei casi, alla dose di 1,2 kg/ha (120 g/1000 m² = 1 sacchetto idrosolubile). Tuttavia, per ottenere una riduzione di crescita del tappeto per 4-6 settimane, si consiglia di adattare la dose d'impiego alle diverse situazioni di crescita e di manutenzione del tappeto stesso.

Tappeti falciati a meno di 2 cm di altezza

Concimazione recente	Concimazione scarsa o esaurimento della concimazione
1,4-1,8 kg/ha (110-130 sacchetti/ha) oppure 1 sacchetto dose per 1.000 m ²	1 kg/ha (83 sacchetti/ha) oppure 1 sacchetto dose per 1.200 m ²

Tappeti falciati a più di 2 cm di altezza

Concimazione recente	Concimazione scarsa o esaurimento della concimazione
1,4-1,8 kg/ha (110-130 sacchetti/ha) oppure 1 sacchetto dose per 850-750 m ²	1,2-1,4 kg/ha (110-120 sacchetti/ha) oppure 1 sacchetto dose per 1.000-800 m ²

Casi particolari:

- Sui tappeti formati principalmente da *Agrostis* sp., si consiglia di non superare la dose di 1 kg/ha.
- Presenza di *Poa annua* per limitare l'ingiallimento di *Poa*, si consiglia di utilizzare le seguenti dosi:

Poa annua presente dal 20% al 50%	Concimazione scarsa o esaurimento della concimazione recente
1 kg/ha	0,8 kg/ha per tappeti falciati a meno di 2 cm di altezza 1 kg/ha per tappeti falciati a più di 2 cm di altezza

Poa annua presente oltre il 50%	Concimazione scarsa o esaurimento della concimazione recente
0,8 kg/ha	Non trattare

Preparazione della coltura

Applicazioni con agitazione

- Riempiere il serbatoio con metà dell'acqua necessaria
- Mettere in moto l'agitatore
- Mettere il numero necessario di sacchetti idrosolubili direttamente nel serbatoio

- Attendere qualche minuto per la dissoluzione completa dei sacchetti e completare il riempimento del serbatoio, sempre mantenendo in agitazione la coltura

Mantenere l'agitatore in funzione per tutta la durata del trattamento

- Riempiere il serbatoio con la metà dell'acqua necessaria
- Mettere il numero necessario di sacchetti idrosolubili in un secchio riempito con acqua

- Lasciare dissolvere completamente i sacchetti
- Miscelare e versare la pozione così preparata nel serbatoio
- Aggiungere il restante quantitativo di acqua

- Completare la miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

- Consigli e precauzioni d'impiego
- Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione
- Evitare l'uso di prodotti chimici per il trattamento delle superfici
- Evitare l'uso di prodotti chimici per il trattamento delle superfici
- Trattare in assenza di vento e con cielo sereno. Evitare di trattare con tempo molto nuvoloso.
- Il tappeto erboso deve essere in buono stato vegetativo, in una fase di crescita attiva e diserbato (per evitare lo sviluppo delle dicotiledinee)
- Non trattare un tappeto sotto stress a seguito di lavorazioni meccaniche (dopo operazioni di aerazione ecc.), dopo un'inquinazione ed in presenza di temperature elevate o di gelate.
- Non trattare il tappeto erboso con prodotti di tipo chimico, in particolare con prodotti di tipo fungicida, in quanto si può verificare un'azione antagonista.
- Trattare con la vegetazione asciutta prevedendo che, per almeno un'ora dopo il trattamento, non cada la pioggia e non venga effettuata l'irrigazione.
- Mantenere un intervallo di almeno 24 ore tra il trattamento e lo sfalcio precedente o successivo.
- Dopo 4-7 giorni dal trattamento si consiglia di effettuare uno sfalcio per uniformare l'altezza del tappeto
- Applicare sui golf dei Campi da golf può non essere giustificata perché il prodotto non è registrato per questo tipo di impiego
- Evitare la deriva del prodotto sulle foglie delle piante limitrofe (alberi, arbusti, fiori ecc.)

- Da non applicare con mezzi aerei

- Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.

- Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura.
- Quali altro uso è previsto?
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- Smaltire secondo le norme vigenti

- DA NON VENDERSI SFUSO


syngenta

PRIMO

Regolatore di crescita per tappeti erbosi di graminacee. Riduce la frequenza dei tagli e la quantità di erba falciata, rispetta l'estetica del tappeto erboso. **Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili.**

PRIMO

Composizione
Synexapac etile puro
Coformulanti q.b. a



IRRITANTE

Irritante per gli occhi

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare la polvere
Evitare il contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. - Origlio (Va)
Strada Statale 233 Km 20.5 - tel. 02-96541
Officina di produzione:
Registrazione Ministero della Salute n. _____
Il contenitore non può essere riutilizzato.

kg

Partita n. _____

Taglie: q. 100 (5 sacchetti da 20 g)

Officina di produzione:

SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)

AVVERTENZE PARTICOLARI

Nel caso di miscela con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti.

Non conservare i sacchetti salubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato.

Peraltro lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

(confezione da _____ sacchetti da g. _____)

Norme precauzionali

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico

Non si ha un antidoto specifico.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Campo di applicazione

Primo viene utilizzato per rallentare lo sviluppo vegetativo delle graminacee che compongono il tappeto erboso nelle epoche in cui la loro crescita è maggiore. L'impiego di Primo viene indicato per tappeti erbosi (ingrati, conterminati, desertici, ecc.) in installazioni nuove o esistenti, per prati, giardini, campi sportivi, ecc. Primo può essere utilizzato anche sui tappeti erbosi poco accessibili (fiancheggi, rough, scarpate, ecc.) dove lo sfalcio dell'erba diventa problematico. Primo consente di ridurre il numero degli sfalci e la quantità dell'erba falciata.

Modo e durata di azione

Primo limita l'allungamento delle cellule interferendo la sintesi delle gibberelline. Così, viene ridotta la crescita delle foglie e degli internodi. Primo penetra nella pianta attraverso le foglie e gli steli e migra rapidamente verso i punti di accrescimento. Dopo l'assorbimento, le manifestazioni possono essere osservate rapidamente (pochi ore dopo per l'ingrossamento, 24 ore più tardi per il taglio). Primo inizia ad agire dal momento in cui viene assorbito dalla pianta, il rallentamento della crescita del tappeto è già percepibile 4-7 giorni dopo il trattamento. La durata di azione è di circa 4-6 settimane e dipende dalle condizioni di crescita del tappeto. Primo è efficace su tutte le specie di graminacee che entrano nella composizione dei tappeti: *Festuca rubra*, *Festuca arundinacea*, *Lolium perenne*, *Lolium multiflorum*, *Poa pratensis*, *Agrostis sp.*, *Cynodon dactylon*, *Paspalum notatum*, *Zoysia sp.*, non è attivo sulle dicotiledinee.

Selettività

Primo è selettivo sulle graminacee che entrano abitualmente nella composizione dei tappeti erbosi come *Festuca rubra*, *Festuca arundinacea*, *Lolium perenne*, *Lolium multiflorum*, *Poa pratensis*, *Agrostis sp.*, *Cynodon dactylon*, *Paspalum notatum*, *Zoysia sp.*. Su *Poa annua*, invece, può produrre un ingrossamento passeggero. Primo allenta la crescita delle foglie e degli internodi, ma non agisce sulla densità del cespo e sul numero dei culmi. Primo può essere utilizzato anche nel periodo di infiorescenza perché non perturba la germinazione e la levata delle graminacee. Si può applicare su tappeti erbosi impiantati da 3 mesi.

Epoca d'applicazione




Primo si utilizza durante il periodo in cui il tappeto erboso ha una crescita vigorosa: in primavera, da aprile a giugno, e in autunno, da settembre a novembre. Primo può essere applicato anche in estate, ma la durata del tappeto vengono alterati. Possibile essere effettuati 3-4 trattamenti all'anno: 2-3 da aprile a giugno, 1-2 da settembre ad ottobre. L'intervallo tra un trattamento ed il successivo è di circa 4-6 settimane in funzione della dose. Primo si può applicare indifferentemente prima o dopo lo sfalcio ma è indispensabile attendere almeno 24 ore tra lo sfalcio e l'eventuale trattamento.

Dosi d'impiego

Primo viene consigliato, nella maggior parte dei casi, alla dose di 1,2 kg/ha (120 g/1000 m² = 1 sacchetto idrosolubile). Tuttavia, per ottenere una riduzione di crescita del tappeto per 4-6 settimane, si consiglia di adattare la dose d'impiego alle diverse situazioni di crescita e di manutenzione del tappeto stesso.

Tappeti falciati a meno di 2 cm di altezza	
Confezione recente	Confezione scarsa o esaurimento della confezione
1,2 kg/ha oppure 1 sacchetto dose per 165 m ²	1 kg/ha oppure 1 sacchetto dose per 200 m ²

Tappeti falciati a più di 2 cm di altezza	
Confezione recente	Confezione scarsa o esaurimento della confezione
1,4 - 1,8 kg/ha oppure 1 sacchetto dose per 140-195 m ²	1,2-1,4 kg/ha oppure 1 sacchetto dose per 165-140 m ²



Casi particolari:

Sui tappeti formati principalmente da *Agrostis sp.*, si consiglia di non superare la dose di 1 kg/ha.
Presenza di *Poa annua*: per limitare l'ingrossamento di *Poa*, si consiglia di utilizzare le seguenti dosi:

Poa annua presente dal 20% al 50%	
Confezione recente	Confezione scarsa o esaurimento della confezione
1 kg/ha oppure 1 sacchetto dose per 200 m ²	0,8 kg/ha per tappeti falciati a meno di 2 cm di altezza oppure 1 sacchetto dose per 250 m ² oppure 1 kg/ha per tappeti falciati a più di 2 cm di altezza oppure 1 sacchetto dose per 200 m ²

Poa annua presente oltre il 50%	
Confezione recente	Confezione scarsa o esaurimento della confezione
0,8 kg/ha oppure 1 sacchetto dose per 250 m ²	Non trattare

Preparazione della poltiglia

Aggiungere il contenuto del sacchetto a 1 litro d'acqua.
Mescolare il prodotto con acqua.
Versare il prodotto in un secchio con metà dell'acqua necessaria.
Mettere il secchio in un luogo fresco.
Mettere l'importo necessario di sacchetti idrosolubili direttamente nel secchio.
Aggiungere acqua fino a riempire il secchio.
Mantenere l'agitatore in funzione per tutta la durata del trattamento.
Aggiungere acqua solo se necessario.
Riempiere il secchio con la metà dell'acqua necessaria.
Mettere il numero necessario di sacchetti idrosolubili in un secchio riempito con acqua.
Lasciare dissolvere completamente i sacchetti.
Mescolare e versare la poltiglia così preparata nel serbatoio.
Aggiungere il restante quantitativo di acqua.

Compatibilità

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Consigli e precauzioni d'impiego

Aggiungere il prodotto a 1 litro d'acqua.
Calcolare la quantità di poltiglia necessaria per il trattamento delle superfici previste al fine di evitare lo smaltimento di eventuali rimanenze.
Trattare in assenza di vento e con cielo sereno. Evitare di trattare con tempo molto nuvoloso.

Il tappeto erboso deve essere in buon stato vegetativo, in una fase di crescita attiva e disinquinato (per evitare lo sviluppo delle dicotiledinee).

Non trattare un tappeto sotto stress a seguito di lavorazioni meccaniche (dopo diserbo o di sfalcio, aratura, ecc.), tanto o nutrizione ed in presenza di temperature elevate o di siccità.

I risultati migliori vengono ottenuti su tappeti in attiva crescita, ben concimati 2 settimane circa prima del trattamento.

Trattare con la vegetazione asciutta prevedendo che, per almeno un'ora dopo il trattamento, non cada la pioggia e non venga effettuata l'irrigazione.

Mantenere un intervallo di almeno 24 ore tra il trattamento e lo sfalcio precedente o successivo.

Prima del trattamento si consiglia di effettuare uno sfalcio per uniformare l'altezza del tappeto.

L'applicazione sui giardini da campo da golf può non essere giustificata perché il tappeto necessita di sfalci frequenti.

Evitare la deriva del prodotto sulla foglia delle piante limitrofe (alberi, arbusti, fiori, ecc.).

Da non applicare con mezzi aerei



Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle prodotte istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alla piante, alle persone e agli animali.

Smaltire secondo le norme vigenti

DA NON VENDERSI SFUSO



syngenta

PRIMO

Regolatore di crescita per tappeti erbosi di graminacee. Riduce la frequenza dei tagli e la quantità di erba falciata, rispetta l'estetica del tappeto erboso. Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili.

**Composizione**

Trinexapac etile puro	g 25
Coformulanti q.b. a	g 100

Avvertenze: leggere il foglio illustrativo

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A., Origgio (Va)
Strada Statale n. 233 Km 20.5
tel. 02-9654.1

Registrazione Ministero della Salute n. del

g

syngenta

MODO D'UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

-  **1** Riempi il secchio con acqua.
25% di acqua.
-  **2** Estrai i sacchetti idrosolubili dalla confezione con mani asciutte.
-  **3** Introduci nel secchio il numero di sacchetti come da etichetta.
-  **4** Metti in funzione l'agitatore e attendi lo scioglimento dei sacchetti (in quattro minuti).
-  **5** Aggiungi la miscela pronta d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE PARTICOLARI

Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti.

Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi.

Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione.

Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato.

Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.


(confezione da sacchetti da g)

PRIMO

Regolatore di crescita per tappeti erbosi di graminacee.
Riduce la frequenza dei tagli e la quantità di erba falciata, rispetta l'estetica del tappeto erboso.
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili.

PRIMO

Composizione
Trinexapac etile g 25
Coformulanti quanto basta a g 100



Irritante per gli occhi

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A., Origgio (Va)
Strada Statale 233 Km 20.5 - tel. 02-96541

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Salute n. del

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Partita n.

kg

Norme precauzionali

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico
Non si ha un antidoto specifico.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZA:

Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo o sull'astuccio o sul sacchetto esterno.

Taglie: g 100 (5 sacchetti da 20 g)

Officina di produzione:

.SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)

Switch® è un fungicida in granuli idrodispersibili per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia della lattuga, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.

Costituito da una miscela di due diversi principi attivi, il ciprodinil ed il fludioxinil, Switch è dotato di attività parzialmente sistemica nonché di copertura; presenta inoltre un meccanismo d'azione diverso da quello di benzimidazoli, dicarbosimidi ed inibitori della biosintesi degli steroli.

Switch è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili.

Modalità di impiego e dosi

Cultura	Patogeno	Dose grammi/100 litri	Dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Vite	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	80	0,6-0,8	1 trattamento in pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invasatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 trattamenti.
Fragola (serra e pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	80	0,8	Effettuare 2-3 trattamenti nelle fasi: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.
Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchini (serra e pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	60-80	0,6-0,8	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Albicocco, pesco, susino, ciliegio	Moniliosi rami e fiori: <i>Monilia spp.</i>	30	0,3	Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento alla caduta dei petali.
	Moniliosi dei frutti: <i>Monilia spp.</i>	60	0,8-1	1-2 trattamenti in pre-raccolta.
Floricole	<i>Botrytis spp.</i>	80	0,8-1	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.

syngenta

SWITCH®

Granuli idrodispersibili
Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia della lattuga, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero

Switch®

Composizione

100 g di prodotto contengono:
37,5 g ciprodinil puro
25 g fludioxinil puro
q.b. a 100 g coformulanti

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Syngenta Crop Protection S.p.A.,
Origgio (Va)

SS n. 233 Km 20,5 tel. 02-96541

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Sanità n. 9578 del 02.04.1998

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n.

Kg

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altra coltura, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Sintomi specifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
Terapia sintomatica.

Avvertenza Consultare un Centro Antiveneni!

Taglie: Kg 0,1-0,2-0,3-0,5-1

Officina di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basilea (Svizzera)

Lattuga (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia: <i>Sclerotinia spp.</i> e <i>Botrytis cinerea</i>	50-70	0,5-0,7	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Pero	Maculatura bruna: <i>Stemphylium vesicarium</i>	60-80	0,8-1	Trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni in prossimità della raccolta o nelle fasi più critiche per la malattia. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.

Utilizzare i dosaggi inferiori nelle zone a bassa pressione di infezione
- 1 dosaggio per ettaro sono calcolati sulla base di volumi di applicazione pari a 10 hl/ha (15 hl/ha sui fruttiferi).
Per trattamenti con volumi maggiori non superare la dose massima per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità

E' possibile miscelare il prodotto con altri antiparassitari. "Avvertenza" in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele.

Attenzione: il formulato contiene sostanze attive molto tossiche per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Utilizzare il prodotto ad almeno 20 metri di distanza da qualsiasi corpo idrico.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
vite: 21 giorni; drupacee, pero, lattuga: 14 giorni; pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, fragola: 7 giorni

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smatire secondo le norme vigenti

syngenta

TORNADO

Erbicida di post-emergenza per il controllo delle infestanti della soia

Emulsione olio/acqua

Da applicare in miscela con Turbocharge

COMPOSIZIONE:

Fluazifop-p-butile puro 9 8,4 (=90 g/l)
Fomesafen puro 9 11,2 (=120 g/l)
Coadiuvanti e inert q.b.a 9 100



FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con la pelle.
Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Origlio (VA) Strada Statale 233 km 20.5 Tel. 02/9654.1

Stabilimento di produzione:
Syngenta Crop Protection, Inc. - North Little Rock Plant (USA)

Registrazione Ministero della Sanità N. del

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n°

Confezione da: **1**

CAMPO E DOSI D'IMPIEGO

TORNADO si applica su soia alla dose di 2-3 l/ha, aggiungendo 500 ml/ha (0,5%) dell'attivante TURBOCHARGE.

AVVERTENZE

- Adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali d'impiego.
- Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, ed umidità relativa dell'aria inferiore al 60%).
- Eventuali precipitazioni che cadano dopo quattro ore dal trattamento non influiscono sull'efficacia di TORNADO.

EPOCHE D'INTERVENTO

Soia	Dopo la 1ª foglia trifogliata e prima dell'inizio della fioritura.
Graminacee annuali	1-3 foglie/accescimento
Sorghetta da rizoma	30-50 cm di altezza
Dicotiledoni	2-4 foglie

MODALITÀ D'IMPIEGO

TORNADO si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm.) impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (200-400 l/ha), onde favorire la uniforme copertura della vegetazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. TORNADO può risultare fitotossico se applicato durante le ore più calde del giorno. Eventuali ingiallimenti ed inbrunimenti alla coltura normalmente vengono superati nell'ambito di due-tre settimane. Qualora vengano introdotte nuove varietà, si consiglia, prima dell'impiego del TORNADO, di effettuare piccole prove di saggio. In presenza di terreno particolarmente sciolto, drenante ed organico, impiegare solo la dose minore.

COMPATIBILITÀ

TORNADO è compatibile con TURBOCHARGE.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di latenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Altre leggie: ml 500; l 5; l 10

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Fluazifop-p-butile 8,4%
Fomesafen 11,2%

le quali provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflexia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia e rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

TORNADO controlla le infestanti graminacee e quelle a foglia larga della soia, agendo sia per via fogliare, sia per via radicale. TORNADO si applica in post-emergenza delle malerbe.

Infestanti graminacee: il prodotto è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di 1 settimana.

Infestanti dicotiledoni: il prodotto è assorbito dalle parti verdi delle piante e dalle radici; l'assorbimento radicale è favorito nei terreni umidi a seguito di piogge o irrigazioni.

TORNADO distrugge la vegetazione infestante provocando la necrosi dei tessuti, un rapido disseccamento e quindi la morte.

SPETTRO D'AZIONE

Infestanti graminacee: quali Avena (*Avena spp.*), Bromo (*Bromus spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Digitaria (*Digitaria sanguinalis*), Falanide (*Phalaris spp.*), Glavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Setaria (*Setaria spp.*), Sorghetta (*Sorghum halepense*), riccio di frumento ed orzo.

Infestanti dicotiledoni: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis spp.*), Borsa del pastore (*Caposella bursa pastoris*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba strega (*Stachis spp.*), Fainello (*Chenopodium spp.*), Mercurella (*Mercurialis annua*), Polygono persicaria (*Polygonum persicaria*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Ravanella selvatica (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Veronica comune (*Veronica persica*). L'Erba fienarola (*Poa annua*) è mediamente resistente.

DA NON VENDERSI/SFUSO

il contenitore completamente svuotato non può essere disperso nell'ambiente.

Smaltire secondo le norme vigenti

IMPRESA

TECNITERRA S.r.l.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TRIOIDIOL

fungicida a base di Triadimenol e Zolfo
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

Composizione

- Triadimenol puro g. 2,5
- Zolfo puro..... g. 50
(esente da Selenio)
- coformulanti qb a g. 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : sostanza pericolosa per inalazione, per ingestione, e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI : Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone -

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : TRIADIMENOL 2,5%, ZOLFO 50% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione :

TRIADIMENOL : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.

ZOLFO : --

Terapia : sintomatica. - Consultare un centro antiveneni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO

Fungicida sistemico e di contatto con attività preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine; indicato sulle seguenti colture per combattere l'Oidio o Mal Bianco e le Ruggini di :

VITE - CETRIOLO - MELONE - PEPPERONE - POMODORO - PESCO - CEREALI - ZUCCHINO - MELO - PIANTE ORNAMENTALI : g. 100 - 200 per q.le acqua

Impiegare la dose più alta in caso di maggiore sensibilità varietale in zone soggette ad attacchi di Oidio o con intervalli, tra i trattamenti, superiori ai 10 giorni. Non trattare durante le ore più calde.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : tra il trattamento con il prodotto e l'impiego di olii minerali attendere 2 settimane

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, melo, peperone, cetriolo, melone, pomodoro, 7 giorni per lo zucchini, 30 giorni per i cereali e 10 giorni per il pesco.

Fitotossicità : il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di mele : Stayman (Winesap), Granny Smith, Starking, Renetta. Sulla Vite è fitotossico sulla Cv. Sangiovese.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

TECNITERRA srl - Via Bronzino 19 - Milano

stabilimento produttore : STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA); CHEMIA spa - S. Agostino (FE); DIACHEM spa - Unità Produttiva SIFA Caravaggio (BG); COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A. - S. Pere Moianta (Barcellona - Spagna)

Registrazione n. del del Ministero della Sanità

Kg. 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IMPRESA

TERRANALISI S.r.l.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

BAGNACOL

BAGNACOL

BAGNANTE ADESIVO ANTISCHIUMA NON IONICO

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
Nonifoleno ossietilato puro g 19,8 (g/l 200)
Polietilenglicole puro g 9,9 (g/l 100)
Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA
NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207
Stabilimento di produzione:
- TERRANALISI S.R.L., Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)
- ALTHALLER ITALIA S.R.L., Strada Comunale Per Campagna, San Colombano A/ Lambro (MI)
- CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 48, Sant'Agostino (FE)
- DIACHEM S.P.A. - Unità produttiva SIFA, S.S. Padana Superiore, Caravaggio (BG)
- SCAM S.R.L., Via Bellaria n. 164, Modena
- S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A., Via Pian D'Asso, Torrenieri Fraz. Montalcino (SI)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9687 del 14/07/1998

CONTENUTO: l 1-5-10-20-25-50

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita:

NOTIFICHE PRECAUTORIZZANTI - Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INDICAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consigli interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

BAGNACOL è un classico coadiuvante di tutte le poltiglie antiparassitarie. Questo preparato si distingue per la proprietà antischiuma e per non essere ionico. Il suo impiego è anche utile per pulire gli utensili e le attrezzature impiegate per la preparazione e la distribuzione delle miscele antiparassitarie.

DOSI DI IMPIEGO

Come bagnante-adesivo ml 30-60 per 100 litri di acqua

Come detergente ml 80-100 per 100 litri di acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari e miscele degli stessi.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

BETAFIL FL

BETAFIL FL

DISERBANTE SELETTIVO PER IL DISERBO DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, DA ORTO E DA FORAGGIO, SPINACIO
TIPO DI FORMULAZIONE: SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono

- FENMEDIFAM puro g 15,9
 - Coadiuvanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Il prodotto è tossico per l'uomo e per gli animali. Evitare l'uso di questo prodotto in aree protette e in prossimità di abitazioni. Non gettare il prodotto o i rifiuti in acqua, terra o rifiuti. Non gettare il prodotto o i rifiuti in acqua, terra o rifiuti. Non gettare il prodotto o i rifiuti in acqua, terra o rifiuti.

Il prodotto è tossico per l'uomo e per gli animali. Evitare l'uso di questo prodotto in aree protette e in prossimità di abitazioni. Non gettare il prodotto o i rifiuti in acqua, terra o rifiuti. Non gettare il prodotto o i rifiuti in acqua, terra o rifiuti.



TERRANALISI S.R.L.

Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L., Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE) - CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6001 del 27/06/1994
DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO: ml 100-500 e 1-5-10

Riferimento partita:

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Il BETAFIL FL è un diserbante selettivo di post-emergenza che agisce per assorbimento fogliare di contatto sulle seguenti infestanti:

Anagallis arvensis, Atriplex patula, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Galinoga parviflora, Lamium purpureum, Linaria minor, Matricaria spp., Myosotis arvensis, Papaver spp., Plantago major, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Spargula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica persicaria, Viola tricolor.

BARBABIETOLA A SEMINA PRIMAVERILE

Immediato in post-emergenza della coltura con le erbe infestanti in fase di attiva crescita, con massimo 2 foglie vere, a litri 6-8 per ettaro in 250-400 litri di acqua sulle infestanti asciutte e con temperature massimo di 25°C, altrimenti si possono verificare delle ustioni.

Si possono effettuare, inoltre, le seguenti miscele:

- litri 5 addizionato a prodotti a base di Etofumesate a litri 0,950 - 1,150 per ettaro, in 250-300 litri di acqua, con infestazione di Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Amaranthus spp., Polygonum aviculare e infestanti graminacee non ancora accettate.

- litri 4 addizionato a Etofumesate litri 3 per ettaro, in 250-300 litri di acqua in presenza di infestanti con maggioranza di graminacee quali Alopecurus, Avena, Digitaria, Panicum, Setaria che non siano in fase di accostimento.

Tenere presente che le miscele sopracitate debbono effettuarsi solo con barbafile che abbiano 2-4 foglie vere e con la temperatura non superiore ai 20-22°C.

BARBABIETOLA A SEMINA AUTUNNALE

Litri 8 in 350-400 litri di acqua, per ettaro con infestazione di Chenopodium, Papaver, Polygonum convolvulus, Raphanus, Sinapis e tutte le infestanti sensibili.

Si possono effettuare, inoltre, le seguenti miscele:

- litri 5 - 6 addizionato a Etofumesate litri 1,400 per ettaro, in 250 - 300 litri di acqua in presenza di infestanti di Galium, Veronica, Fumaria, Stellaria e graminacee non ancora accettate; si trattare con coltura allo stadio minimo di 2 foglie vere, con temperature sui 15-20°C sia ha il massimo assorbimento, se si tratta in giornate calde intervenire verso sera nelle ore più fresche, nel caso si verifichi una pioggia entro le sei ore dal trattamento, l'effetto del prodotto può essere ridotto. Trattare con colture sane e non sofferenti per cause varie.

SPINACIO

litri 6-8 per ettaro, in post-emergenza, in 300-400 litri di acqua con infestanti poco sviluppate (massimo 2-4 foglie vere); se si hanno infestanti più sviluppate trattare con litri 6 addizionato a prodotti a base di Lenacil (all'80% di principio attivo) kg 0,8 per ettaro, in 300 - 350 litri di acqua nella fase in cui lo spinacio ha 2 - 4 foglie vere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: non compatibile con prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

GETTING ON

**DISERBANTE SELETTIVO PER IL DISERBO DI BARBABIETOLA
DA ZUCCHERO, DA ORTO E DA FORAGGIO, SPINACIO
TIPO DI FORMULAZIONE : SOSPENSIONE CONCENTRATA**

COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono
- FENMEDIFAM puro g 15,9
- Coadiuvanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

[illegible]

RE: "HARRINGTON WERE IN VERMONT" - LA 000, 11/10/72, P. 2
 10/10/72 - 10/10/72 (10/10/72) - 10/10/72 - 10/10/72

**TERRANALISI S.R.L.**

Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L., Via Nino Bixio
n. 6, Cento (FE) - CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46,
Sant'Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6001 del 27/06/1994

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO: ml 100-500

Riferimento partita:

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

For more information, visit www.pearsoncmg.com

FOGLIO ILLUSTRATIVO**BETAFIL FL**

DISERBANTE SELETTIVO PER IL DISERBO DI BARBABIETOLA
DA ZUCCHERO, DA ORTO E DA FORAGGIO, SPINACIO
TIPO DI FORMULAZIONE : SOSPENSIONE CONCENTRATA

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Il BETAFIL FL è un diserbante selettivo di post-emergenza che agisce per assorbimento fogliare di contatto sulle seguenti infestanti:

Anagallis arvensis, Atriplex patula, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Lamium purpureum, Linaria minor, Matricaria spp., Myosotis arvensis, Papaver spp., Plantago major, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Spargula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica persicaria, Viola tricolor.

BARBABIETOLA A SEMINA PRIMAVERILE

impiegato in post-emergenza della coltura con le erbe infestanti in fase di attiva crescita, con massimo 2 foglie vere, a litri 6-8 per ettaro in 250-400 litri di acqua sulle infestanti asciutte e con temperature massimo di 25°C, altrimenti si possono verificare delle ustioni.

Si possono effettuare, inoltre, le seguenti miscele:

- litri 5 addizionato a prodotti a base di Etofumesate a litri 0,950 - 1,150 per ettaro, in 250-300 litri di acqua con infestazione di Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Amaranthus spp., Polygonum aviculare e infestanti graminacee non ancora accestite.
- litri 4 addizionato a Etofumesate litri 3 per ettaro, in 250-300 litri di acqua in presenza di infestanti con maggioranza di graminacee quali Alopecurus, Avene, Digitaria, Panicum, Setaria che non siano in fase di accestimento.

Tenere presente che le miscele sopracitate debbono effettuarsi solo con barbabietole che abbiano 2-4 foglie vere e con la temperatura non superiore ai 20-22°C.

BARBABIETOLA A SEMINA AUTUNNALE

Litri 8 in 350-400 litri di acqua, per ettaro, con infestazione di Chenopodium, Papaver, Polygonum convolvulus, Raphanus, Sinapis e tutte le infestanti sensibili.

Si possono effettuare, inoltre, le seguenti miscele:

- litri 5 - 6 addizionato a Etofumesate litri 1,400 per ettaro, in 250 - 300 litri di acqua in presenza di infestanti di Galium, Veronica, Fumaria, Stellaria e graminacee non ancora accestite; si trattare con coltura allo stadio minimo di 2 foglie vere, con temperature sui 15-20°C sia ha il massimo assorbimento, se si tratta in giornate calde intervenire verso sera nelle ore più fresche; nel caso si verifichi una pioggia entro le sei ore dal trattamento, l'effetto del prodotto può essere ridotto. Trattare con colture sane e non sofferenti per cause varie.

SPINACIO

litri 6-8 per ettaro, in post-emergenza, in 300-400 litri di acqua con infestanti poco sviluppate (massimo 2-4 foglie vere); se si hanno infestanti più sviluppate trattare con litri 6 addizionato a prodotti a base di Lenacil (all'80% di principio attivo) kg 0,8 per ettaro, in 300 - 350 litri di acqua nella fase in cui lo spinacio ha 2 - 4 foglie vere.

Compatibilità: non compatibile con prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.



TERRANALISI S.R.L.

Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

MENDENE

NORME PRECAUZIONALI - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ENDOSULFAN 28%, METIPARATION 12%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: METIPARATION - Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscolari (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, rinosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

ENDOSULFAN - Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia, parestesie, convulsioni. Terapia: sintomatica.

Controindicazioni: per l'ENDOSULFAN, per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni

MODALITA' D'IMPIEGO

MENDENE è un insetticida polivalente che unisce le qualità di due noti principi attivi, possiede una azione iniziale e resistente nel tempo.

MENDENE risulta efficace contro i seguenti insetti: Tignole del melo, dell'uva, Antonomo del melo e del pero; Tenitredini e insetti minatori del melo, pero; Afidi in genere delle seguenti colture: barbabietola da zucchero, pomacee, pesco, pomodoro, meloni, zucche, cocomeri, floreali, ornamentali, pioppo; Psille del pero; Maggiolini delle radici di: pero, pioppo, tulipano (larve delle radici e adulti delle foglie); Eriofide del nocciolo; Dorifora della patata; Altica e Cleono della barbabietola.

MENDENE

INSETTICIDA POLIVALENTE LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

Endosulfan puro g 28 (g/l 270)
Metiparation puro g 12 (g/l 115)
Coformulanti q.b. a 100
(Contiene Xilene)

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 1255 del 03/09/1968.

FRASI DI RISCHIO - Inflammabile

- Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
- Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

- Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia. - Conservare lontano da locali di abitazione. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Non respirare i vapori. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Evitare il contatto con gli occhi. - In caso di contatto con gli occhi, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).



TERRANALIS S.R.L.

Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6835207

Stabilimento di produzione: - CHEMIA S.P.A., Strada Statale n.

255 Km 46, Sant'Agostino (FE) - ALTHALLER ITALIA S.R.L.,

Strada Comunale Per Campagna, San Colombano Al Lambro (MI)

- SCAM S.R.L., Via Bellaria n. 164, Modena

Registrazione del Ministero della Sanità n. 1914 del 12/04/1976

CONTENUTO: l 1,5-10-20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita:

La dose d'impiego è di ml 100-200/ha di acqua a seconda dei parassiti da combattere e della gravità degli attacchi, (per il peso dose massima: 800 g s.a./ha, numero massimo di applicazioni: 3 - per la vite dose massima: 1050 g s.a./ha, numero massimo di applicazioni: 2).

Per i parassiti della barbabietola (Altica, Afidi, Cleono) l 1,5-2 per ettaro in 500-800 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - MENDENE è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci, gli insetti utili, animali domestici ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su vite, 25 giorni sulle altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

TRIS DG

FUNGICIDA A BASE DI TRIADIMENOL - FORMULAZIONE : MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono

TRIADIMENOL puro	g	5
Coformulanti q. b. a	g	100

CONTIENE SACCHETTI IDROSOLUBILI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA : Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il TRIS DG è un fungicida appartenente al gruppo dei triazoli con attività sistemica, preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine. La sua rapida penetrazione gli permette di sfuggire ad eventuali piogge dilavanti. Indicato contro le seguenti malattie fungine: Mal bianco, Ruggini, sulle seguenti colture: (dosi riferite a q.le acqua)

POMODORO - PEPPERONE : contro Oidio g 50 - 100

MELO : contro Oidio g 50 - 80

PESCO : contro Oidio g 50 - 100

VITE : contro Oidio g 50 - 100, per trattamenti curativi effettuare 2 - 3 interventi ad intervalli di 7 - 10 giorni di cui il primo all'inizio dell'attacco.

CETRIOLO - MELONE - ZUCCHINO : contro Oidio g 50 - 100

CEREALI : contro Oidio e Ruggini a kg 2,5 per ettaro in litri 600 - 800 di acqua trattando alla prima comparsa dei sintomi.

ORNAMENTALI : contro Oidio g 50 - 100

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : non compatibile con i prodotti alcalini

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, peperone, cetriolo, melone, pomodoro, melo, 7 giorni per lo zucchini, 30 giorni per i cereali e 10 giorni per il pesco.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.



TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE)

Stabilimento di produzione: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)


Registrazione del Ministero della Sanità n. del

CONTENUTO: g 500 (5 x g 50) - Kg 1 (10 x g 100; 5 x g 200)


DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Riferimento partita:


MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI




Assicurare la completa pulizia della botte e riempire l'atomizzatore col 25% di acqua.




Con mani/guanti asciutti prelevare il numero di sacchetti idrosolubili, chiusi, previsti.



Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore.



Attendere qualche minuto fino a completa solubilizzazione.



Aggiungere la restante parte di acqua necessaria ed eventuali altri prodotti da miscelare.

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato.

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

TRIS DG

FUNGICIDA A BASE DI TRIADIMENOL - FORMULAZIONE : MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono

TRIADIMENOL puro	g	5
Coformulanti q. b. a	g	100

Da utilizzare in modo sensato e moderato

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e da bambini.



TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE)

Stabilimento di produzione: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

DA NON VENDERSI NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

CONTENUTO: g 500 (5 x g 50) - Kg 1 (10 x g 100; 5 x g 200)

FOGLIO ILLUSTRATIVO**TRIS DG****FUNGICIDA A BASE DI TRIADIMENOL - FORMULAZIONE : MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI****MODALITA' D'IMPIEGO**

Il TRIS DG è un fungicida appartenente al gruppo dei triazoli con attività sistemica, preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine. La sua rapida penetrazione gli permette di sfuggire ad eventuali piogge dilavanti. Indicato contro le seguenti malattie fungine : Mal bianco, Ruggini, sulle seguenti colture : (dosi riferite a q.le acqua)

POMODORO - PEPERONE : contro Oidio g 50 - 100

MELO : contro Oidio g 50 - 80

PESCO : contro Oidio g 50 - 100

VITE : contro Oidio g 50 - 100, per trattamenti curativi effettuare 2 - 3 interventi ad intervalli di 7 - 10 giorni di cui il primo all'inizio dell'attacco.

CETRIOLO - MELONE - ZUCCHINO : contro Oidio g 50 - 100

CEREALI : contro Oidio e Ruggini a kg 2,5 per ettaro in litri 600 - 800 di acqua trattando alla prima comparsa dei sintomi.

ORNAMENTALI : contro Oidio g 50 - 100

COMPATIBILITA' : non compatibile con i prodotti alcalini

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, peperone, cetriolo, melone, pomodoro, melo, 7 giorni per lo zucchini, 30 giorni per i cereali e 10 giorni per il pesco.



TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE)

TRIS DG

FUNGICIDA A BASE DI TRIADIMENOL - FORMULAZIONE : MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

TRIADIMENOL puro	g	5
Coformulanti q. b. a	g	100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA : Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il TRIS DG è un fungicida appartenente al gruppo dei triazoli con attività sistemica, preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine. La sua rapida penetrazione gli permette di sfuggire ad eventuali piogge dilavanti. Indicato contro le seguenti malattie fungine : Mal bianco, Ruggini, sulle seguenti colture : (dosi riferite a q.le acqua)

POMODORO - PEPERONE : contro Oidio g 50 - 100

MELO : contro Oidio g 50 - 80

PESCO : contro Oidio g 50 - 100

VITE : contro Oidio g 50 - 100, per trattamenti curativi effettuare 2 - 3 interventi ad intervalli di 7 - 10 giorni di cui il primo all'inizio dell'attacco.

CETRIOLO - MELONE - ZUCCHINO : contro Oidio g 50 - 100

CEREALI : contro Oidio e Ruggini a kg 2,5 per ettaro in litri 600 - 800 di acqua trattando alla prima comparsa dei sintomi.

ORNAMENTALI : contro Oidio g 50 - 100

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : non compatibile con i prodotti alcalini

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, peperone, cetriolo, melone, pomodoro, melo, 7 giorni per lo zucchini, 30 giorni per i cereali e 10 giorni per il pesco.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.



TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE)

Stabilimento produttore : A.D.I.C.A. S.R.L., Via Dello Stabilimento n. 11, Nera Montoro (Terni) - S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

CONTENUTO: g 50-100-200-500 Kg 1-5-10

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Riferimento partita:

IMPRESA

UNIROYAL CHEMICAL S.r.l.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ROYAL MH 60GTM

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

FITOREGOLATORE IN GRANULI SOLUBILI PER IL CONTROLLO DEI GERMOGLI ASCELLARI PRIMARI E SECONDARI DEL TABACCO E DEI GERMOGLI DI CIPOLLA ED AGLIO

Reg. Ministero della Sanità N. 7535 del 22/09/88

Composizione

Ildrazide maleica pura g. 60
(contenente meno di 1 mg/Kg di idrazina)
Coformulanti q.b.a g.100

Partita n.

Contenuto:

1 Kg (20 s.i. x 50 g) - 1 Kg (10 s.i. x 100 g)
2 Kg (4 s.i. x 500 g) - 4 Kg (4 s.i. x 1 Kg)

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi: irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

Caratteristiche

Il ROYAL MH 60G viene assorbito dalle piante per via fogliare e traslocato in ogni suo organo per via linfatica. Nei germogli, inibisce principalmente i processi respiratori delle cellule, riduce le attività enzimatiche, rallenta la moltiplicazione cellulare. La sommatoria di queste complesse azioni impedisce lo sviluppo dei germogli e dei succhioni principali e secondari. Sul tabacco, questo prodotto impedisce lo sviluppo dei germogli ascellari. Dato che il ROYAL MH 60G viene assorbito ed entra in circolo nella pianta, non è necessario irrorare l'intera pianta. Il miglior controllo si ottiene quando viene irrorata da 1/3 a 1/2 della parte superiore della pianta. Nella cipolla e nell'aglio il ROYAL MH 60G inibisce la germinazione durante la conservazione in magazzino ne, evita inoltre le perdite dovute alla disidratazione.

TABACCO**Dosi e modalità d'impiego**

Sulle varietà Nostrano del Brenta, Beneventano, Havanna, Bright, Burley, in caso di applicazione meccanica, il ROYAL MH 60G si impiega alla dose di 2,8-4,2 Kg/ha di prodotto diluito in circa 500 litri di acqua, corrispondenti, per un investimento di 20.000 piante, a 140-210 g di prodotto per 1000 piante; sulla varietà Kentucky si impiegano 200-250 g di prodotto per 1000 piante, avendo cura che la quantità di prodotto irrorato per ettaro non superi i 4,2-5 Kg. In caso di applicazione manuale, diluire la quantità di prodotto da impiegare su 1000 piante in 20 litri di acqua ed impiegare 15-20 ml per pianta di questa soluzione.

Epoca di impiego

Trattare con ROYAL MH 60G entro 24 ore dalla cimatura eseguita allo stadio della piena fioritura. Il trattamento può essere effettuato con un irroratore a spalla ad un solo ugello, oppure con attrezzature dotate di barre appositamente studiate per questo impiego.

Si raccomanda inoltre quanto segue:

1. Trattare le piante in modo uniforme e quando le foglie sono asciutte;
2. Irrorare solo il terzo o la metà superiore della pianta;
3. Trattare durante la mattina; non applicare il prodotto durante le ore troppo calde della giornata o nel tardo pomeriggio o di sera quando le foglie sono troppo appassite;
4. Impiegare irroratori con ugelli a getto sottile;
5. Non applicare il prodotto su piante per la produzione del seme;
6. Una eventuale pioggia dopo 12 ore dal trattamento non pregiudica l'effetto del prodotto;
7. In alcune condizioni, le foglie apicali del tabacco trattato hanno tendenza ad ingiallire anticipatamente; ciò non è dannoso, ma non significa che il tabacco sia maturo. Non iniziare la raccolta utilizzando il colore delle foglie come il solo indice di maturità;
8. Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture vicine a quella soggetta ad irrorazione;
9. Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali.

CIPOLLE ED AGLIO**Dosi e modalità d'impiego**

Cipolla: 2,8-4 Kg in 500-600 litri di acqua per ettaro.

Aglio: 2,8-4 Kg in 500-600 litri di acqua per ettaro.

UNIROYAL CHEMICAL SRL

Via delle Industrie, 40
Latina Scalo (LT)

Officine di produzione:

Uniroyal Chemical Co. Inc. - Naugatuck, USA
Uniroyal Chemical Srl - Latina Scalo (LT)

ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Il contenitore non può
essere riutilizzato

Assicurare una buona copertura delle foglie.

Il rispetto dei tempi di applicazione è essenziale per ottenere i migliori risultati.

Nelle cipolle: applicare ROYAL MH 60G quando i bulbi sono pienamente maturi, nello stadio di inizio piegamento delle foglie. Questo stadio si individua quando il 10% delle foglie sono piegate, ma sono ancora tutte verdi. Questo stadio si raggiunge da circa 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.

Nell'aglio: ROYAL MH 60G si applica allo stadio che precede l'appassimento, quando tutte le foglie sono ancora verdi, appena prima il viraggio al colore giallo che si verifica da 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.

Per le cipolle e l'aglio la presenza di foglie verdi è essenziale per consentire l'assorbimento del ROYAL MH 60G e la sua traslocazione. ROYAL MH 60G non ha effetto se la sua applicazione è troppo tardiva, anche sulle cipolle quando le piante hanno 3 foglie verdi e tutte le foglie sono piegate. Su aglio e cipolla si raccomanda di associare l'impiego di ROYAL MH 60G alla scelta di varietà vegetali con buone caratteristiche di conservabilità.

Non applicare su varietà a bassa capacità di conservazione.

Apparirà una diminuzione di efficacia se piove o se si irigheranno le colture entro 24 ore dal trattamento.

Per consentire il migliore assorbimento e traslocazione del ROYAL MH 60G, non trattare in condizioni di carenza idrica, quando la temperatura supera i 25°C o quando la coltura è sotto condizioni di stress da malattie fungine o da attacchi di insetti. Sebbene il ROYAL MH 60G non sia volatile bisogna assolutamente evitare la deriva del prodotto sulle colture vicine.

La cipolla e l'aglio evitano di applicare il prodotto troppo anticipatamente. Se l'applicazione è effettuata prima di due settimane dalla maturazione potrebbero svilupparsi dei tuberi spugnosi.

AVVERTENZE D'USO: Nel caso di miscele con altri prodotti si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione del sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il ROYAL MH 60G non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto va irrorato da solo.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO: SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

TM Marchio registrato Soc. UNIROYAL Inc. - New York, USA**MODO D'IMPIEGO**

ROYAL MH 60GTM

FITOREGOLATORE IN GRANULI SOLUBILI PER IL CONTROLLO DEI GERMOGLI ASCELLARI PRIMARI E SECONDARI DEL TABACCO E DEI GERMOGLI DI CIPOLLA ED AGLIO

Reg. Ministero della Sanità N. 7535 del 22/09/88

Composizione	
Ildrazide maleica pura	g. 60
(contenente meno di 1 mg/Kg di idrazina)	
Coformulanti	q.b.a g.100

UNIROYAL CHEMICAL SRL
Via delle Industrie, 40
Latina Scalo (LT)

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

Partita n.

Officine di produzione:

Uniroyal Chemical Co. Inc. - Naugatuck, USA
Uniroyal Chemical Srl - Latina Scalo (LT)

**Il contenitore non può
essere riutilizzato**

Contenuto: 0,5 - 1 - 5 - 15 Kg.

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma.
Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

Caratteristiche

Il **ROYAL MH 60G** viene assorbito dalle piante per via fogliare e traslocato in ogni suo organo per via linfatica. Nei germogli, inibisce principalmente i processi respiratori delle cellule, riduce le attività enzimatiche, rallenta la moltiplicazione cellulare. La sommatoria di queste complesse azioni impedisce lo sviluppo dei germogli e dei succhioni principali e secondari. Sul tabacco, questo prodotto impedisce lo sviluppo dei germogli ascellari. Dato che il **ROYAL MH 60G** viene assorbito ed entra in circolo nella pianta, non è necessario irrorare l'intera pianta. Il miglior controllo si ottiene quando viene irrorata da 1/3 a 1/2 della parte superiore della pianta. Nella cipolla e nell'aglio il **ROYAL MH 60G** inibisce la germinazione durante la conservazione in magazzino ne, evita inoltre le perdite dovute alla disidratazione.

TABACCO

Dosi e modalità d'impiego

Sulle varietà Nostrano del Brenta, Beneventano, Havanna, Bright, Burley, in caso di applicazione meccanica, il **ROYAL MH 60G** si impiega alla dose di 2,8-4,2 Kg/ha di prodotto diluito in circa 500 litri di acqua, corrispondenti, per un investimento di 20.000 piante, a 140-210 g di prodotto per 1000 piante; sulla varietà Kentucky si impiegano 200-250 g di prodotto per 1000 piante, avendo cura che la quantità di prodotto irrorato per ettaro non superi i 4,2-5 Kg. In caso di applicazione manuale, diluire la quantità di prodotto da impiegare su 1000 piante in 20 litri di acqua ed impiegare 15-20 ml per pianta di questa soluzione.

Epoca di impiego

Trattare con **ROYAL MH 60G** entro 24 ore dalla cimatura eseguita allo stadio della piena fioritura. Il trattamento può essere effettuato con un irroratore a spalla ad un solo ugello, oppure con attrezzature dotate di barre appositamente studiate per questo impiego.

Si raccomanda inoltre quanto segue:

1. Trattare le piante in modo uniforme e quando le foglie sono asciutte;
2. Irrorare solo il terzo o la metà superiore della pianta;
3. Trattare durante la mattina; non applicare il prodotto durante le ore troppo calde della giornata o nel tardo pomeriggio o di sera quando le foglie sono troppo appassite;
4. Impiegare irroratori con ugelli a getto sottile;
5. Non applicare il prodotto su piante per la produzione del seme;
6. Una eventuale pioggia, dopo 12 ore dal trattamento non pregiudica l'effetto del prodotto;
7. In alcune condizioni, le foglie apicali del tabacco trattato hanno tendenza ad ingiallire anticipatamente; ciò non è dannoso, ma non significa che il tabacco sia maturo. Non iniziare la raccolta utilizzando il colore delle foglie come il solo indice di maturità;
8. Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture vicine a quella soggetta ad irrorazione;
9. Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali.

CIPOLLE ED AGLIO

Dosi e modalità d'impiego

Cipolla: 2,8-4 Kg in 500-600 litri di acqua per ettaro.

Aglio: 2,8-4 Kg in 500-600 litri di acqua per ettaro.

Assicurare una buona copertura delle foglie.

Il rispetto dei tempi di applicazione è essenziale per ottenere i migliori risultati.

Nelle cipolle: applicare **ROYAL MH 60G** quando i bulbi sono pienamente maturi, nello stadio di inizio piegamento delle foglie. Questo stadio si individua quando il 10% delle foglie sono piegate, ma sono ancora tutte verdi. Questo stadio si raggiunge da circa 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.

Nell'aglio: **ROYAL MH 60G** si applica allo stadio che precede l'appassimento, quando tutte le foglie sono ancora verdi, appena prima il viraggio al colore giallo che si verifica da 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.

Per le cipolle e l'aglio la presenza di foglie verdi è essenziale per consentire l'assorbimento del **ROYAL MH 60G** e la sua traslocazione. **ROYAL MH 60G** non ha effetto se la sua applicazione è troppo tardiva, anche sulle cipolle quando le piante hanno 3 foglie verdi e tutte le foglie sono piegate. Su aglio e cipolla si raccomanda di associare l'impiego di **ROYAL MH 60G** alla scelta di varietà vegetali con buone caratteristiche di conservabilità.

Non applicare su varietà a bassa capacità di conservazione.

Apparirà una diminuzione di efficacia se piove o se si irrigeranno le colture entro 24 ore dal trattamento.

Per consentire il migliore assorbimento e traslocazione del **ROYAL MH 60G**, non trattare in condizioni di carenza idrica, quando la temperatura supera i 26°C o quando la coltura è sotto condizioni di stress da malattie fungine o da attacchi di insetti. Sebbene il **ROYAL MH 60G** non sia volatile bisogna assolutamente evitare la deriva del prodotto sulle colture vicine.

Su aglio e cipolla evitare di applicare il prodotto troppo anticipatamente. Se l'applicazione è effettuata prima di due settimane dalla maturazione potrebbero svilupparsi dei tuberi spugnosi.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il **ROYAL MH 60G** non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto va irrorato da solo.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO: SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

TM Marchio registrato Soc. UNIROYAL Inc. - New York, USA

ROYAL MH 60GTM

(SACCHETTI IDROSOLUBILI)

FITOREGOLATORE IN GRANULI SOLUBILI PER IL CONTROLLO DEI GERMOGLI ASCELLARI PRIMARI E SECONDARI DEL TABACCO E DEI GERMOGLI DI CIPOLLA ED AGLIO

Reg. Ministero della Sanità N. 7535 del 22/09/88

CO Composizione**Idrazide maleica pura** g. 60
(contenente meno di 1 mg/Kg di idrazina)

Coformulanti q.b.a g.100

**UNIROYAL
CHEMICAL SRL**
Via delle Industrie, 40
Latina Scalo (LT)**ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

Partita n.

Contenuto del sacchetto:
50 - 100 - 500 g - 1 Kg

Officine di produzione:

Uniroyal Chemical Co. Inc. - Naugatuck, USA
Uniroyal Chemical Srl - Latina Scalo (LT)**AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione.****DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI
DELLA CONFEZIONE****DA SCIogliere IN ACQUA SENZA
ROMPERE L'INVOLUCRO**

IMPRESA

VEBI S.a.s.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LUMACHICIDA VEBI

ESCA MICROGRANULARE A BASE DI METALDEIDE

COMPOSIZIONE

Metaldeide pura g. 5
Disperdenti, supporti e coadiuvanti q.b. a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande, o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo: circa 50 mg/kg, irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Consultare un Centro Antiveneni.

DOSI E TECNICA DI IMPIEGO

Orti e Giardini g. 250/400 per 100 mq.

Colture in pieno campo g. 100/300 per 100 mq.

Eseguire il trattamento preferibilmente la sera o subito dopo una pioggia distribuendo il LUMACHICIDA VEBI a piccoli mucchietti od a file.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ'

Trattandosi di un'esca pronta all'uso non è prevista alcuna compatibilità, non miscelare con altri prodotti.

RISCHI DI NOCIVITÀ'

Il prodotto è nocivo per i pesci, animali domestici e bestiame.

-SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

-<<Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso>>.

-<<Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato>>.

- << Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali>>.

Registrazione Ministero della Sanità n. 10423 del 29/03/2000

Partita N°.....

VEBI s.a.s.
Borgoricco (PD)

Officina di produzione : DIACHEM S.P.A. ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Officina di confezionamento: DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Officina di produzione e confezionamento: LIFA S.R.L. VIGONOVO (VE)

LIFA S.R.L. ISOLA VICENTINA (VI)

INDUSTRIACHIMICA MASERA' (PD)

VEBI s.a.s. BORGORICCO (PD)

Distribuito da : VEBI s.a.s. via Desman 43 - Borgoricco PD

VEBI s.r.l. via Desman 43 - Borgoricco PD

Eurochimica s.r.l. via Tinozzi, 22 Pescara

Prodotto e distribuito in Italia e all'estero

Produttore

Quantità netta del preparato gr.: 100 - 200 - 250 - 500 - 750 - kg 1 - 2.5 - 5 - 10- 25

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DA NON VENDERSI SFUSO

VEBIGLYF

Erbicida sistemico non selettivo

LICQUO SOLUBILE

ATTENZIONE:
manipolare con prudenza

Composizione:

Glicosato edico puro g 30,5
(per 1 e 360 g/l di acido da sale isopropilamminico)
Coformulanti q. b. a g 100

VEBI s.a.s. via Desman, 43 Borgorico (PD)

Stabilimenti autorizzati:

ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

VEBI s.a.s. - BORGORICO (PD)

Distribuito da: VEBI s.a.s. via Desman 43 Borgorico (PD)

VEBI S.r.l. via Desman 43 Borgorico (PD)

Eurochimica S.r.l. via Tonazzi, 22 Pescara

Taglia autorizzabile: m 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 -
500 - 600 - 700 - 800 - 900 - litri 1 - 5 - 10 - 20

Registrazione n° 10424 del 29/03/2000 Del Ministero della Sanità.

Partita n. Data di scadenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare un medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antivenefici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE: DA IMPEGGARSIS ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

VEBIGLYF è un erbicida sistemico, non selettivo, non residuale. Esso agisce solo in post emergenza delle infestanti ed è particolarmente efficace quando queste sono in attiva crescita ed in prossimità della fioritura quando la linfa discendente ne facilita il trasporto verso le parti fogge (rizomi, tuberi, fittoni) ricche di riserve. L'effetto si palesa dopo alcuni giorni dal trattamento.

Campi d'impiego:

- Colture che non evidenziano sensibilità se le deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato, quali AGRUMI (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, Cedro, Pompelmo), POMACEE (Melo, Pero), NOCE, OLIVO, VITE.

- Colture che possono evidenziare sensibilità se le deriva colpisce anche il tronco ben lignificato, quali DRUPACEE (Albicocco, Ciliegio, Mandorlo, Nektarina, Pesco, Sussino).

- Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lantemi, ed a godole) quali: ORTAGGI: carciofo, pomodoro, melanzana, fegolino, fava, pisello, carota, patata, soia, barbabietola da zucchero, PRATI (leguminose e graminacee), ERBA MEDICA, COLTURE FLOREALI: rosa, VIVAI E SEMENZI DI FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI E PPIOPO; Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: ASPARAGO

- MAIS (l'impiego è consentito solo nelle interfile, da non impiegare in pre - raccolta)

- TERRENI IN ASSENZA DI COLTURE e destinati alla coltivazione di: fragole, ortaggi, barbabietola da zucchero, grano, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, viti con trattamenti prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo, e trattando con melarbo emerse ed effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore.

- AREE NON DESTINATE ALLA COLTIVAZIONE (pedi ferroviario, argini di canali, fossi, scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili).

Modalità d'impiego:

VEBIGLYF è un liquido solubile da impiegare in acqua, a volume sia normale, sia ridotto, con attrezzature aziendali adatte per ben colpire le infestanti da combattere. Normalmente si impiegano 200-300 litri di acqua. Attendere alcuni giorni prima di effettuare eventuali lavorazioni e ciò allo scopo di assicurare la completa translocazione della sostanza attiva.

Dosi:

Le quantità di VEBIGLYF necessarie per il controllo delle infestanti è variabile in relazione alla specie, allo stadio vegetativo ed all'obiettivo agronomico.

Per interventi a pieno campo

Su annuali e bienni

- graminacee non accestite e dicotiledoni in emergenza 1-1,5 l/ha
- graminacee e dicotiledoni sino a 15-30 cm di altezza: 2-3 l/ha

Sulle perenni

- in presenza di Gramigna comune (Agropyron repens), Sorgelletta (Sorghum helopense), Riso Salvatico (Leersia oryzoides), Stoppione (Cirsium arvensis), Tarassaco comune (Taraxacum officinale), Plantagina (Plantago spp), Romice (Rumex spp): 4-5 l/ha contro Cenucciola (Phragmites communis), Carnea (Arundo donax), Rovo (Rubus spp), Farulla (Fenula spp), Ortica (Urtica urens), Sparganio (Sparganium erectum), Tifa (Typha): 5-8 l/ha contro Gramigna (Cynodon dactylon), Psopolo (Paspalum distichum), Vilucchio comune (Convolvulus arvensis), Felco (Pteris aquilina), Cipro (Cyperus rotundus), Rubia (Rubia perigrina): 6-10 l/ha contro Convolvolo (Vilucchio sepium), Aristocchia (Aristocchia spp), Clematide (Clematis spp): 9-12 l/ha

Per interventi localizzati e per 100 litri di acqua:

Su annuali e bienni: 1-1,5 litri

Su perenni: 2-3 litri

Raccomandazioni: con infestanti vigorose come Carnea e Rovo impiegare VEBIGLYF in autunno; ciò per assicurare il trasporto della sostanza attiva, negli organi di riserva perenni in primavera successiva ritrattare gli eventuali ricacci per completare l'eradicazione.

Compatibilità: non impiegare con prodotti a reazione alcalina.

Rischio di fitotossicità alle colture:

- usare acque pulite;
- con acque molto dure usare un tamponante;
- evitare il contatto con le parti non ben lignificate delle piante;
- impiegando schermi, ugelli antideriva, attrezzature umettanti;
- il prodotto è fitotossico se assorbito dalle parti verdi delle piante;
- impiegare attrezzature ben pulite e dopo il trattamento effettuare un accurato lavaggio di tutte le parti che sono state a contatto con il prodotto allo scopo di rimuovere gli eventuali residui;
- con terreni sabbiosi attendere 7 giorni dal trattamento prima di effettuare un eventuale trapianto delle piantine.

AVVERTENZA:

- durante il trattamento tenere lontani animali domestici e bestiame; assicurarsi che il prodotto non venga a contatto con parti zincate e/o di ferro delle attrezzature;
- non impiegare su infestanti coperte di polvere, in stato di stress e nella fase dormiente;
- le piogge che cadono entro 4-5 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

VEBIPHOS G

Granulare

Insetticida per la lotta contro
gli insetti del terreno

ATTENZIONE:
manipolare con prudenza

Composizione:

CLORPIRIFOS puro... g 7,5
Coformulanti ... q.b. a g 100

VEBI s.a.s via Desman, 43 Borgorico (PD)

Stabilimenti di produzione:

DIACHEM Spa - Albano S. Alessandro (BG)

VEBI s.a.s Borgorico (PD)

Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA Caravaggio (BG)

Distribuito da : VEBI s.a.s. via Desman, 43 Borgorico (PD)
VEBI s.r.l. via Desman 43 Borgorico (PD)
Eurochimica via tinozzi, 22 Pescara

Taglie autorizzate: g 100 - 200 - 250 - 500 - 750
Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25

Registrazione n. 10427 del 29/03/2000 del Ministero della Sanità
Partita n. data di scadenza.....

NORME DI SICUREZZA

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscolari (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miopia. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incoostante).

Sintomi circolatori (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antidoti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

NATURA DEL RISCHIO: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci. Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: VEBIPHOS G è un insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie ed è efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui.

VEBIPHOS G si impiega per la difesa delle colture seguenti: **Barbabietola da zucchero, Mais, Tabacco, Patata, Oleaginose** (Girasole, soia), Cavolfiori, Cavolo broccolo, Cavolo verza, Cavolo bianco, Cavolo rosso, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese, Cavolo di Bruxelles, Cavolo rapa, Cavolo nero), **Solanacee** (Pomodoro, Peperonc, Melanzana), **Fagiolo, Pisello, Carota, Cipolla, Colture floreali ed ornamentali**.

Dati di impiego: VEBIPHOS G è consigliato per la disinfezione del terreno contro Elettide, Nottue, Grillotalpa, Maggiolino, Tipule, Bibio, Mosca del cavolo, Formiche, alla dose di 32-40 kg/ha, incorporandolo al terreno con leggera epiratura o fresatura.

Nel caso di trattamenti localizzati, VEBIPHOS G va distribuito a 10 - 16 kg/ha nei solchi preparati per la semina, per il trapianto o all'atto della rincalzatura. In terreni molto leggeri si consiglia la dose minima.

AVVERTENZA: PATATA: l'uso è raccomandato alle dosi sopra indicate **esclusivamente alla semina**.

Nella distribuzione di VEBIPHOS G in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa: in caso contrario non si avrebbe una uniforme distribuzione dei prodotti.

Compatibilità: tale prodotto, data la sua formulazione granulare, non si applica in miscela con altri formulati.

Fitosicidicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 120 GIORNI prima della raccolta per soia e girasole; 60 GIORNI per barbabietola da zucchero, tabacco e patata; 30 GIORNI per mais e cavoli; 21 GIORNI per pomodoro, peperone, carota, e cipolla; e 15 GIORNI per le altre colture.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI/SFUSO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

IMPRESA

VIORYL S.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ECO - TRAP®

TRAPPOLA PRONTA ALL'USO CONTENENTE UN ATTRATTIVO - INSETTICIDA PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA DELL'OLIVO (BACTROCERA OLEAE)

Composizione

1,7 - Dioxaspiro [5.5] undecano
(feromone con funzione attrattiva) gr 0,100
Deltametrina gr 0,019
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere,
né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti
adatti.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente
con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi
immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se
possibile, mostrargli l'etichetta).

VIORYL S.A. - 36 Viltaniotis Str. - KIFISSIA - Atene (GRECIA)

Stabilimento di produzione: VIORYL S.A.-36 Viltaniotis Str.- Kifissia - Atene
(Grecia)

Registrazione Ministero della Sanità n. del

Contenuto netto 80 gr

Partita n°

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO



NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.

ATTENZIONE: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: ECO-TRAP è una trappola pronta all'uso, a basso impatto ambientale, specifica per il controllo della Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae). ECO-TRAP è costituita da un sacchetto in polietilene rivestito all'esterno di carta speciale trattata con un insetticida (Deltametrina). Unitamente alla busta viene fornito un dispenser contenente il feromone attrattivo. Una volta attivata, gli adulti della Mosca vengono attirati sulla superficie della trappola e, dopo averla toccata, muoiono rapidamente.

MODALITÀ D'IMPIEGO: Per una ottimale erogazione delle sostanze attrattive, in fase di installazione delle trappole in campo, praticare un forellino del diametro di 1 mm sia sul dispenser di feromone, sia sulle 2 facce del sacchetto (nella parte centrale della metà superiore). È opportuno che le trappole così predisposte siano collocate all'interno della zona medio-alta della chioma della pianta, evitando l'esposizione diretta ai raggi solari ed il contatto con rami e foglie. Tabellare l'area trattata con opportuni cartelli di attenzione per evitare che persone estranee vi accedano incautamente.

DOSI (n° delle trappole)

1) Su oliveti omogenei con piante di media grandezza posizionare una ECO-TRAP ogni 2 piante.

2) Su oliveti non omogenei con piante grandi posizionare una ECO-TRAP per pianta.

Le trappole devono essere installate nel periodo dell'indurimento del nocciolo (metà giugno, primi di luglio) lasciandole fino alla raccolta.

In generale ECO-TRAP assicura una buona efficienza per tutto il periodo di permanenza in campo ma in caso di forti attacchi della Mosca si può rendere necessario un secondo trattamento all'inizio di settembre.

AVVERTENZA: L'utilizzo più efficace di ECO-TRAP si verifica su grandi oliveti (oltre 1000 piante) o su oliveti con piante di media altezza. Evitare l'impiego su piccoli oliveti adiacenti ad altri non trattati con ECO-TRAP.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ECO - TRAP[®]

**TRAPPOLA PRONTA ALL'USO CONTENENTE UN ATTRATTIVO - INSETTICIDA
PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA DELL'OLIVO (BACTROCERA OLEAE)**

Composizione

1,7 - Dioxaspiro [5.5] undecano
(feromone con funzione attrattiva) gr 0,100
Deltametrina gr 0,019
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione esterna



VIORYL S.A. - 36 Viltaniotis Str. - KIFISSIA - Atene (GRECIA)

Stabilimento di produzione: VIORYL S.A. - 36 Viltaniotis Str. - Kifissia - Atene (Grecia)

Registrazione Ministero della Sanità n. del

Contenuto netto : 80 gr

Partita n°

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO