


Eleggibilità e Dati Clinici

Fare riferimento al RCP del medicinale

O	Diagnosi	Diabete mellito di tipo 2
E	Paziente inadeguatamente controllato dalla dose massima tollerata di terapia ipoglicemizzante corrente e dopo adeguata e documentata modifica dello stile di vita (dieta e attività fisica)?	Sì No
Tattamento precedente		
<i>Se si alla riga sopra, indicare il dosaggio giornaliero di metformina e/o sulfanilurea e/o pioglitazone:</i>		
O	Indicare il dosaggio di metformina (mg/die)	...
O	Specificare il tipo di sulfanilurea	Glibenclamide Glipizide Gliazide Glimepiride Repaglinide Nessuna
O	Dosaggio sulfanilurea (mg/die) (questa riga non compare se al criterio sopra è stato indicato la voce "Nessuna")	...
O	Indicare il dosaggio di pioglitazone (mg/die)	15 30 45
O	Il paziente ha avuto episodi di ipoglicemie severe o condizionanti le attività quotidiane, con la precedente terapia negli ultimi tre mesi?	Sì No
O	Il paziente è a rischio di ipoglicemie severe o comunque condizionanti le attività quotidiane che sconsigli l'utilizzo di altre classi di ipoglicemizzanti?	Sì No
O	Specificare l'associazione (una delle quattro voci):	Associazione con metformina (A) Associazione con pioglitazone in caso di controindicazione o intolleranza alla metformina (B) Associazione con sulfanilurea in caso di controindicazione o intolleranza alla metformina (C) Associazione con metformina e pioglitazone (D) Associazione con metformina e sulfanilurea (E)
Se A:		
O	Indicare il dosaggio di metformina (mg/die)	...



blocca



Se B:	
O	Indicare il dosaggio di pioglitazone (mg/die)
	15
	30
	45
Se C:	
O	Indicare la sulfanilurea:
	Glibenclamide
	Glipizide
	Gliclazide
	Glimepiride
	Repaglinide
O	Indicare il dosaggio sulfanilurea (mg/die)
	...
Se D:	
O	Indicare il dosaggio di metformina (mg/die)
	...
O	Indicare il dosaggio di pioglitazone (mg/die)
	15
	30
	45
Se E:	
O	Indicare il dosaggio di metformina (mg/die)
	...
O	Indicare la sulfanilurea:
	Glibenclamide
	Glipizide
	Gliclazide
	Glimepiride
	Repaglinide
O	Indicare il dosaggio di sulfanilurea (mg/die)
	...
Dati clinici	
O	Durata di malattia (anni)
	...
O	Peso del paziente (kg)
	...
O	Altezza del paziente (m)
	...
O	BMI (kg/m ²)
	...
O	Circonferenza vita (cm)
	...
O	Il paziente presenta uno o più elementi di fragilità come età e/o comorbidità
	Si
	No
O	Se sì, indicare (scelta multipla):
	Età > 75 anni
	Patologie concomitanti e/o complicanze che riducano l'attesa di vita
O	Glicemia a digiuno (mg/dL)
	...
E	Ultimo valore di HbA1c (%)
	... Blocco per valori diversi dall'intervallo [7,5; 8,5] (l'estremo destro è bloccante e può estendersi fino a 9 in caso di risposta "Sì" alla riga sulla presenza di fragilità)
O	Creatinina plasmatica (mg/dl)
	...
O	eGFR secondo Cockcroft-Gault (mL/min) *
	... Calcolo in automatico secondo la formula - Alert per valori <30

automatico

Controllo sul valore HbA1c

