



Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
Patologia/condizioni - comportamento da adottare		Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma
				Criteri applicati in fase di work-up
1.	Alcoolismo e dipendenze			
	Alcolismo cronico o dipendenza da sostanze stupefacenti	Ricevente (rischio indiretto)	Preclude l'arruolamento	Preclude la donazione
	Assunzione pregressa Valutare il tipo di sostanze, la via di assunzione (con particolare attenzione a quella per via endovenosa), il periodo e la durata dell'assunzione di alcool o di sostanze. La condizione è notificata al PT nelle fasi che precedono la donazione. Considerare caso per caso l'ipotesi di criopreservazione del prodotto pre-condizionamento. Assunzione di cannabis	Ricevente (rischio indiretto)	NON preclude l'arruolamento, verificata l'affidabilità del donatore	NON preclude la donazione, verificata l'affidabilità del donatore
		–	NON preclude l'arruolamento	NON preclude la donazione
2.	Allergie, manifestazioni allergiche			
	- Soggetti con anamnesi positiva per anafilassi o con manifestazioni cliniche severe. - Soggetti con anamnesi positiva manifestazioni cliniche lievi-moderate in assenza di episodi di shock anafilattico.	Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude la donazione
3.	Anemia Falciforme, Drepanocitosi (vedi punto 21)	–	NON preclude l'arruolamento	NON preclude la donazione
4.	Anomalie e malattie genetiche e congenite			
	che possono determinare lo sviluppo di una patologia d'organo o di sistema o con carattere di ereditarietà.	- Donatore - Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude la donazione




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
- che si associano o determinano anomalie morfologiche isolate (ad es. sindattilia, polidattilia, labio-palatoschisi, piede torto congenito ...). In caso di riscontro di anomalia genetica in donatore familiare e non familiare, valutare la condizione con il supporto di genetisti e decidere sulla base di una valutazione di rischio in accordo con il PT.	-	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
5.	Accessi vascolari			
	Donatore privo di accessi vascolari validi	NON preclude l'arruolamento		
	In caso di donazione di PB: valutare il reperimento di accessi periferici profondi eco-guidati, contattando specialisti (PICC Team, Vascular Access Team)	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione		
	Non è ammesso il posizionamento di Catetere Venoso Centrale (succlavia, giugulare interna, femorale).	NON preclude la donazione		
	In caso di donatori familiari, il posizionamento di catetere femorale si considera in condizioni eccezionali o di emergenza e in assenza di alternative alla donazione, previo consenso successivo a discussione con rianimatore e con accesso a ricovero breve per adeguato follow-up post donazione.	NON preclude la donazione		
6.	Babesiosi (vedi punto 42)			
7.	Borreliosi (vedi punto 43)			
8.	Brucellosi (vedi punto 44)			
9.	Chirurgia, interventi chirurgici	NON preclude l'arruolamento		
	Chirurgia maggiore Intervento in anestesia generale e/o con assistenza respiratoria, oppure ogni procedura chirurgica	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione



Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
<i>demolitiva (es. amputazioni di arto) o che coinvolge cavità interne.</i> <i>Raccogliere informazioni sulla condizione clinica che ha determinato l'intervento.</i> Sospensione di 4 mesi dalla data dell'intervento. <i>Compatibilmente con lo stato di salute del donatore, per urgenze trapiantologiche, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.</i> Chirurgia minore <i>Intervento in assenza di anestesia generale e/o assistenza respiratoria e che non coinvolge cavità interne.</i> <i>Raccogliere informazioni sulla condizione clinica che ha determinato l'intervento.</i> Sospensione di 1 settimana dalla guarigione <i>Compatibilmente con lo stato di salute del donatore, per urgenze trapiantologiche, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.</i>	Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
Coagulopatie congenite ed acquisite				
Deficit della coagulazione - deficit emorragici gravi-moderati - deficit emorragici lievi con anamnesi personale positiva per eventi emorragici maggiori - disordini emorragici acquisiti (per es. emofilia acquisita). - alterazioni lievi dei fattori della coagulazione, con anamnesi personale negativa per eventi emorragici. Sono accettati donatori familiari limitatamente alla donazione di PB (in relazione al potenziale rischio emorragico durante la procedura di intubazione in caso di anestesia generale). La condizione è notificata al PT (solo donazione di PB).	Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
10.		Preclude l'arruolamento nel donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare



Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
11.	Comportamenti e condizioni a rischio per malattie trasmissibili			
	Comportamento sessuale			
	comportamento sessuale (eterosessuale, omosessuale, bisessuale) attuale e abituale che espone ad elevato rischio di contrarre malattie infettive trasmissibili con il sangue: - rapporti sessuali promiscui; - rapporti sessuali occasionali; - rapporti sessuali con scambio di droga o denaro.	• Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude la donazione
12.	comportamento sessuale (eterosessuale, omosessuale, bisessuale) NON attuale e NON abituale: - con partner risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e/o per l'AIDS o a rischio di esserlo; - con partner che ha avuto precedenti comportamenti sessuali a rischio o del quale il donatore ignora le abitudini sessuali; - con partner occasionale; - con più partner sessuali; - con soggetti tossicodipendenti; - con scambio di denaro e droga; - con partner, di cui non sia noto lo stato sierologico, nato o proveniente da paesi esteri dove l'AIDS è una malattia diffusa. Sospensione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione. ad una o più delle situazioni di rischio sopra esposte. La condizione è notificata al PT. In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.	• Ricevente	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare						Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
Patologia/condizioni - comportamento da adottare		Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento				
13.	Coabitazione, contatto domestico - con persona (non partner sessuale) con epatite B, epatite C, in atto (soggetto viremico) Sospensione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione. <i>Non si applica se il donatore è vaccinato per l'epatite B.</i> <i>In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.</i> <i>La condizione è notificata al PT.</i>		Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Endoscopia, esame endoscopico con strumenti flessibili						
	<i>In assenza di condizioni cliniche sottostanti che escludono di per sé la donazione.</i> <i>Raccogliere informazioni sulla condizione clinica che ha determinato l'indagine.</i> Sospensione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione. <i>La condizione è notificata al PT.</i> <i>In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.</i>		Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
14.	Spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago o tagli con strumenti infetti						
	Sospensione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione <i>Raccogliere informazioni sulla causa dell'esposizione</i> <i>La condizione è notificata al PT.</i> <i>In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.</i>		Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Tatuaggi o body piercing, foratura delle orecchie						
15.	Sospensione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione. <i>La condizione è notificata al PT.</i>		Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Tatuaggi o body piercing, foratura delle orecchie						
16.	Sospensione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione. <i>La condizione è notificata al PT.</i>		Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Tatuaggi o body piercing, foratura delle orecchie						




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					Criteri applicati in fase di test conferma		Criteri applicati in fase di work-up	
Patologia/condizioni - comportamento da adottare					Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento		
	<i>In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto</i>							
	Agopuntura							
17.	Sospensione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione ove non eseguita con strumenti monouso e da professionisti qualificati. <i>La condizione è notificata al PT.</i> In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.				Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Trasfusioni emocomponenti o emoderivati (immunoglobuline, immunoprofilassi IgG anti-epatite B, IgG anti-tetano ...)							
18.	Sospensione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione. <i>La condizione è notificata al PT.</i> In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.				Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
19.	Diabete (vedi punti 73-74)							
20.	Emoglobinopatie, Enzimpatie, eritropatie, malattie del globulo rosso							
	Emoglobinopatie clinicamente significative							
	Sindromi Talassemiche trasfusione dipendenti o non trasfusione dipendenti <i>(talassemia major, malattia da HbH, Talassemia Intermedia, HbE omozigote, HbE/β-thal, HbC omozigote, HbC/β-thal).</i>				- Donatore - Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Sindromi Falcemiche (Drepanocitosi, Sickle Cell Disease, SCD) <i>(HbS omozigote, HbS/β-thal, HbS/HbC, HbS/HbD, HbS/HbE, HbS eterozigote sintomatico).</i>				- Donatore - Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
21.	Emoglobine ad alterata affinità per l'ossigeno, emoglobine instabili <i>Sono accettati donatori familiari se asintomatici e in buon compenso.</i> <i>Valutazione da parte del Centro Specialistico per Emoglobinopatie.</i> <i>La condizione è notificata al PT</i>				- Donatore - Ricevente	Preclude l'arruolamento nel donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento				
Il ricevente deve essere informato riguardo all'acquisizione dell'alterazione emoglobinica specifica.						
Emoglobinopatie eterozigoti						
Emoglobinopatie in eterozigosi asintomatiche documentate per trait beta o alfa talassemico o altre varianti emoglobiniche (HbE, HbD, HbC)	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento. La condizione deve essere registrata nell'anamnesi	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione		
Con emoglobina $\geq 10,5$ e normale bilancio marziale. La condizione deve essere valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up.						
La condizione è notificata al PT.						
Il ricevente deve essere informato riguardo all'acquisizione dell'alterazione emoglobinica specifica.						
I casi dubbi devono essere valutati da Centro Specialistico per Emoglobinopatie.						
Emoglobinopatie in eterozigosi asintomatiche per trait falcemico (HbAS), con anamnesi negativa per crisi falcemiche	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento nel donatore non familiare.	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare		
Sono accettati donatori familiari se asintomatici e in buon compenso limitatamente alla donazione di CSE da BM, con opportuna preparazione (scambio eritrocitario) come da raccomandazioni per la preparazione pre-operatoria in caso di interventi di chirurgia maggiore. Non ammesso predeposito per autotrasfusione).						
La condizione è notificata al PT.						




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up	
Il ricevente deve essere informato riguardo all'acquisizione dell'alterazione emoglobinica specifica. I casi dubbi devono essere valutati da Centro Specialistico per Emoglobinopatie. Enzimopenie Enzimopatie ed eritro-enzimopatie sintomatiche Deficit PK Enzimopenia G6PD OMS Classe I: deficit grave (attività enzimatica <10%) con anemia emolitica cronica (non sferocitica); OMS Classe II: deficit grave (attività enzimatica <10%), con emolisi intermittente; OMS Classe III: deficit lieve (attività 10-60%), emolisi solo se esposti ad ossidanti; OMS Classe IV-V: asintomatico. La condizione deve essere valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up. La condizione è notificata al PT. I casi dubbi devono essere valutati da Centro Specialistico per Emoglobinopatie.					
	• Donatore Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento La condizione deve essere registrata nell'anamnesi	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
Eritropatie Eritropatie sferocitiche (Sferocitosi ereditaria, stomatocitosi e altri difetti congeniti di membrana) - se sintomatici e con danno d'organo; - se asintomatici o paucisintomatici in assenza di danno d'organo. Sono accettati donatori familiari, previa valutazione da parte del Centro Specialistico per Emoglobinopatie. La condizione è notificata al PT.	• Donatore Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
	• Donatore Ricevente	Preclude l'arruolamento nel donatore non familiare. La condizione deve essere registrata nell'anamnesi	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare	




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare		Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
24.	<i>Il ricevente deve essere informato riguardo all'acquisizione dell'alterazione emoglobinica specifica.</i>				
	Endometriosi				
	<i>con dolore non controllato con la terapia e stato anemico.</i>	Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	<i>malattia non complicata e controllata da terapia specifica.</i>	Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Endoscopia (vedi punto 14)				
	Epatite A (vedi punto 57)				
	Epatite B (vedi punto 58)				
25.	Epatite C (vedi punto 59)				
26.	Epatite D (vedi punto 60)				
27.	Epatite E (vedi punto 61)				
28.	Epilessia (vedi punto 83)				
29.	Farmaci				
30.	<i>In assenza di condizioni che escludono di per sé la donazione.</i>	- Donatore - Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
31.	<i>Raccogliere informazioni sul tipo di farmaco assunto e sul motivo della sua assunzione e valutare caso per caso.</i> <i>L'assunzione di estroprogestinici nella donatrice non preclude l'arruolamento né la donazione, in assenza di fattori di rischio tromboembolico (vedi sezione "Condizione di portatore di trombofilia lieve", punto 107).</i>				
32.	Febbre, stati febbrili				
	Febbre > 38°C	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
33.	Sospensione temporanea per 7 giorni dalla cessazione dei sintomi.				
34.	Febbri emorragiche (Ebola, Marburg) (vedi punto 56)				
	Febbre Q (vedi punto 45)				







Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up	
35.	Fibromialgia				
	Fibromialgia (diagnosi certa e malattia sintomatica) con alterata percezione del dolore, affaticamento e/o disagio psicologico.	• Donatore • Ricevente (rischio indiretto)	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
36.	Gammopatia monoclonale, MGUS (vedi punto 80)				
	Glaucoma				
37.	Glaucoma acuto	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- progressiva perdita del visus o attacchi acuti, quadro clinico non compensato; - in assenza di progressione di malattia e sotto controllo terapeutico. La condizione è valutata dallo specialista nelle fasi di test di conferma e di work-up.	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
38.	Gravidanza	•			
	- in corso, oppure gravidanza pregressa con esito in mola vescicolare o coriocarcinoma trofoblastico;	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- parto o interruzione di gravidanza.	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Sospensione per 6 mesi.				
38.	Solo nella donatrice familiare, compatibilmente con lo stato di salute, per urgenza trapiantologica valutare l'applicazione di intervalli inferiori ai 6 mesi.				
	Solo nella donatrice familiare, compatibilmente con lo stato di salute, per urgenza trapiantologica valutare sospensione temporanea dell'allattamento: per BM a 24 ore dopo la donazione; per PB dalla prima	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare						
Patologia/condizioni - comportamento da adottare		Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up	
	somministrazione di fattore di crescita a 1 settimana dopo la donazione.					
39.	Infezioni e malattie da agenti infettivi vedi riferimento alle singole malattie					
40.	Infezioni in atto e in trattamento.	- Donatore - Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Valutare caso per caso in relazione al tipo di infezione, e prevedere il differimento della donazione, se applicabile, in relazione alla probabile guarigione.					
	Infezione da arbovirus (Zika, Chikungunya, Dengue e WNV) In atto.	- Donatore - Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
41.	Sospensione per 120 giorni dalla diagnosi dall'inizio della comparsa dei sintomi per Zika, CHKV e WNV.	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Sospensione per 4 settimane dalla diagnosi o dall'inizio della comparsa dei sintomi per Dengue.					
	La condizione è notificata al PT.					
	Compatibilmente con le condizioni cliniche del donatore, per urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto con NAT negativa.					
	Oltre 120 giorni dalla diagnosi o dall'inizio della comparsa dei sintomi per Zika, CHKV e WNV.	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Oltre 4 settimane per Dengue.					
	Fattori di rischio per esposizione al virus (viaggi e soggiorni in aree endemiche).	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Sospensione per 28 giorni dal rientro ove applicabile, si accetta il donatore con NAT negativa.					
	La condizione è notificata al PT.					



Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up	
Per urgenza trapiantologica, non si applica la sospensione prevista e si accetta il donatore con NAT negativa.					
42. Infezione da Babesia, Babesiosi	Ricevente Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
43. Infezione da Borrelia, Malattia di Lyme - entro 12 mesi dalla guarigione; - oltre 12 mesi dalla guarigione.	- Ricevente -	NON preclude l'arruolamento NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione NON preclude la donazione	
44. Infezione da Brucella (abortus, melitensis), Brucellosi entro 24 mesi dalla guarigione oltre 24 mesi dalla completa guarigione in assenza di recidive. La condizione è notificata al PT. In caso di persistenza di splenomegalia è indicata solo donazione BM. Infezione da Coxiella burnetii, Febbre Q - entro 2 anni dalla guarigione; - oltre 2 anni dalla guarigione completa.	- Ricevente - Donatore	NON preclude l'arruolamento NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione NON preclude la donazione	
45. Infezione da CJD, Encefalopatia CJD (tutte le forme da prioni) Encefalopatia diagnosticata da CJD, soggetti con diagnosi di CJD o altri disordini associati a prioni. Esposizione diretta a fattori di rischio: a) soggetti a rischio per essere stati sottoposti a intervento chirurgico o per aver ricevuto trasfusioni di sangue, trapianto di organi o tessuti nel Regno Unito dal 1980 al 1996; b) soggetti donatori di sangue o tessuti a cui è stato comunicato di essere potenzialmente implicati in una	- Ricevente -	NON preclude l'arruolamento NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione NON preclude la donazione	
46.	Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	Preclude la donazione nel donatore non familiare




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up	
47.	malattia da prioni sviluppata nel ricevente a causa dei prodotti donati; c) riceventi di trapianto di dura madre; d) riceventi di cornea, sclera o altri tessuti oculari; e) riceventi di ormone della crescita umano estratto da ghiandole pituitarie (es. Metrodin). Potenziale esposizione a fattori di rischio: - rischio familiare (due o più consanguinei che hanno sviluppato malattia da prioni o avviati a counselling genetico). La condizione è notificata al PT Sono accettati donatori familiari asintomatici. - soggiorno per più di sei mesi cumulativi nel Regno Unito nel periodo 1980-1996. La condizione è notificata al PT.				
	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	- Ricevente - Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
48.	Infezione da Leishmania, Leishmaniosi - Leishmaniosi viscerale (Kala Azar), Leishmaniosi cutaneo-mucosa. - Leishmaniosi cutanea in forma non diffusa, dopo 6 mesi dalla guarigione, con test sierologico negativo.	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	- Ricevente - Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
49.	Infezione da Micobacterium Tuberculosis Malattia in atto o terapia specifica completata da meno di 2 anni. Terapia specifica completata da oltre 2 anni, in assenza di esiti.	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
50.	Infezione da Plasmodio della malaria (falciparum, malariae, vivax, ovale), Malaria -in atto; -viaggiatore asintomatico a meno di 6 mesi dal rientro in Italia, con test diagnostico positivo.	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare		Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
51.	-a meno di 3 anni dalla completa guarigione. La condizione è notificata al PT Compatibilmente con lo stato di salute del donatore, per urgenza trapiantologica, non si applica la sospensione prevista e si accetta il donatore con test diagnostici negativi.	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	- Dopo oltre 3 anni dalla completa guarigione con test diagnostici negativi; -viaggiatore asintomatico a oltre 6 mesi dal rientro in Italia, con test diagnostico negativo (vedi punto 111).	-	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Infezione da streptococco, Febbre reumatica, Reumatismo Articolare Acuto In atto o pregressa con esiti di cardiopatia o nefropatia	• Ricevente • Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Entro 2 anni dalla cessazione dei sintomi in assenza di cardiopatia cronica o nefropatia. Sono accettati donatori familiari, compatibilmente con lo stato di salute del donatore, per urgenza trapiantologica, con test diagnostici negativi.	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare
52.	La condizione è notificata al PT. Due anni dopo la cessazione dei sintomi in assenza di cardiopatia cronica o nefropatia.	-	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Infezione da Tripanosoma cruzii, Malattia di Chagas o tripanosomiasi americana Infezione in atto o infezione pregressa con danno d'organo o con segni o sintomi di riacutizzazione.	• Ricevente • Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Infezione pregressa documentata in assenza di segni o sintomi di riacutizzazione e in assenza di danno d'organo, in presenza di test per Ab anti-Tripanosoma negativo. La condizione è notificata al PT. Sono accettati donatori familiari asintomatici.	• Ricevente • Donatore	Preclude l'arruolamento del donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
53.	• Ricevente • Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	<i>Esposizione a fattori di rischio in presenza di test per Ab anti-Tripanosoma negativo:</i> -nati o con madre nata in paesi in cui la malattia è endemica; -trasfusi in paesi in cui la malattia è endemica; -viaggiatori in aree rurali di paesi in cui la malattia è endemica con soggiorno in condizioni ambientali favorevoli l'infezione (camping, trekking).			
	Infezione da Toxoplasma, Toxoplasmosi <i>Infezione in atto, sintomatica con linfadenopatia. Pregressa, con esito guarigione clinica completa e sieroconversione (IgG ad alta affinità).</i> <i>Se IgM e IgG positivi, con IgG a bassa avidità o risultato dubbio, prevedere successiva rivalutazione (entro 30 giorni).</i> <i>La condizione è notificata al PT.</i>	• Ricevente • Ricevente	NON preclude l'arruolamento NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione NON preclude la donazione NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione
54.	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Infezione da Treponema pallidum, Sifilide <i>Infezione in atto, in corso di trattamento, con guarigione e sieroconversione non documentata. Infezione pregressa documentata, dopo opportuno trattamento.</i>	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
55.	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Infezione da virus Citomegalico CMV, citomegalovirus <i>In atto.</i> <i>Infezione pregressa con esito in guarigione.</i> <i>E' prevista sierologia per CMV. Se CMV IgM positivo eseguire CMV DNA. Se CMV DNA positivo concordare con il PT l'opportunità di una successiva rivalutazione entro 30 giorni.</i> <i>La condizione è notificata al PT.</i> <i>In caso di persistenza della splenomegalia può essere indicata donazione BM.</i>	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up	
56.	Infezioni da virus Ebola, virus Marburg Febbri emorragiche <i>Infezione in atto o pregressa entro i 12 mesi dalla guarigione con test diagnostico PRC positivo.</i>	- Donatore - Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	<i>Infezione pregressa entro i 12 mesi dalla guarigione con test diagnostico PRC negativo documentato.</i> <i>Sono accettati donatori familiari asintomatici.</i>	- Donatore - Ricevente	Preclude l'arruolamento del donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare
	<i>La condizione è notificata al PT.</i>	- Donatore - Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	<i>Infezione pregressa oltre i 12 mesi dalla guarigione, con test molecolare PCR negativo documentato.</i>	- Donatore - Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
57.	Infezione da virus Epatite A - HAV <i>In atto, con segni di epatopatia.</i>	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	<i>Sospensione per 4 mesi dalla guarigione clinica.</i> <i>Compatibilmente con lo stato di salute del donatore, per urgenza trapiantologica, non si applica la sospensione prevista e si accetta il donatore con RNA negativo.</i>	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	<i>La condizione è notificata al PT.</i>				
	<i>Dopo 4 mesi dalla guarigione clinica completa.</i>	-	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
58.	Infezione da virus Epatite B HBV <i>In atto con segni di epatopatia o pregressa con persistenza di HbsAg positivo.</i>	- Donatore - Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	<i>Entro 12 mesi dalla guarigione clinica completa e comunque non prima di 4 mesi.</i>	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	<i>La condizione è notificata al PT.</i> <i>Compatibilmente con lo stato di salute del donatore, per urgenza trapiantologica, non si applica la sospensione prevista e si accetta il donatore con sierconversione e HBV-DNA negativo</i>				




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up	
		NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
59.	Dopo 12 mesi dalla guarigione clinica completa, con sieroconversione: HBsAg negativo e HBsAb positivo, (se HBe-Ab positivo accettabile se anche HBV-DNA negativo).	• Ricevente	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
	Infezione da virus Epatite C - HCV In atto, in corso di trattamento o con HCV-RNA positivo.	• Ricevente	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione nel donatore non familiare	
	Dopo opportuno trattamento se HCV-Ab positivo e HCV-RNA negativo. La condizione è notificata al PT. Sono accettati donatori familiari asintomatici.	• Ricevente	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione	
60.	Infezione da virus Epatite E - HEV In atto o con HEV-Ag positivo e HEV-RNA positivo.	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude la donazione	
	Pregressa con esito guarigione e con positività sierologica e HEV-RNA negativo.	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude la donazione	
	La condizione è notificata al PT.	• Donatore • Ricevente	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
61.	Infezione da virus Epstein Barr - EBV - Mononucleosi infettiva con organomegalia entro 6 mesi dalla diagnosi.	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude la donazione	
	Infezione pregressa con esito in guarigione dopo 6 mesi dalla diagnosi.	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude la donazione	
	Se EBV VCA-IgM positivo eseguire EBV DNA. Se EBV DNA positivo concordare con il PT l'opportunità di una successiva rivalutazione entro 30 giorni. La condizione è notificata al PT In caso di persistenza di splenomegalia significativa è indicata solo donazione BMI.	• Ricevente	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
62.	Infezione da virus Immunodeficienza Acquisita - HIV In atto, in corso di trattamento o con HIV-RNA positivo e CD4 $\leq$ 200/ μ L.	• Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude la donazione	




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare						Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
Patologia/condizioni - comportamento da adottare		Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up		
63.	<i>Progresso, dopo opportuno trattamento, con HIV-RNA non rilevabile e CD4 > 200/μL.</i>	Ricevente	Preclude l'arruolamento del donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare		
	<i>La condizione è notificata al PT.</i> <i>Sono accettati donatori familiari asintomatici, il cui ricevente sia esso stesso HIV+.</i>						
	Infezione da virus influenzale o affezioni simil-influenzali o febbrili <i>Sono accettati soggetti dopo 7 giorni dalla cessazione dei sintomi.</i>	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione		
64.	Infezione da virus HTLV I/II (donatore o partner)	Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione		
65.	Infezione da virus SARS-CoV2 Covid-19 <i>Sono accettati soggetti con infezione pregressa con esito guarigione clinica e di laboratorio (test molecolare o antigenico negativo eseguito su tampone naso-faringeo).</i>	- Ricevente - Donatore	NON preclude l'arruolamento .	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione		
	<i>Soggetto con diagnosi recente di infezione da SARS-CoV-2 può essere accettato dalla completa risoluzione dei sintomi (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) oppure in presenza di un test molecolare o antigenico negativo. In entrambi i casi il soggetto può essere accettato dopo un intervallo di tempo in linea con quanto previsto dalle autorità competenti del settore.</i>						
	<i>Soggetto con anamnesi positiva di contatto ad alto o basso rischio con pazienti positivi per SarS-CoV-2 può essere accettato dopo un intervallo di tempo in linea con quanto previsto dalle autorità competenti del settore.</i>						
66.	Iperensione arteriosa (vedi punto 75)						
67.	Leishmaniosi (vedi punto 47)						
68.	Lebbra (vedi punto 48)						




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare		Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
69.	Malaria (vedi punto 50)				
70.	Malattia di Chagas, Tripanosomiasi (vedi punto 52)				
71.	Malattia di Lyme, Borreliosi (vedi punto 43)				
72.	Malattie sistemiche o malattie che coinvolgono organi o apparati				
73.	Diabete				
74.	Diabete tipo I <i>insulino-dipendente associato a gravi patologie d'organo diabete-correlate.</i>	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Diabete tipo II <i>non compensato che richiede terapia insulinica.</i>				
	Diabete tipo II <i>controllato con la dieta o farmaci antidiabetici orali (normale HbA1c) e in assenza di gravi patologie d'organo diabete-correlate.</i>	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
75.	Iperensione arteriosa				
	- non controllata dalla terapia e/o associata a micro-angiopatia ipertensiva attiva (in presenza di cefalea, disturbi del visus, dolore toracico, dispnea, e sintomi neurologici focali o generali).	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- controllata dalla terapia, in buon compenso e in assenza di sintomi correlabili a micro-angiopatia ipertensiva acuta. <i>Per le donazioni di CSE da PB e DLi in caso di trattamento con ACE-inibitori valutare la sostituzione della terapia antipertensiva 48 ore prima della raccolta.</i>	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
76.	Gotta				
77.	Verificare valore di uricemia per possibile esacerbazione con G-CSF in fase di work-up.	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Verificare presenza di HLA B*5801 nel donatore, per possibile ipersensibilità alla terapia con antiuricemici.				
78.	Verificare terapia alternative.				
	Malattie autoimmuni				




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
Malattie autoimmuni mono-organo <i>malattia non attiva e in buon compenso con o senza terapia farmacologica.</i> - <i>Celiachia (sprue);</i> - <i>Anemia perniciosa;</i> - <i>Alopecia areata;</i> - <i>Vitiligine;</i> - <i>Malattia di Graves;</i> - <i>Psoriasi;</i> - <i>Tiroidite di Hashimoto.</i> <i>La condizione clinica è valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up.</i>	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
Malattie autoimmuni sistemiche <i>in forma attiva, non compensate dal trattamento farmacologico e con segni e sintomi di coinvolgimento d'organo, tra cui:</i> - <i>Malattia infiammatoria intestinale;</i> - <i>Sclerosi multipla (SM);</i> - <i>Lupus eritematoso sistemico (LES);</i> - <i>Artrite infiammatoria (inclusa l'artrite reumatoide);</i> - <i>Sclerodermia / CREST;</i> - <i>Sarcoidosi;</i> - <i>Sindrome di Guillain Barré e altre neuropatie periferiche;</i> - <i>Granulomatosi di Wegener;</i> - <i>Sindrome di Goodpasture.</i> <i>in remissione di malattia e fuori terapia sistemica da più di 12 mesi, previa consulenza specialistica.</i> <i>La condizione clinica è valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up limitatamente alla donazione di BM.</i>	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
<i>La condizione è notificata al PT.</i>	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione, limitatamente alla donazione di BM	NON preclude la donazione, limitatamente alla donazione di BM
79. Malattie cardiovascolari				




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
Aritmie - Fibrillazione / flutter atriale non corretto; - Episodi di tachicardia / fibrillazione ventricolare; - Sindromi di Wolff-Parkinson-White /Lown-Ganong-Levine se non trattate con ablazione transcateretere e nessuna evidenza all'ECG di vie accessorie; - Blocco cardiaco di secondo (tipo Mobitz 1, 2 o Wenkebach) o di terzo grado; - Portatori di pacemaker e defibrillatori cardiaci impiantabili; - Blocco di branca sinistro; - Sindrome del QT lungo, sindrome Brugada o ogni altra condizione a rischio di morte cardiaca improvvisa. Malattie coronariche - Aterosclerosi o occlusione trombotica del circolo coronarico; - Angina; - Malattia ischemica cardiaca; - Infarto del miocardio.	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
- Anomalie congenite completamente guarite o corrette chirurgicamente; - Prolasso mitralico in assenza di rigurgito emodinamicamente significativo e di prolungamento QT; - Difetti valvolari minori e soffi innocenti; - Valvola aortica bicuspidale senza stenosi significativa. Aritmie - extrasistoli atriali o ventricolari benigne; - tachicardia sinusale/bradycardia, con buon compenso cardiocircolatorio; - tachicardia sopraventricolare (SVT), compresa la fibrillazione atriale/flutter atriale, se trattate con successo con ablazione e con farmaci anti-aritmici (beta-bloccanti) per almeno un anno; - assunzione di beta-bloccanti prescritti per extrasistoli benigne o tachicardia sinusale;	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare		Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
80.	- blocco di branca destra in assenza di qualsiasi altra anomalia. La condizione clinica è valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up, con particolare attenzione al rischio anestesiológico.				
	Malattie ematologiche ed immunologiche Afezioni ematologiche e immunologiche: congenite, genetiche, neoplastiche, acquisite, a carico della serie bianca, delle piastrine e della serie rossa su base neoplastica o non neoplastica (Anemia Aplastica, SAA Mielodisplasia MDS, emoglobinuria parossistica notturna PNH, porpora trombocitopenica idiopatica), anemia congenite (anemia di Fanconi, Malattia di Blackfan-Diamond), Immunodeficit congeniti (vedi oltre per Deficit Isolato IgA). MGUS vedi oltre.	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Deficit congenito di IgA, isolato, associato a infezioni ricorrenti, o a patologie autoimmuni o a celiachia o associato a carenza di una o più delle altre classi di immunoglobuline.	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Deficit congenito di IgA, isolato, asintomatico, in assenza di altre malattie autoimmuni o celiachia, con normali valori delle altre classi di immunoglobuline. Il ricevente deve essere informato riguardo all'acquisizione del difetto specifico.	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione, limitatamente alla donazione di BM	NON preclude la donazione, limitatamente alla donazione di BM
	La condizione è notificata al PT Gammopatia monoclonale – MGUS In caso di diagnosi precedente Componente monoclonale < 1,5 g/dL, in assenza di nefropatia, osteopenia, fratture patologiche, e che risulti stabile nel tempo da almeno 6 mesi.	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	In caso di riscontro occasionale durante il work-up				




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
Patologia/condizioni - comportamento da adottare		Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento			
81.	Componente monoclonale < 1,5 g/dL, in assenza di nefropatia, osteopenia, fratture patologiche.					
	In caso di componente monoclonale >1,5 g/dL Contattare la second opinion.					
	Porpora trombocitopenica idiopatica dell'infanzia con risoluzione completa	-	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Splenectomia su base traumatica, non per patologia primitiva. Valutare sospensione per vaccinazione anti-pneumococcica, se recente.	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Valutare persistenza di milza accessoria.					
81.	Malattie gastrointestinali, epatiche, vie biliari, pancreas					
	Malattie gastrointestinali, epatiche, vie biliari, pancreas non su base autoimmune, non neoplastiche e non infettive.	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	La condizione clinica è valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up, con particolare attenzione al rischio anestesiológico.					
82.	Malattie neurologiche					
83.	Malattie neurologiche del sistema nervoso centrale a genesi cerebrovascolare	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
	Ictus, o incidente cerebrovascolare (emorragico o ischemico), emorragia cerebrale in qualunque sede, TIA.					
	Epilessia in terapia cronica con anticonvulsivanti.	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
	pregresse convulsioni febbrili infantili o con forme di epilessia per le quali sono trascorsi più di 12 mesi dalla cessazione della terapia anti-convulsivante senza ricadute.	-	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up	
84.	Malattie neurologiche del sistema nervoso periferico <i>non su base autoimmune, non neoplastiche e non infettive.</i> <i>La condizione clinica è valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up.</i>	• Donatore	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
	Malattie psichiatriche <i>- con inadeguato controllo terapeutico, quadri psicotici o dissociativi;</i>	• Donatore • Ricevente (rischio indiretto)	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	<i>- con buon controllo terapeutico e in buon compenso psicodinamico;</i> <i>La condizione clinica è valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up con particolare attenzione all'affidabilità del donatore.</i> <i>La condizione è notificata al PT.</i> <i>I soggetti in terapia con litio hanno indicazione a donare solo BM.</i> <i>Valutare eventuale crioconservazione del prodotto cellulare pre condizionamento.</i>	• Donatore • Ricevente (rischio indiretto)	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Malattie renali e del tratto genito-urinario <i>Patologie gravi, insufficienza renale acuta/cronica da qualsiasi causa, emodializzati.</i> <i>Patologie in buon compenso, con funzione renale conservata.</i> <i>Soggetti mono-rene su base congenita o da nefrectomia post-traumatica, con funzione renale conservata.</i>	• Donatore • Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
85.	Malattie respiratorie <i>asma grave che richiede trattamento steroideo, BPCO grave, pneumotorace recidivante.</i>	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	Quadri clinici compensati: - asma non severa controllata con inalatori e FANS; - BPCO se lieve-moderata; - sleep-apnea in assenza di anomalie cardio-respiratorie; - pneumotorace spontaneo non recidivato. Valutare il rischio anestesilogico in caso di donazione BM. La condizione è notificata al PT.	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
87.	Malattie trasmissibili, comportamenti a rischio (vedi punti 11-12-13-14-15-16-17-18)				
88.	Mononucleosi infettiva, EBV (vedi punto 61)				
	Neoplasie, Tumori maligni				
89.	Neoplasie (anamnesi positiva per neoplasia maligna) <i>In atto o pregresse, neoplasie maligne, neoplasie ematologiche, neoplasie associate a condizioni viremiche.</i>	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Carcinoma basocellulare o carcinoma in situ della cervice uterina dopo rimozione della neoplasia.	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Osteomielite				
90.	Osteomielite <i>- in fase cronica o entro i 12 mesi dalla fine della terapia;</i>	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	<i>- dopo completa guarigione e oltre i 12 mesi dalla fine della terapia.</i>	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	<i>Da escludere la donazione di BM se localizzata in aree contigue alla sede di prelievo midollare</i>				
	La condizione è notificata al PT.				
91.	Peso * rischio indiretto per il ricevente a causa della scarsa cellularità del graft, legata al peso del donatore				
	condizioni di sottopeso o sovrappeso come indici di un'altra patologia sistemica (es. anoressia, morbo di Cushing, ecc.).	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up	
Donatore non familiare e familiare adulto - BM: idoneo se peso >50 kg e BMI < 35,0 kg / m ² ; - PB: idoneo se peso >50 kg e BMI < 40,0 kg / m ² . <i>Donatori al di fuori di questi limiti devono essere valutati caso per caso anche in relazione alla sorgente di CSE e non automaticamente esclusi.</i>	• Donatore • Ricevente (rischio indiretto*)	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
Donatore familiare minore - BM: idoneo anche se peso < 50 kg : NON SUPERARE 20 mL/kg del donatore; - PB: solo se ≥14 anni, con peso inferiore a 50 kg non ammessa large volume apheresis (non processare >3 volumi ematici del donatore). <i>Applicabile anche in donatori familiari minori: - con elevata sproporzione di peso donatore / peso ricevente a sfavore del donatore (con differenza > 25%); - con peso compreso tra 10-30 Kg. È necessario garantire la terzietà (Second Opinion) nella valutazione dello stato psicofisico del donatore minore che dona PB (sommministrazione del fattore di crescita).</i> <i>Nel caso in cui sia necessaria una seconda donazione di BM, l'intervallo tra le donazioni NON DEVE ESSERE < 40 giorni.</i>	• Donatore • Ricevente (rischio indiretto*)	NON preclude l'arruolamento nel donatore familiare.	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore familiare	NON preclude la donazione	
92. Porpora Trombocitopenica Idiopatica dell'infanzia, PTI infantile (vedi punto 80)					
93. Reumatismo Articolare Acuto (vedi punto 51)					
94. Sferocitosi (vedi punto 23)					
95. Sifilide (vedi punto 54)					
96. Spruzzo delle mucose, lesione da taglio (vedi punto 15)					
97. Talassemia (vedi punto 21)					
98. Tatuaggi, body piercing, agopuntura (vedi punto 16-17)					
99. Terapia farmacologica (vedi punto 31)					




Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up	
100. Toxoplasmosi (vedi punto 53)					
Trapianto					
Trapianto di organo solido, trapianto di CSE	- Donatore - Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
101. Xenotraspianto impianto di preparati tissutali di origine animale NON certificati per l'assenza di malattie infettive trasmissibili quali la CID.	Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
impianto di preparati tissutali di origine animale certificati per l'assenza di malattie infettive trasmissibili quali la CID.	Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
102. Trasfusioni emocomponenti o emoderivati (<i>immunoglobuline, immunoproteine IgG anti-epatite B, IgG anti-tetano ...</i>) (vedi punto 18)					
103. Tripanosomiasi, Malattia di Chagas (vedi punto 52)					
104. Trombosi e trombofilia					
Iperomocisteinemia lieve-moderata: omocisteinemia $\leq 100 \mu\text{Mol/L}$ all'esordio, con o senza documentati difetti genetici (difetto di protrombina, G20210A eterozigote, fattore V Leiden eterozigote, variante C677T del gene MTHFR in eterozigosi o omozigosi) e valori di omocisteina normali dopo adeguato trattamento.	Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione	
Iperomocisteinemia severa: omocisteinemia $> 100 \mu\text{Mol/L}$ all'esordio con persistenza di iperomocisteinemia nonostante adeguato trattamento vitaminico.	Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
105. Trombosi e trombofilia ad alto rischio - pregresso evento trombotico arterioso con o senza trombofilia; - pregresso evento trombotico arterioso con o senza trombofilia; - pregresso evento trombotico venoso profondo (trombosi venosa profonda in qualsiasi sede e/o embolia polmonare) con o senza trombofilia; - trombosi venose superficiali recidivanti (almeno due episodi);	- Donatore - Ricevente in caso di forme acquisite autoimmuni	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione	
106.					



Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare		Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
107.	- diagnosi di sindrome da anticorpi antifosfolipidi (pregresso evento trombotico venoso o arterioso, o complicanza ostetrica, associata a positività al LAC e/o agli anticorpi anticardiolipina e/o agli anticorpi anti-beta2glicoproteina1).				
	trombofilia ereditaria ad alto rischio trombotico anche senza eventi trombotici in anamnesi: - deficit di anticoagulanti naturali (antitrombina, proteina C, proteina S), - protrombina G20210A omozigote, - fattore V Leiden omozigote, - difetti combinati (es. eterozigosi combinata protrombina G20210A/Fattore V Leiden).		Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Il ricevente è informato riguardo alla acquisizione del difetto.				
	trombofilia ereditaria a basso rischio trombotico difetto di protrombina G20210A eterozigote; variante C677T del gene MTHFR in eterozigosi, fattore V Leiden eterozigote in assenza di manifestazioni cliniche conclamate (TVP, poliabortività...) personali. I casi dubbi devono essere valutati dal Centro emostasi e trombosi.		NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Il ricevente è informato riguardo alla acquisizione del difetto.				
108. 109.	Familiarità per trombosi Trombosi venosa superficiale con un unico episodio in anamnesi.		NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Tubercolosi (vedi punto 49)				
	Tumori, Neoplasie (vedi punto 89)				
110.	Vaccinazioni Tossoidi				
	sospensione 48 ore se asintomatico	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento		NON preclude la donazione



Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare						
Patologia/condizioni - comportamento da adottare		Soggetto a rischio		Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
Virus o batteri vivi attenuati Virus o batteri o rickettsie uccisi / inattivati o vaccini ricombinanti Vaccini specifici Vaccino contro encefalite da zecche Vaccino contro Epatite A Vaccino contro Epatite B (non ricombinante) Vaccino contro Rabbia Vaccino contro Sars-Cov2	Virus o batteri vivi attenuati	4 settimane			NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	
	Virus o batteri o rickettsie uccisi / inattivati o vaccini ricombinanti	48 ore se asintomatico				
Viaggi Viaggiatore asintomatico in aree endemiche per malattie tropicali (http://www.viaggiareisicuri.it/find-country - http://inviaggio.simti.it/Index.aspx). Raccogliere informazioni sul paese e sul tipo di malattia infettiva endemica. Si applica il periodo di sospensione previsto per la specifica malattia.						



Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up	
		<i>Se per urgenza trapiantologica non è possibile rispettare l'intervallo di sospensione, eseguire lo specifico test diagnostico (se disponibile) e notificare al PT.</i>			
112.		West Nile Virus WNV (vedi punto 41)			
113.		Zika virus (vedi punto 41)			

23A00090

