

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo Unità di attività/kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 %	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a 1 600	BASF Aktiengesellschaft	3-fitasi EC 3.1.3.8 (Natuphos 5 000 G Natuphos 5 000 L Natuphos 10 000 G Natuphos 10 000 L)	Composizione dell'additivo: 3-fitasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 101.672) con un'attività minima di: forma solida: 5 000 FTU/g forma liquida: 5 000 FTU/ml Caratterizzazione della sostanza attiva: 3-fitasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 101.672) Metodo analitico ⁽¹⁾ Metodo colorimetrico di misurazione del fosfato inorganico rilasciato dall'enzima dal substrato di fitato.	Suinetti (svezziati)	—	500 FTU		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Può essere utilizzato per suinetti svezziati che pesano fino a 35 kg. 3. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500 FTU. 4. Per l'impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.	2.4.2017
				Suini da ingrasso		280 FTU		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele, indicare il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 400-500 FTU. 3. Per l'impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.	
				Polli da ingrasso	—	375 FTU		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-700 FTU. 3. Per l'impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.	

⁽¹⁾ Informazioni sul metodo analitico sono disponibili sul seguente sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/.